

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-001700

A S 9454

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 11135 Société : R. A. D.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : JEBBARI

/ABDELLAH

Date de naissance :

Adresse :

Tél. 0661372648

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Bouchra MADI
Spécialiste des maladies de l'appareil digestif
8, Bd Mokhtar Soussi Hassania - Mohammedia
Tél : 05 23 28 15 30

Date de consultation : /

Nom et prénom du malade : AIT STIDI AZIZA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/01/2023	G		3000	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Signature du Bénéficiaire ou de la Personne mandatée pour l'obtenir de la Facture
02 - 05 - 23 PHARMACIE MOUMEN BD LA PALESTRE LOT MOUMEN EL ALIA MOHAMMEDIA INPE: 09 2044 049 TEL: 03 23 28 44 85	29.1.52	PHARMACIE MOUMEN BD LA PALESTRE LOT MOUMEN EL ALIA MOHAMMEDIA INPE: 09 2044 049 TEL: 03 23 28 44 85

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.


O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

• **Leadership:** Who, approach, necessary to accomplish.



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Bouchra MADI

Spécialiste des Maladies
de l'appareil digestif
Estomac - Foie - Intestins
Hémorroïdes

Endoscopie Digestive
Echographie Abdominale



الدكتورة بشرى الماضي

إختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي

المعدة - الأمعاء

الكبد - البواسير

الفحص بالمنظار الداخلي

الفحص بالصدى

PHARMACIE MOUMEN
BD LA PALESTINE 101 MOUMEN
EL ALIA MOHAMMEDIA
INPE: 09 20 44 04 9
TEL: 05 23 28 44 85

PHARMACIE MOUMEN
BD LA PALESTINE 101 MOUMEN
EL ALIA MOHAMMEDIA
المحمودية
INPE: 09 20 44 04 9
TEL: 05 23 28 44 85

Rafi Sadiq Aziza

123,60

- INEBIUM : 1 - 0 - 0

40

114j

SA

87,00

- Relaxium

1 - 0 - 0

1 bite

~~دكتورة بشرى الماضي~~
~~Dr. Bouchra MADI~~
~~Spécialiste des maladies de l'appareil digestif~~
~~18, Bd Mokhtar Soussi Hassania - Mohammedia~~
~~Tél : 05 23 28 15 30~~

50,40

100 + 24j x 7 j

291,50

Usttre : 1 - 1 - 1 + 15 bite

شارع المختار السوسي الحسنية 1، العالية - المحمدية 778

ORO dispersible



voie orale

Musfon® 80 mg

Phloroglucinol

Deva
Pharmaceutique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Dénomination du médicament :

MUSFON® 80 mg, 10, 20 ou 30 comprimés orodispersibles

2. Composition du médicament

Phloroglucinol dihydraté 80 mg
 Quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à 62,25 mg
 Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone K90, stéarate de magnésium, aspartam (E951).qsp un comprimé.
 Excipients à effet notoire : aspartame, lactose

3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A : appareil digestif et métabolisme)

(G : système génito-urinaire)

4. Indications thérapeutique

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

5. Posologie :

- Mode et voies d'administration : Voie orale.

Chez l'adulte : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau.

Posologie

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 2 comprimés orodispersibles par jour, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.

Chez l'enfant : 1 comprimé orodispersible 2 fois par jour.

6. Contre-indications :

Ne prenez ja
composants.

EN CAS DE D
PHARMACIEN

LOT : M0869
PER : 09/2025
PPU : 50,40 DH

Avertisseme

Faites attention mg, comprimés orod
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVI
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Musfon 80mg
30 Comprimés
Deva Pharmaceutique



6 118000 410263

7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :
 Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, exceptionnellement

ARGO®

Alginate de sodium/Bicarbonate de sodium

ARGO, suspension buvable en flacon Alginate de sodium, bicarbonate de sodium

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

• Si ARGO a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernent votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'ARGO, suspension buvable en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ARGO, suspension buvable en flacon ?
3. Comment prendre ARGO, suspension buvable en flacon ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ARGO, suspension buvable en flacon ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QU'ARGO, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
ce médicament pour l'ulcère peptique et le reflux oesophagien (R.G.O.).

Ce médicament contient un colorant rouge cochenille A et peut provoquer des réactions allergiques.

Chez l'enfant et le nourrisson

• Demander un avis médical avant l'utilisation simultanée avec des épaissements. Respecter le mode d'emploi de l'épaisseur et les posologies indiquées pour chaque produit.

Consultez votre médecin en cas de modification significative du transit alimentaire de l'enfant, par exemple en cas de diarrhée ou de constipation.

Parallèlement à l'emploi de ce médicament, il est recommandé de suivre certaines règles hygiéno-diététiques :

- Épaissir l'alimentation,
- Eviter les bouillies chocolatées,
- Fractionner les repas,
- Eviter de trop serrer les couches,
- Eviter le tabagisme familial,
- Supprimer le jus d'orange et les boissons gazeuses.

EN CAS DE DOUCEUR NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et ARGO suspension buvable en flacon

Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre ARGO et un autre médicament. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

ARGO suspension buvable en flacon avec des aliments et boissons

Chez le nourrisson et l'enfant

L'utilisation simultanée avec des denrées alimentaires, les laits infantiles et les épaissements peut entraîner une constipation.

Prendre un flacon d'un épaisseur.

Grossesse et allaitement : ARGO peut être administré à une femme enceinte ou allaitante.

Si vous êtes enceinte ou allaitante, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.



pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ARGO suspension buvable en flacon

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre ARGO suspension buvable en flacon

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Chez l'adulte :

Très rare (moins d'un cas pour 10 000 patients) : une réaction allergique aux composants peut se produire. Les symptômes peuvent se manifester par une éruption cutanée, des démangeaisons, une difficulté respiratoire, des sensations vertigineuses ou un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Réaction gastro-intestinales : constipation, nausée, diarrhée, occlusion intestinale, flatulences, distension abdominale.

En cas d'utilisation prolongée, risque d'augmentation du taux de calcium dans le sang.

Si l'un de ces symptômes ou d'autres effets indésirables apparaissent, arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Déconseillé

Si vo

à vot

à tou

ceste

indis

phar

vous c

sécurit

LOT : 4413
UT AV : 11 - 25
P.P.V : 30DH50

informations sur la

5. COMMENT CONSERVER ARGO, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ?

ation du patient

rimés gastro-résistants

rimés gastro-résistants

esprazole

Traitemen~~t~~ement des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avalez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mâchés ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobées qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
 - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'eau chaude ou de jus de fruit. Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou le mélangez avec de la soupe ou de la bouillie de riz.
 - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit complètement dissous. Vous pouvez alors le boire avec de l'eau plate ou du lait.
 - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, buvez le liquide. Les particules doivent être bien dissoutes.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé peut être introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré directement dans votre estomac (sonde gastrique).

Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

INexium® est un comprimé gastro-résistant, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information pour les enfants de 12 à 11 ans est fournie dans l'information

