

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1525 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

NOUR FATHIA

160596


Date de naissance :

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 26/04/2023

Nom et prénom du malade : JS Abdellah Fakir Age :

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/06	2025	1	200,000	Dr. Nasser Al Sarra Médecine Générale Rue 40, N° Appt 8 Lot Oman Hayanara Ain Chock - S. 2025 05.22.54

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <i>Pharmacien: Dr. Béatrice LALANCA</i> <i>Rue de la Marne, 100-102</i> <i>Hay-Nara, 78230</i> <i>Tel: 01 65 24 52 38</i>	<i>LALANCA</i> <i>Chadiva</i> <i>LALANCA</i> <i>80/06/23</i> <i>2023</i>	<i>426 70</i> <i>/</i>

#### **ANALYSES - RADIOPHARMACIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

**Dr. BELGHAZAL SARRA**

Médecine Générale  
Echographie

Ex. Médecin au CHU  
Ibn Rochd de Casablanca  
Service Chirurgie Pédiatrique

**الدكتورة بلغزال صارة**

الطب العام  
الفحص بالصدى

طبيبة سابقة بمستشفى الأطفال  
ابن رشد قسم جراحة الأطفال

**Ordonnance**

Casablanca le 26/04/2023

Ismaïla em. Father

① Ben dys 8

7090 5x 31 SV l'entrep

② Pirofend 100

45,70 5/2 en mi dys 10



③ coltesc

2880 6/2 6 min.



④ nitengestrel

18x21g 1

1moy =

Pharmacie Omariya Casablanca  
Rue 49 Lot. Omariya  
Mosquée Omariya Hay Inara  
Casablanca  
Tél.: 05.22.52.36.20

~~5280~~ (5) vedes get 20. SV  
~~149,00~~ 1 g. + 21,2 10 SV  
6 Omnisolci & 20c SV  
~~79,50~~ 1 g. 21,2 SV  
(7) Cambosorb P  
~~150~~ + 21,2 Pessore

Jr. DR. HASSAN AZAL Sarra  
Médecine Générale  
Rue 49, N° Appt. 8 Lot. Omariya  
Jdy Inara Aïn Chock - Casablanca  
TEL: 05 22 52 17 89

= 426,70

~~Pharmacie Omariya Casablanca  
Rue 49 Lot. Omariya Jdy Inara Aïn Chock Casablanca  
TEL: 05 22 52 36 29~~



# OEDES® 20 mg

## Microgranules gastrorésistants en gélule (Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

### 1. Identification du médicament:

Forme pharmaceutique et présentation:

OEDES® 20 mg, Microgranules gastro-résistants en gélules, boîte de 7, 14, 28 et 56.

### 2. Composition du médicament :

Principes actives:

Oméprazole ..... 20 mg  
EXCIPIENTS : s.p.s une gélule.

Excipient à effet notable : Saccharose.

### 3. Classe pharmaco-thérapeutique :

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

### 4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

#### Chez les adultes :

- le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (la tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori.

Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

#### Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :

- le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (la tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

#### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori.

Dans ce cas, le médecin peut également vous prescrire des antibiotiques.

#### 5. Posologie :

##### Po<sup>t</sup> admi

indicatio

Veuillez à

Votre mé

pendant co

de votre éta

Posologie :

Les doses re

Utilisation cl

Traitemen

de brûlure

et rég

Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour

gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

- Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contenant le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

#### 6. Contre-indications :

##### Ne prenez jamais OEDES® 20 mg, gélule :

- si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OEDES® 20 mg.

• si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanoprazole, rabéprazole, esomeprazole).

• Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

• Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg.

#### 7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables; mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

• Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.

• Jauisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Les autres effets indésirables sont :

#### Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Maux de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.
- Nausées ou vomissements.
- Polypes bénins dans l'estomac.

#### Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissements, tourniquets, somnolence.
- Vertiges

... des résultats des tests sanguins contrôlant le de votre foie.

... urinaires et démane...  
... général, mang...  
...ables rare

... gue...  
... plaq...  
... chymos...  
... lergique...  
... la langue

... du tau...  
... provocuer une faiblesse

- Agitation, confusion ou dépression.
- Troubles du goût.
- Troubles de la vue, tels que vision trouble.

• Vous avez des selles noires (teintées de sang).

• Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

• Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

• Si vous avez déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à OEDES® qui réduit l'acidité de l'estomac.

• Vous devez effectuer un examen sanguin spécifique (Chromogranine A).

Si vous prenez OEDES® 20 mg au long-cours (durée supérieure à un an), votre médecin vous surveillera probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et événements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier au niveau des zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que possible, car votre peau peut-être arrêter de traiter avec OEDES® 20 mg. N'oubliez pas de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

#### Enfants :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que celui-ci ne soit pas recommandé. Ne donner pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou < 10 kg.

#### Mentions relatives aux excipients à effet notable :

En raison de la présence de Saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/immotilase (maladies héréditaires rares).

#### 9. Interactions avec d'autres médicaments:

##### Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. OEDES® 20 mg peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES® 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES® 20 mg si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétoconazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques);
- Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques);
- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);

• Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytone, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg;

... Médicament

tel que la  
par voie  
stration de

ment de  
dication

OEDES 20mg

14 gélules

6 118001 100071

LOT 211149

EXP 04/2024

PPV 52.80DH

# VITANEVRIL FORT 100 mg

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) par unité de prise

Benfotiamine ..... 100 mg

### Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée ..... osp un comprimé

Excipient à effet notable : Saccharose ; Lactose monohydrate.

## 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.

- prépharmacothérapie (par exemple : malabsorption due à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b).

- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyalcoolurie.

- proposé dans d'autres polyalcooluries supposées d'origine toxicitairelle.

- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

## 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence :

2 à 4 fois

DANS 1

L'ORDONNANCE

6. CONT

ATTENTION

DANS 0

Ce médicament

- Intolérance

- Ne pas

EN CAS

DE VOUS

7. EFFETS

Sans oblige

N'HESITEZ

VOUS A

ET GÉNA

## 8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### EXCERENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlons-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## 10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## 11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE UN VÉHICULE OU A MANIPULER DES APPAREILLAGES

Sans objet.

## 12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE

Sans objet.

## 13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

## 14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance

Le présent médicament ne contient pas de substances psychoactives.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.

Il est conseillé de ne pas conduire de véhicule ou de manipuler des appareillages.





Comprimé  
Voie orale

# CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

## FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boîte de 30 comprimés

## COMPOSITION (par comprimé) :

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucre, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

## PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et huiles essentielles de fenouil qui agissent en synergie pour renforcer l'action du charbon végétal en éliminant les gaz intestinaux, et en luttant contre les spasmes, tout en procurant plus de confort intestinal.

## UTILISATIONS :

CARBOSORB® est recommandé en cas de : Ballonnement intestinal, digestion difficile et Troubles Fonctionnels Intestinaux (TFI).

## CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec un verre d'eau avant les principaux repas.
- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Il est recommandé de prendre CARBOSORB® à distance des médicaments.
- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**CARBOSORB®**



8 032578 475494

Lot:  
À consommer de  
préférence avant le:

220995

12/2027

PPC: 79,50 DH



8 032578 475494

# QUINOLOX® 200

## Ofloxacine

### Formes et présentations :

Comprimés : Boîte de 10

Comprimés : Boîte de 20

### Composition :

Ofloxacine (DCI)..... 200 mg

Excipients q.s.p..... 1 comprimé

Excipients à effet nôtoire : lactose

### Propriétés :

- Ofloxacine est un antibiotique de synthèse appartenant à la famille des fluoroquinolones. Le spectre antibactérien naturel de l'ofloxacine est le suivant :

- espèces habituellement sensibles : *Echerichia coli*, *Citrobacter*, *Proteus mirabilis*, *Proteus indole +*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia enterolitica*, *Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli*, *Aeromonas hydrophila*, *Plesiomonas*, *Haemophilus influenzae* et *para-influenzae*, *Haemophilus ducreyi*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Branhamella catarrhalis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus coagulase négative*, *Clostridium perfringens*, *Mycoplasma*, *Chlamydia trachomatis*, *Legionella*;

- espèces habituellement résistantes : *Bactérides fragiles*, *Clostridium difficile*, *Listeria*, *Nocardia*.

Les *Staphylococcus aureus* résistants à la méticilline sont généralement résistants à l'ensemble des fluoroquinolones.

### Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte au traitement des infections urinaires, gynécologiques, ostéoarticulaires, bronchiques et ORL et intervient aussi dans le traitement des infections sévères dans les manifestations prostatiques.

### Contre-indications :

- Allergie aux médicaments du groupe des quinolones.
- Epilepsie.
- Déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase.
- Enfants et adolescents en période de croissance.
- Antécédents de tendinopathie avec une fluoroquinolone.
- Femme enceinte ou qui allaite.

### Effets indésirables :

- Troubles digestifs : nausées, gastralgies, diarrhées, vomissements.
- Manifestations cutanées allergiques.
- Douleurs musculaires et/ou articulaires, tendinites.
- Troubles neurologiques : céphalées, troubles de la vision, vertiges; exceptionnellement, hallucinations signalées chez les personnes âgées.
- Augmentation modérée des transaminases et de la créatininémie.

### Mises en garde et précautions d'emploi :

- Eviter l'exposition au soleil et aux rayonnements UV en raison du risque de photosensibilisation.
- L'ofloxacine doit être administrée à distance des yeux.
- La posologie doit être adaptée chez les sujets présentant une insuffisance rénale.

### Posologie et mode d'emploi :

- Réservé à l'adulte

La posologie habituellement est de 400 mg/j, soit 1 comprimé matin et 1 comprimé soir. Dans certaines infections bronchiques, la dose est de 400 mg/j en une seule prise, soit 2 comprimés en une seule fois. Cette posologie peut augmenter selon la gravité de l'infection.

- Ne pas laisser à la portée des enfants

- Liste I

