

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M21- Q060508

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 50047

Société : RAM - 161783

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

OKACHA KEBIR

Date de naissance :

1934

Adresse :

OULED AZZOUIZ Bloc 06 NR 35
OULFA Casablanca

Tél. 05 22 01 30 87

Total des frais engagés : 1162,60 DH

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 10/05/2023

Nom et prénom du malade : BADRE ZAHRA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Infarctus

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare ne pas avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10-09-2023	ESR : Ech		350. 100	G

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. MOULAY AHMED Lot. 14000 Casablanca - Tél. 0522 65 86 00 C.C. 0522 65 86 00 Casablanca - Tél. 0522 65 86 00 C.C. 0522 65 86 00	10-5-23	757,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	17/5/23	b40	550 Fr.

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISÉ ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION


Dr. Abdellatif LAKHSSASSI

Spécialiste des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Montpellier

Membre de la Société Française
de Cardiologie

Ancien Chef de Service de Cardiologie
des Polycliniques de la Sécurité Sociale



الدكتور عبد اللطيف الخصافي

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بمونبولي

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض القلب

رئيس قسم أمراض القلب سابقاً

بمصحات الضمان الاجتماعي

Casablanca, le 10.05.2023

الدار البيضاء في

BADRE ZAHRA

x 3 m
=

341⁶⁰

, 1 LAZ-EX 40

(2)

21 درايمات 10 جم

pmu 11 جم

~~103,80 x 51~~ 51 Aldacton 75

اكزوميديس

محلول

14,00



قامة 45

~~20,00 x 75~~ 31 Sotom

(2)

112 درايمات 1 جم
10 درايمات 0 جم

~~25,00 x 2~~ 40 Difusine

(2)

112 درايمات

14,00

51 Heyosalic 50ml

PHARMACIE MOULAY AHMED
Lot. 101 - Avenue 6 Oulad Aissa
Casablanca - Tel.: 05 22 94 06 06

الدكتور عبد اللطيف الخصافي
Dr. DAKHSSASSI Abdellatif
Cardiologue
33, Boulevard Abdellatif Ben Kaddour
Tél.: 05 22 94 06 06

CJ

33، شارع عبد اللطيف بن قدور - إقامة بيلافيستا II - شقة 4 - الطابق 2 - الدار البيضاء

33, Bd. Abdellatif Ben Kaddour - Rés. Bella Vista II - Appt. N° 4 - 2ème Etage - Casa

GSM : 06 61 14 48 64 - المحمول : Fax : 05 22 94 06 06 - الهاتف : Tél.: 05 22 94 06 06

Lasix® 40 mg

Lasix® 20 mg/2 ml

Furosemide

SANOFI 

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrite, même en cas de symptômes identiques, car :

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la

**LASILIX 40MG
20CP SEC**

quelqu'un

P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

LASILIX 40 mg comprimés :

Furosemide 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

LASILIX 20 mg/2ml :

Furosemide 20 mg/2 ml.

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Formes pharmaceutiques et présentations

LASILIX 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

LASILIX 20 mg/2 ml : solution injectable,

ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Voie orale :

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium,
- de l'hypertension artérielle.

Voie injectable :

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiolologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
- poussées hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (*rétention de sel*),
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :




NOTICE : INFORMATION

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg.

comprimé sécable



Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrenoate de potassium, l'éplérénone, le triamtériène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus), médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-




NOTICE : INFORMATION

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg.

comprimé sécable



Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrenoate de potassium, l'éplérénone, le triamtériène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus), médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-



NOTICE : INFORMATION

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg.

comprimé sécable



Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrenoate de potassium, l'éplérénone, le triamtériène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus), médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-



NOTICE : INFORMATION

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg.

comprimé sécable



Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrenoate de potassium, l'éplérénone, le triamtériène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus), médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-




NOTICE : INFORMATION

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg.

comprimé sécable



Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrenoate de potassium, l'éplérénone, le triamtériène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus), médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-

SINTROM® 4mg, Comprimé

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la referer.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

20/03

N° Lot :

dition d'excès. Sintrom donne

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut également être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :
 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin saignez éventuellement. Ainsi, signez notamment digestifs, et si vous avez un ulcère de l'estomac, un accident vasculaire.

Sintrom sur votre organisme.
Interaction avec les produits de

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En général, l'utilisation de ce grossesse. Prenez votre méde-

En cas de besoin, votre méde-

Si vous souhaitez être encor-

particulier, votre traitement se

L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE,

OU DE L'ALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE

MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les com-

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire

SINTROM n'a pas d'influence

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte m-

cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable

Ce médicament contient du

patients présentant une int-

ou un syndrome de maladie

héritaires rares).

3. COMMENT PRENDRE

- Instruction pour un bon

Posologie, mode et/ou voie

et durée du traitement.

Posologie

Respectez strictement la poso-

Mises en garde spéciales

A titre indicatif :

La première dose est choisie

Puis la dose est modifiée p-

pour équilibrer votre traitemen-

Les modifications de dose sont

possible celui qui suit votre

Mode d'administration.

VOIE ORALE : avaler les

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans

l'efficacité du traitement. L

Une prise par jour. Il est po-

puisse modifier la dose de

Dans tous les cas, respecter

Durée du traitement

Selon prescription méde-

Le comprimé peut être

Symptômes et conseil

Si vous avez pris plus de

Consultez immédiatement

Un surdosage peut être

- l'apparition d'un œdème

• un INR supérieur à 4,5

Dans ces situations, il faut

Dans certains cas, le traitemen-

traitement devra être arrêté

Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre

deux fois la dose prévue.

La prise du comprimé doit

SINTROM® 4mg, Comprimé

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la referer.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

20/03

N° Lot :

dition d'excès. Sintrom donne

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut également être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :
 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin saignez éventuellement. Ainsi, signez notamment digestifs, et si vous avez un ulcère de l'estomac, un accident vasculaire.

Sintrom sur votre organisme.
Interaction avec les produits de

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En général, l'utilisation de ce grossesse. Prenez votre méde-

En cas de besoin, votre méde-

Si vous souhaitez être encor-

particulier, votre traitement se

L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE,

OU DE L'ALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE

MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les com-

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire

SINTROM n'a pas d'influence

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte m-

cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable

Ce médicament contient du

patients présentant une int-

ou un syndrome de maladie

héritaires rares).

3. COMMENT PRENDRE

- Instruction pour un bon

Posologie, mode et/ou voie

et durée du traitement.

Posologie

Respectez strictement la poso-

Mises en garde spéciales

A titre indicatif :

La première dose est choisie

Puis la dose est modifiée p-

pour équilibrer votre traitemen-

Les modifications de dose sont

possible celui qui suit votre

Mode d'administration.

VOIE ORALE : avaler les

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans

l'efficacité du traitement. L

Une prise par jour. Il est po-

puisse modifier la dose de

Dans tous les cas, respecter

Durée du traitement

Selon prescription méde-

Le comprimé peut être

Symptômes et conseil

Si vous avez pris plus de

Consultez immédiatement

Un surdosage peut être

- l'apparition d'un œdème

• un INR supérieur à 4,5

Dans ces situations, il faut

Dans certains cas, le traitemen-

traitement devra être arrêté

Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre

deux fois la dose prévue.

La prise du comprimé doit

SINTROM® 4mg, Comprimé

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la referer.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

20/03

N° Lot :

dition d'excès. Sintrom donne

Sintrom sur votre organisme. Interaction avec les produits de

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse.

En général, l'utilisation de ce grossesse, Prenez votre méde-

En cas de besoin, votre mé-

anticoagulant pendant votre gro-

Si vous souhaitez être encein-

particulier, votre traitement se

L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE,

OU DE L'ALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE

MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les com-

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire.

SINTROM n'a pas d'influence

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte m-

cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable.

Ce médicament contient du

patients présentant une intol-

ou un syndrome de maladie

héritaires rares).

3. COMMENT PRENDRE

• Instruction pour un bon

Posologie, mode et/ou voie

et durée du traitement.

Posologie

Respectez strictement la poso-

Mises en garde spéciales

A titre indicatif :

La première dose est choisie

Puis la dose est modifiée pour

équilibrer votre traitement.

Les modifications de dose sont

possible celui qui suit votre

Mode d'administration.

VOIE ORALE : avaler les

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans

l'efficacité du traitement.

Une prise par jour. Il est pos-

sible modifier la dose de

Dans tous les cas, respecter

Durée du traitement.

Selon prescription médicale

Le comprimé peut être

Symptômes et contre-indications

Si vous avez pris ce

Consultez immédiatement

Un surdosage peut être

• l'apparition d'un œdème

• un INR supérieur à

Dans ces situations, il faut

Dans certains cas, le

traitement devra être

Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre

deux fois la dose prévue.

La prise en deux fois

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :

 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin

sache que vous prenez ce

notamment digestifs, et si vous

avez un ulcère de l'estomac,

ou un accident vasculaire

SINTROM® 4mg, Comprimé

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la referer.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

20/03

N° Lot :

dition d'excès. Sintrom donne

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut également être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :
 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin saignez éventuellement. Ainsi, signez notamment digestifs, et si vous

un ulcère de l'estomac,

un accident vasculaire

Condition d'excès. Sintrom donne

Sintrom sur votre organisme.
Interaction avec les produits de

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse.

En général, l'utilisation de ce grossesse, Prenez votre méde-

En cas de besoin, votre mé-

anticoagulant pendant votre gro-

Si vous souhaitez être encen-

particulier, votre traitement se

L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE,

OU DE L'ALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE

MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les com-

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à condu-

SINTROM n'a pas d'influen-

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte m-

cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable.

Ce médicament contient du

patients présentant une int-

ou un syndrome de maladie

héritaires rares).

3. COMMENT PRENDRE

- Instruction pour un bon

Posologie, mode et/ou voie

et durée du traitement.

Posologie

Respectez strictement la poso-

Mises en garde spéciales

A titre indicatif :

La première dose est choisie

Puis la dose est modifiée p-

pour équilibrer votre traitemen-

Les modifications de dose sont

possible celui qui suit votre

Mode d'administration.

VOIE ORALE : avaler les

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans

l'efficacité du traitement. L

Une prise par jour. Il est po-

puisse modifier la dose de

Dans tous les cas, respecter

Durée du traitement.

Selon prescription méde-

Le comprimé peut être

Symptômes et conseil

Si vous avez pris p-

Consultez immédiatement

Un surdosage peu

- l'apparition d'un

- un INR supérieur

Dans ces situations, il

Dans certains cas, le traitemen-

Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre

deux fois la dose prévue.

La prise de deux fois la

SINTROM® 4mg, Comprimé

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la referer.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

20/03

N° Lot :

dition d'excès. Sintrom donne

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut également être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :
 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin saignez éventuellement. Ainsi, signez notamment digestifs, et si vous avez un ulcère de l'estomac, un accident vasculaire.

Sintrom sur votre organisme.
Interaction avec les produits de

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En général, l'utilisation de ce grossesse. Prenez votre méde-

En cas de besoin, votre méde-

Si vous souhaitez être encor-

particulier, votre traitement se

L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE,

OU DE L'ALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE

MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les com-

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire

SINTROM n'a pas d'influence

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte m-

cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable

Ce médicament contient du

patients présentant une int-

ou un syndrome de maladie

héritaires rares).

3. COMMENT PRENDRE

- Instruction pour un bon Posologie, mode et/ou ve-

tion et durée du traitemen-

Posologie

Respectez strictement la p-

Mises en garde spéciales

A titre indicatif :

La première dose est choisi-

Puis la dose est modifiée p-

pour équilibrer votre traite-

Les modifications de dose

possible celui qui suit votre

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les c-

Fréquence d'administration

La prise régulière et san-

l'efficacité du traitement. L-

Une prise par jour. Il est po-

puissez modifier la dose d-

Dans tous les cas, respe-

Durée du traitement

Selon prescription mé-

Le comprimé peut être

Symptômes et contre-indications

Si vous avez pris p-

Consultez immédia-

Un surdosage peu-

- l'apparition d'un

- un INR supérieur

Dans ces situations

suit.

Dans certains cas,

traitement devra é-

Conduite à tenir e-

Si vous oubliez de

deux fois la dose p-

La prise d'un compri-

SINTROM® 4mg, Comprimé

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la referer.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

20/03

N° Lot :

dition d'excès. Sintrom donne

Sintrom sur votre organisme. Interaction avec les produits de

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse.

En général, l'utilisation de ce grossesse, Prenez votre méde-

En cas de besoin, votre mé-

anticoagulant pendant votre gro-

Si vous souhaitez être encein-

particulier, votre traitement se

L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE,

OU DE L'ALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE

MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les com-

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire.

SINTROM n'a pas d'influence

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte m-

cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable.

Ce médicament contient du

patients présentant une intol-

ou un syndrome de maladie

héritaires rares).

3. COMMENT PRENDRE

• Instruction pour un bon

Posologie, mode et/ou voie

et durée du traitement.

Posologie

Respectez strictement la poso-

Mises en garde spéciales

A titre indicatif :

La première dose est choisie

Puis la dose est modifiée pour

équilibrer votre traitement.

Les modifications de dose sont

possible celui qui suit votre

Mode d'administration.

VOIE ORALE : avaler les

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans

l'efficacité du traitement.

Une prise par jour. Il est pos-

sible modifier la dose de

Dans tous les cas, respecter

Durée du traitement.

Selon prescription médicale

Le comprimé peut être

Symptômes et contre-indications

Si vous avez pris ce

Consultez immédiatement

Un surdosage peut être

• l'apparition d'un œdème

• un INR supérieur à

Dans ces situations, il faut

Dans certains cas, le

traitement devra être

Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre

deux fois la dose prévue.

La prise en deux fois

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :

 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin

sache que vous prenez ce

notamment digestifs, et si vous

avez un ulcère de l'estomac,

ou un accident vasculaire

SINTROM® 4mg, Comprimé

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la referer.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

20/03

N° Lot :

dition d'excès. Sintrom donne

Sintrom sur votre organisme. Interaction avec les produits de

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse.

En général, l'utilisation de ce grossesse, Prenez votre méde-

En cas de besoin, votre mé-

anticoagulant pendant votre gro-

Si vous souhaitez être encein-

particulier, votre traitement se

L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE,

OU DE L'ALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE

MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les com-

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire.

SINTROM n'a pas d'influence

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte m-

cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable.

Ce médicament contient du

patients présentant une intol-

ou un syndrome de maladie

héritaires rares).

3. COMMENT PRENDRE

• Instruction pour un bon

Posologie, mode et/ou voie

et durée du traitement.

Posologie

Respectez strictement la poso-

Mises en garde spéciales : A titre indicatif :

La première dose est choisie

Puis la dose est modifiée p-

pour équilibrer votre traitemen-

Les modifications de dose sont

possible celui qui suit votre

Mode d'administration.

VOIE ORALE : avaler les c-

Fréquence d'administration.

La prise régulière et sans

l'efficacité du traitement. L

Une prise par jour. Il est po-

puisse modifier la dose de

Dans tous les cas, respecter

Durée du traitement.

Selon prescription médicam

Le comprimé peut être

Symptômes et contre-indications.

Si vous avez pris plus de

Consultez immédiatement un

Un surdosage peut être

• l'apparition d'un œdème

• un INR supérieur à 4.

Dans ces situations, il faut

Dans certains cas, le traitemen

traitement devra être arrêté.

Conduite à tenir.

Si vous oubliez de prendre

deux fois la dose prévue, prenez

La prise du comprimé au

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :

 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin

sache que vous prenez ce médicament.

notamment digestifs, et si vous

avez un ulcère de l'estomac.

ou un accident vasculaire.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg

Digoxine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'en lire les informations à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un médecin. Il est nocif, même si les signes de leur maladie sont très faibles.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre médecin aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas dans la liste ci-dessous.



6 118001 040117

DIGOXINE 0,25 mg

(Digoxine),

30 comprimés

BOTTU S.A.

PPV: 25 DH 00

pharmacien

à d'autre

docteur

en pharmacie

à l'hôpital

à la clinique

à la pharmacie

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg

Digoxine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'en lire les informations à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un médecin. Il est nocif, même si les signes de leur maladie sont très faibles.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre médecin.



6 118001 040117

DIGOXINE 0,25 mg

(Digoxine),

30 comprimés

BOTTU S.A.

PPV: 25 DH 00

phacien

à d'aut

écin

0.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé et dans quels emballages ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?
3. Comment prendre DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?

Classe pharmacothérapeutique - GLUOSIDE CARDIOTONIQUE

code ATC : C01AA05

Ce médicament est un tonicardiaque, il augmente la force de contraction cardiaque et possède des propriétés antiarythmiques (il régularise le rythme cardiaque).

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement de l'insuffisance cardiaque,
- certains troubles du rythme cardiaque.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé si :

- si vous êtes allergique à la digoxine ou à l'un des autres composants de ce médicament.


Dr. Abdellatif LAKHSSASSI

Spécialiste des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Montpellier

Membre de la Société Française
de Cardiologie

Ancien Chef de Service de Cardiologie
des Polycliniques de la Sécurité Sociale



الدكتور عبد اللطيف الخصافي

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بمونبولي

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض القلب

رئيس قسم أمراض القلب سابقا

بعض مسحات الضمان الاجتماعي

Casablanca, le 10.05.2023 الدار البيضاء في

Boulevard ZAHRA

TP

ENR

الدكتور عبد اللطيف الخصافي
Dr. LAKHSSASSI Abdellatif
Cardiologue
33, Boulevard Abdellatif Ben Kaddour
Tél: 05 22 94 06 06

33، شارع عبد اللطيف بن قدور - إقامة بيلافستا II - شقة 4 - الطابق 2 - الدار البيضاء
33, Bd. Abdellatif Ben Kaddour - Rés. Bella Vista II - Appt. N° 4 - 2ème Etage - Casa
GSM : 06 61 14 48 64 - الفاكس : 05 22 94 00 60 - المحمول : Tél.: 05 22 94 06 06



مختبر الحمد للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale
Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie
Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte
contre les Infections Nosocomiales

FACTURE N : 230500301
INPE : 093061372

Casablanca le 17-05-2023

Mme Zahra BADRE

Date de l'examen : 17-05-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin TP sous traitement	E11.5 B40	E B

Total des B : 40

TOTAL DOSSIER : 55.00DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cinquante-cinq dirhams

NB : Le laboratoire ne peut en aucun cas modifier la date de la facture. De ce fait, prière de respecter le délai de dépôt de vos dossiers médicaux auprès des organismes d'assurance.

Laboratoire de Biologie
Médicale AL HAMD
Dr Rabab ESSAYADE
Résidence Al Hamd D - RDC N° 25
El Oulfa, Rond Point Farah Salam, Casablanca

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Spermologie

El Oulfa, Rond Point Farah Salam, Résidence Al Hamd D, RDC N° 25 (à côté du café LA CASA) - Casablanca

Tél : 05 22 93 95 03 / GSM : 06 62 503 305 - Tél / Fax : 05 22 93 95 01

E-mail : laboalhamd.labm@gmail.com - IF : 18797235 - ICE : 001702411000002



LABORATOIRE

Al Hamd

مختبر الحمد للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie
Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte
contre les Infections Nosocomiales

Dossier ouvert le : 17-05-2023

Prélèvement effectué à : 12:58

Edition du : 17-05-2023



Mme BADRE Zahra

Né(e) le : 01-01-1934 (89 ans)

Dossier N° : 2305170043

Prescripteur : Dr ABDELLATIF LAKHSSASSI

HEMOSTASE

Taux de prothrombine (Patient sous traitement anti-coagulant)

Traitement :

SINTROM

Posologie :

J1: 1/2 CP , J2: 1 CP

07-03-2023

Témoin

13 sec

13

Malade :

49.1 sec

23.2

Taux de prothrombine

16 %

41

(Chronométrique STAGO - START 4)

Sujet sans traitement : 70-100%

Sujet sous AVK : 25-35%

I.N.R "International Normalised Ratio"

5.63

2.13

Résultat contrôlé.

Interprétations:

Indications cliniques	Valeur I.N.R
-Prévention récidives thromboses veineuses -Chirurgie à haut risque thrombotique -Traitement secondaire des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires -Prophylaxie des embolies systémiques -Prothèse cardiaque tissulaire, valvulopathie, infarctus du myocarde, fibrillation auriculaire, valve aortique Prothèse valvulaire mécanique (haut risque)	2 < INR < 3
Thrombose associée à des antiphospholipides	2,5 < INR < 3,5
Risque hémorragique	3 < INR < 4,5
	INR > 5

الحمد للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE


الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie
Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte
contre les Infections Nosocomiales



Teneur des aliments en Vitamine K en µg/100ml (AFSSAPS)

-Brocoli, chou vert, laitue, cresson, persil, huile de colza, huile de soja, épinard, choux de Bruxelles (100–1000).

-Haricot vert, fève, choux rouge, concombre, poireau, margarine ; huile d'olive, petit pois (10–100).

-Crème, beurre, fromage, orge, avoine, pain complet, son de blé, céréales de petit déjeuner, boeuf haché, foie de génisse et d'agneau, pomme, aubergine, myrtille, carotte, céleri, huile de maïs, courgette, date, figue, raisin, huile de palme, pêche, prune, rhubarbe, fraise, tomate, huile de tournesol (1–10).

-Lait de vache, yaourt, maïs, pain blanc, spaghetti, riz complet, farine blanche, pétales de maïs, bifteck, cuisse de poulet, saucisse de boeuf, avocat, banane, mangue, melon, pastèque, champignons, orange, navet, cacahuète, ananas, pomme de terre, oeuf, saumon et thon en conserve(0.1–1).

Demande validée par :Dr. R.Essayade

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un prompt rétablissement

Laboratoire de Biologie
médicale AL HAMD
Rabat - Maroc
N° 1
El Oulfa, Rond Point Farah Salam, Résidence AL HAMD D, RDC N° 25 (à côté du café LA CASA) - Casablanca

Page 2 / 2