

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
22 MAI 2023	220	200	300

Docteur BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
Rythmologue
40, Rue des Hôpitaux, 1^{er} Etage
Tél: 0522 49 14 14

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMA AIDA Mme. BENOUNA BEN 196, Bd. Zektouni, Casablanca Tel: 05 22 26 32 55 - Fax: 05 22 29 18 ICE : 00775600057	22/05/2023	2147.10

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
				<input type="text



CABINET DE CONSULTATION ET D'EXPLOITATION
CARDIOVASCULAIRE ET RYTHMOLOGIQUE

22 MAI 2023

Casablanca le :

Dr. Mohamed BENNANI

Diplômé en Cardiologie de la
Faculté de Médecine de
Casablanca

Diplômé en échocardiographie
de la faculté de Médecine de
Bordeaux, France

Diplômé en Rythmologie
et Stimulation Cardiaque
de la faculté de Médecine de
Montpellier, France

Diplômé en Cardiologie
Interventionnelle de la faculté
de Médecine de Montpellier,
France

Note D'honorai

Nadia Saber
LE DOCTEUR BENNANI MOHAMED

Vous remercie de votre confiance et

Vous adresse la note D'honorai de :

Correspondant à : *200*

Consultation

ECG

Réglage de pacemaker

Echocardiographie Doppler

EchoDoppler TSA

Holter TA

Holter ECG

Epreuve d'effort

Autre :

*Docteur BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
Rythmologue
des Hôpitaux, 1^{er} Etage
Tél: 0522 49 14 14*

Traitemen à ne pas interrompre et à continuer jusqu'à la prochaine visite. En cas d'urgence, partir directement à la clinique

40, Angle Rue des Hôpitaux et Rue Dubreuil, 1^{re} étage, Appt N° 1 - Quartier des Hôpitaux (en face du pavillon 28) - Casablanca
Tél : 0522 49 14 14 - 0522 49 22 22 - (Urgences) GSM : 06 62 80 57 57 - E-mail : smbennani@yahoo.fr



CABINET DE CONSULTATION ET D'EXPLORATION CARDIOVASCULAIRE ET RYTHMOLOGIQUE

Dr. Mohamed BENNANI

Diplômé en Cardiologie de la
Faculté de Médecine de
Casablanca

Diplômé en Échocardiographie
de la Faculté de Médecine de
Bordeaux, France

Diplômé en Rythmologie
et Stimulation Cardiaque
de la Faculté de Médecine de
Montpellier, France

Diplômé en Cardiologie
Interventionnelle de la Faculté
de Médecine de Montpellier,
France

Casablanca le :

22 mai 2023

Mme SABER NADIA

151,60
267,00
x3 1/ SULIAT 80/5 MG



Oban

1 cp/J midi

2/ ALDACTONE 50 MG

1 comprimé

Midi pendant 6 mois



Docteur BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
des Hôpitaux, 1^{er} Etage
Tél: 0522 49 14 14
Fax: 0522 49 14 14
ICE: 0014 1522 22222222



Docteur BENNANI Moh
Cardiologue Interventionnel
40, Rue des Hôpitaux, 1^{er} Etage
Tél: 0522 49 14 14

PHARMACIE AIDA
Mme. BENOUNA BENZAKOUR Hayat
196, Bd. Zerkouni - Casablanca
Tél: 05 22 26 32 53 - Fax: 05 22 29 35 55
ICE: 0014 1522 22222222

Traitement à ne pas interrompre et à continuer jusqu'à la prochaine visite. En cas d'urgence, partir directement à la clinique

40, Angle Rue des Hôpitaux et Rue Dubreuil, 1^{re} étage, Appt N°1 - Quartier des Hôpitaux (en face du pavillon 28) - Casablanca .

Tél. : 0522 49 14 14 - Fax : 0522 49 22 22 - (Urgences) GSM : 06 62 80 57 57 - E-mail: smbennani@yahoo.fr

Sur Rendez-vous

AT®
5 mg
/ 5 mg
10 mg
pôtes de 14, 28 et 56
Amlodipine

151,60

gros ou si vous re...

ndre ce médicament car elle contient des informations importantes

à votre pharmacien.
es personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1-Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2-Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3-Comment prendre SULIAT® ?
- 4-Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5-Comment conserver SULIAT® ?
- 6-Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.
- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, pour par conséquent une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopodine soit par le valsartan, chacun seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopodine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).

• Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

• Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aliskérine.

• Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose coronaire de degré élevé).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque aigüe ou infarctus aigu du myocarde.

• Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

• Aitez attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

• Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

• Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

• Si vous avez une affection touchant l'artère renale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

• La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.

• Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.

• Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

• Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.

• Avez-les comprimés avec un verre d'eau.

• Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlopodine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une toxicité.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

• Prenez-le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.

• Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

• L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.

• N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle, nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, position debout ; toux ; diasthème ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

• Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'aniété ; bondissements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlopodine seul ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlopodine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlopodine.

Amlopodine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

• Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.

• Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.

• Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.

• Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules.

• Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.

• Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise.

• Les effets indésirables suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou si il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : sensations vertigineuses, somnolence ; palpitations (conscience de vos battements cardiaques).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : hypertension, gonflement des cheveux (asthénie) ; douleur abdominale, mal au cœur (nausées).

AT®
5 mg
/ 5 mg
10 mg
pôtes de 14, 28 et 56
Amlodipine

151,60

gros ou si vous re...

ndre ce médicament car elle contient des informations importantes

à votre pharmacien.
es personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1-Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2-Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3-Comment prendre SULIAT® ?
- 4-Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5-Comment conserver SULIAT® ?
- 6-Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, pour avec conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopodine soit par le valsartan, chacun seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopodine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez

être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).

• Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

• Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aliskiren.

• Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose coronaire de degré élevé).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque aigüe ou infarctus aigu du myocarde.

• Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

• Aitez attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

• Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

• Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

• Si vous avez une affection touchant l'artère renale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

• La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
• Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
• Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.
Mode et voie d'administration :

• Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
• Avez-les comprimés avec un verre d'eau.
• Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage
Un surdosage avec le valsartan et l'amlopodine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une toxicité.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.
Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

• Prenez-le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
• Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage
Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

• L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
• N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle, nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des chevilles ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, position debout ; toux ; diasthème ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

• Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'aniété ; bouffées dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin. Effets indésirables rapportés avec l'amlopodine seul ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlopodine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlopodine.

Amlopodine
Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

• Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.

• Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.

• Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.

• Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules, desquamation et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson) ou autres réactions allergiques.

• Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.

• Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise.

• Les effets indésirables suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou si il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : sensations vertigineuses, somnolence ; palpitations (conscience de vos battements cardiaques).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : douleur abdominale, mal au cœur (nausées).

AT®
5 mg
/ 5 mg
10 mg
pôtes de 14, 28 et 56
Amlodipine

151, 60

glove ou si vous re...

ndre ce médicament car elle contient des informations importantes

à votre pharmacien.
es personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1-Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2-Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3-Comment prendre SULIAT® ?
- 4-Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5-Comment conserver SULIAT® ?
- 6-Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, pour avec conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopodine soit par le valsartan, chacun seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopodine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).

• Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

• Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aliskérine.

• Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose coronaire de degré élevé).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque aigüe ou infarctus aigu du myocarde.

• Si vous êtes dans l'un des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

• Aitez attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

• Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

• Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

• Si vous avez une affection touchant l'artère renale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

• La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.

• Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.

• Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

• Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.

• Avez-les comprimés avec un verre d'eau.

• Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlopodine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une toxicité.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

• Prenez-le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.

• Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

• L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.

• N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression d'évanouissement, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle, nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, position debout ; toux ; diasthème ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

• Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'aniété ; bouffées dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlopodine seul ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlopodine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlopodine.

Amlopodine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

• Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.

• Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.

• Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.

• Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules.

• Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.

• Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise.

Les effets indésirables suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou si il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : sensations vertigineuses, somnolence ; palpitations (conscience de vos battements cardiaques).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : hypertension, douleur abdominale, mal au cœur (nausées).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : transpiration excessive, éruption cutanée sur tout le corps, démangeaisons, apparition de vésicules.

AT®
5 mg
/ 5 mg
10 mg
pôtes de 14, 28 et 56
Amlodipine

151,60

gros ou si vous re...

ndre ce médicament car elle contient des informations importantes

à votre pharmacien.
es personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1-Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2-Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3-Comment prendre SULIAT® ?
- 4-Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5-Comment conserver SULIAT® ?
- 6-Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, pour avec conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopodine soit par le valsartan, chacun seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopodine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez

être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).

• Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

• Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aliskiren.

• Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose coronaire de degré élevé).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque aigüe ou infarctus aigu du myocarde.

• Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

• Aitez attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

• Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

• Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

• Si vous avez une affection touchant l'artère renale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.
Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avez-les comprimés avec un verre d'eau.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage
Un surdosage avec le valsartan et l'amlopodine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une toxicité.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

- Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle, nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue, asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.
- Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, position debout ; toux ; diasthème ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.
- Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'aniété ; bondissements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlopodine seul ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlopodine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlopodine:

Amlopodine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.
- Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules, desquamation et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson) ou autres réactions allergiques.
- Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.
- Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise.

Les effets indésirables suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou si il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

- Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : sensations vertigineuses, somnolence ; palpitations (conscience de vos battements cardiaques).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : hypertension, douleur dans la poitrine, douleur dans la tête, douleur dans la nuque, douleur dans la partie supérieure de l'estomac.

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : douleur dans la partie supérieure de l'estomac, douleur dans la tête, douleur dans la nuque, douleur dans la partie supérieure de l'estomac.

AT®
5 mg
/ 5 mg
10 mg
pôtes de 14, 28 et 56
Amlodipine

151, 60

glove ou si vous re...

ndre ce médicament car elle contient des informations importantes

à votre pharmacien.
es personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1-Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2-Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3-Comment prendre SULIAT® ?
- 4-Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5-Comment conserver SULIAT® ?
- 6-Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.
- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, pour par conséquent une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopodine soit par le valsartan, chacun seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopodine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).

• Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

• Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aliskiren.

• Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose coronaire de degré élevé).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque aigüe ou infarctus aigu du myocarde.

• Si vous êtes dans l'un des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

• Aitez attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

• Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

• Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

• Si vous avez une affection touchant l'artère renale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

• La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.

• Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.

• Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.
Mode et voie d'administration :

• Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.

• Avez-les comprimés avec un verre d'eau.

• Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.
Un sardouage avec le valsartan et l'amlopodine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une toxicité.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

• Prenez-le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.

• Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

• L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.

• N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression d'évanouissement, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle, nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, position debout ; toux ; diasthème ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

• Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'aniété ; bondissements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlopodine seul ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlopodine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlopodine.

Amlopodine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

• Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.

• Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.

• Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.

• Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules.

• Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.

• Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise.

• Les effets indésirables suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou si il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : sensations vertigineuses, somnolence ; palpitations (conscience de vos battements cardiaques).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : hypertension, douleur abdominale, mal au cœur (nausées).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : transpiration excessive, éruption cutanée sur tout le corps, démangeaisons, spasmes musculaires.

AT®
5 mg
/ 5 mg
10 mg
pôtes de 14, 28 et 56
Amlodipine

151,60

gros ou si vous re...

ndre ce médicament car elle contient des informations importantes

à votre pharmacien.
es personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1-Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2-Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3-Comment prendre SULIAT® ?
- 4-Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5-Comment conserver SULIAT® ?
- 6-Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, pour avec conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopodine soit par le valsartan, chacun seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopodine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).

• Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

• Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aliskérine.

• Si vous présentez un choc, y compris des cardiogéniques (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

• Aitez attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

• Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

• Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

• Si vous avez une affection touchant l'artère renale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avez-les comprimés avec un verre d'eau.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression d'évanouissement, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

- Fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle, nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue, asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.
- Peu fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, position debout ; toux ; diasthème ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.
- Rare (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'aniété ; bondissements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlopodine seul ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlopodine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlopodine:

Amlopodine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.
- Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules, desquamation et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson) ou autres réactions allergiques.
- Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.
- Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise.

Les effets indésirables suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou si il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

- Fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : sensations vertigineuses, somnolence ; palpitations (conscience de vos battements cardiaques).
- Peu fréquent (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : hypertension, gonflement des cheveux (asthénie) ; douleur abdominale, mal au cœur (nausées).

AT®
5 mg
/ 5 mg
10 mg
pôtes de 14, 28 et 56
Amlodipine

151,60

glove ou si vous re...

ndre ce médicament car elle contient des informations importantes

à votre pharmacien.
es personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1-Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2-Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3-Comment prendre SULIAT® ?
- 4-Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5-Comment conserver SULIAT® ?
- 6-Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Code ATC : C09DB01

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

- L'Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.
- Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, pour par conséquent une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopodine soit par le valsartan, chacun seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez **jamais** SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopodine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).

• Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

• Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aliskérine.

• Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose coronaire de degré élevé).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque aigüe ou infarctus aigu du myocarde.

• Si vous êtes dans l'un des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

• Aitez attention avec SULIAT® dans les cas suivants :

• Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

• Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.

• Si vous avez une affection touchant l'artère renale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

• La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.

• Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.

• Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

• Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.

• Avez-les comprimés avec un verre d'eau.

• Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlopodine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une toxicité.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

• Prenez-le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.

• Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

• L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.

• N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle, nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue, asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, position debout ; toux ; diasthème ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

• Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'aniété ; bondissements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlopodine seul ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlopodine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlopodine.

Amlopodine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

• Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.

• Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.

• Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.

• Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules.

• Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.

• Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise.

• Les effets indésirables suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou si il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

• Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : sensations vertigineuses, somnolence ; palpitations (conscience de vos battements cardiaques).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : hypertension, gonflement des cheveux (asthénie) ; douleur abdominale, mal au cœur (nausées).

• Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : transpiration excessive, éruption cutanée sur tout le corps, démangeaisons, apparition de vésicules.

ALDACTONE 50 mg 20 CPS
P.P.V. 58DH80
6 118001 170029

phar
Laboratoires
S.A.



INFORMATION DE L'UTILISATEUR

cam

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg,

Spironolactone

lire attentivement cette notice
avant de prendre ce médicament car
elle contient des informations
importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrénoate de potassium, l'éplérénone, le triamtériène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou

après une greffe pour éviter le rejet du

Les effets suivants peuvent survenir :

- une gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme) disparaissant généralement à l'arrêt du traitement mais pouvant persister dans de rares cas.
- des troubles digestifs.
- une inflammation du foie (hépatite).
- des crampes des membres inférieurs (jambes, pieds...).
- une somnolence.
- des troubles des règles chez la femme.
- une impuissance chez l'homme.
- un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).

ALDACTONE 50 mg 20 CPS
P.P.V. 58DH80
6 118001 170029

phar
Laboratoires
S.A.



INFORMATION DE L'UTILISATEUR

cam

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg,

Spironolactone

lire attentivement cette notice
avant de prendre ce médicament car
elle contient des informations
importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrénoate de potassium, l'éplérénone, le triamtériène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou

après une greffe pour éviter le rejet du

Les effets suivants peuvent survenir :

- une gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme) disparaissant généralement à l'arrêt du traitement mais pouvant persister dans de rares cas.
- des troubles digestifs.
- une inflammation du foie (hépatite).
- des crampes des membres inférieurs (jambes, pieds...).
- une somnolence.
- des troubles des règles chez la femme.
- une impuissance chez l'homme.
- un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).

ALDACTONE 50 mg 20 CPS
P.P.V. 58DH80
6 118001 170029

phar
Laboratoires
S.A.



INFORMATION DE L'UTILISATEUR

cam

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg,

Spironolactone

lire attentivement cette notice
avant de prendre ce médicament car
elle contient des informations
importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrénoate de potassium, l'éplérénone, le triamtétrène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou

après une greffe pour éviter le rejet du

Les effets suivants peuvent survenir :

- une gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme) disparaissant généralement à l'arrêt du traitement mais pouvant persister dans de rares cas.
- des troubles digestifs.
- une inflammation du foie (hépatite).
- des crampes des membres inférieurs (jambes, pieds...).
- une somnolence.
- des troubles des règles chez la femme.
- une impuissance chez l'homme.
- un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).

ALDACTONE 50[®] mg
spironolactone

P.P.V: 57DH70



FORMATION DE L'UTILISATEUR

ALDACTONE[®] 50 mg, 75 mg,

Spironolactone

Ericaure

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrénoate de potassium, l'épléronone, le triamtétrène ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus), médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des

Les effets suivants peuvent survenir :

- une gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme) disparaissant généralement à l'arrêt du traitement mais pouvant persister dans de rares cas.
- des troubles digestifs.
- une inflammation du foie (hépatite).
- des crampes des membres inférieurs (jambes, pieds...).
- une somnolence.
- des troubles des règles chez la femme.
- une impuissance chez l'homme.
- un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- une éruption cutanée.
- une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).

ALDA

LOT N°: 1289376

spironolactone, alt

UT. AV.: 12 22

P.P.V

39

30

1. IDENTIFICATION**a. DENOMINATION**

ALDACTAZINE®

b. COMPOSITION

Spironolactone

Altizide

Excipients q.s.p.

09366132/4

25 mg

15 mg

un comprimé

c. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé sécable, boîte de 20.

d. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUEDiurétique thiazidique et diurétique épargneur potassique en association
(C: système cardiovasculaire).**2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.
- Œdèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

3. ATTENTION !**a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
(CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.***b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

c. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.***d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

