

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire


Optique

Autres


Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule :	1014	Société :	16356A
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	BEN AÏSSA Abdellkader
Nom & Prénom :		1947	
Date de naissance :		Adresse : 41 Rue T. ATTASMAOUN	
Adresse :		EL OULFA CASABLANCA	
Tél. : 0668744052		Total des frais engagés :	
..... Dhs			

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :	
Date de consultation :	08/03/2023
Nom et prénom du malade :	SAIDI BEN AÏSSA Abdellkader
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	HYA dysm
Affection longue durée ou chronique :	<input type="checkbox"/> ALD <input type="checkbox"/> ALC
Pathologie :	Pathologie
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca
Signature de l'adhérent(e) : 

Le : 31/03/2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08/31/2023	34 U6 CEU	400 DT		INEL 2011309422

EXECUTION DES ORDONNANCES

INR - 091130922

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS 
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saâd SOULAMI

Professeur de Cardiologie

Spécialiste des maladies du Cœur et des vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Echo Doppler Couleur - Holter



الدكتور سعد السلمي

أستاذ سابق بكلية الطب بالدار البيضاء

اختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية

خريج كلية الطب بباريس

فحص القلب بالصدى والدوبلير بالألوان

Patient :

Bell Aissa Casablanca, le 8-MAR-2023

75,00 x 93 AM CALS 75
1 q-later

57,70 x 10
56,80 5 Al lactone 50 75
1 q-elev

SR 37,00 x 5
71,00 +
25,00 Aténor 100 1/Bep
1 q-elev

06/ 91,00 x 12 Stabzol 20 75/1q-elev

84,80 x 92 PREZAF 75
41,00 1 q-elev

PHARMACIE RÉSIDENCE ANNAIM
Siham GUERRAOUI
Docteur en Pharmacie
4, Résidence Annaim - Oulfa
Tel: 05 22 89 43 09 Casablanca

زنقة مصطفى المعاني (قرب زنقة أڭادير) - الدار البيضاء
356, Rue Mostafa El Maâni (coté Rue d'Agadir) - 1^{er} étage - Casablanca - E-mail: cabinetsoulami@gmail.com

Tél.: 05 22 82 18 84 / 06 62 88 90 91 - Tél. / Fax: 05 22 28 13 36 - Urgence : 06 65 14 69 96

Tél.: 05 22 82 18 84 / 06 62 88 90 91 - IF: 41802254 - ICE: 001755076000067 - IPN : 091130922

Tél.: 05 22 82 18 84 / 06 62 88 90 91 - IF: 41802254 - ICE: 001755076000067 - IPN : 091130922

STATICOL® 20 et 40 mg

Comprimé pelliculé
Simvastatine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

91,00

91,00

20 mg

1 comprimé pelliculé

Un médicament synthétique, utilisé pour développer à l'extérieur de l'utérus.

dans les 7 derniers jours, 40 mg si vous

DEMANDER

STATICOL®
OUT DURA

s, faiblesses n

inte musculai

ant :

de la gorge po

ment dans les ép

des membres et

lusions rhumatisme

musculaires (vascule

culture, et mallemen

les articulati

unissem

ble, perfo

abdomin

lissement

lation, fi

re

problèmes de

une ruptur

s.

vous avez u

ession anti

médicam

d'une enz

NS D'EMP

vez eu, et

l'alcool

STATICOL®

tre amené à

différent par

le sanguin a

llement par

tre un bilan sa

COL

Staticol® 20 mg 28 Comprimés enrobés sécables

91,00

91,00

laisser le cholestérol contenu dans un repas avant ou 4 heures après avoir pris le

TRÉMENT PRÉSCRITES PAR VOTRE

médecin, vous serez suivis attentivement par votre médecin (glycémie) et de graisse élevées dans le sang, si vous êtes informez votre médecin si vous avez une insuffisance respiratoire, de douleur musculaire, de sensibilité musculaire et de fatigue. Ceci, car en de rares cas, les personnes musculaires entraînant des lésions des reins ; et très rarement, le risque d'atteinte musculaire est plus grand avec de

STATICOL® 20 et 40 mg

Comprimé pelliculé
Simvastatine

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des réactions indésirables ou si vous avez des questions, informez votre médecin ou votre pharmacien, ou quelqu'un d'autre, même en cas de réaction indésirable non mentionnée dans cette notice.

91,00

P CP
20 mg...ou...40 mg

1 comprimé pelliculé

Classe de médicaments : Hypolipémiant : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Le taux total du mauvais cholestérol (cholestérol sain), STATICOL® augmente les niveaux du bon cholestérol (statines) dans le système sanguin. Votre cholestérol total est

Il s'agglomérera sur les parois de vos artères et à un rétrécissement des artères. Ce sont le cœur et le cerveau. Ce blocage

peut empêcher le mauvais cholestérol de augmenter votre risque de maladie cardiaque.

ce médicament. Si, si vous avez : primaire) ou des niveaux élevés de graisse dans

ment le taux de cholestérol dans le sang. (parce que vous avez un diabète, avez un problème cardiaque, etc.). STATICOL® peut diminuer la quantité de votre cholestérol

élevé de cholestérol. Votre médecin peut vous recommander régulièrement, vérifiez votre

de votre traitement en cours tout en tenant

liaison avec votre médecin ou votre pharmacien. C'est pourquoi il est recommandé par STATICOL®.

de simvastatine, par voie orale, par jour.

sur. Votre médecin pourra ajuster la posologie sur. Ne prenez pas plus de 60 mg par jour, sauf certains des médicaments listés ci-dessus,

sont haut taux de cholestérol et à fort risque de défaillances.

rébuter le traitement est de 10 mg par jour à

ans aliment.

andé d'arrêter. Il qui fait baisser le cholestérol contenant un 2 heures avant ou 4 heures après avoir pris, le

TRAITEMENT PRÉSCRITES PAR VOTRE

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- Ne prenez jamais STATICOL® dans les cas suivants :
 - Si vous êtes allergique (hypersensible) à la Simvastatine médicamenteuse (mentionnés dans la rubrique 6 : Contenu de ce médicament).
 - Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
 - Si vous êtes enceinte ou allaitez.
 - Si vous prenez un (des) médicament(s) avec un ou plusieurs de l'Itraconazole, du kétoconazole, du posaconazole infections fongiques.
 - De l'erythromycine, de la clarithromycine ou de la tétracycline.
 - Des inhibiteurs de protéase du VIH tels qu'indinavir, ritonavir utilisés dans le traitement des infections par le VIH.
 - De bocaprevir ou du telaprevir utilisés dans le traitement de la néfazodone (utilisée dans le traitement de la dépression).
 - De cobicistat.
 - De gemfibrozil (utilisé pour baisser le cholestérol).
 - De la clopidogrel (utilisé chez les patients transplantés).
 - Du danazol (une hormone de synthèse, utilisée pour développer à l'extérieur de l'utérus).
- Si vous prenez ou avez pris, dans les 7 derniers jours, fusidique (utilisé pour traiter les infections bactériennes).
- Ne dépassez pas la dose de STATICOL® 40 mg si vous avez une gène grave et rare liée au cholestérol.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER

EFFECTS NON SOUHAITÉS ET GENANTS
COMME TOUS LES MÉDICAMENTS, STATICOL® DES EFFETS INDESIRABLES, SURTOUT DURANT LES SEMAINES DE TRAITEMENT.

- Douleurs musculaires, sensibilité musculaire, faiblesses. Ces effets peuvent être graves, y compris une atteinte musculaire survient.
- Réactions d'hypersensibilité (allergie) incluant :
 - Confirement du visage, de la langue et/ou de la gorge.
 - Douleurs musculaires graves, généralement dans les jambes.
 - Éruption accompagnée d'une faiblesse des membres.
 - Douleur ou inflammation des articulations (rhumatismes).
 - Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite).
 - Blous exceptionnels, éruptions cutanées et gonflement de la tête, bouffées vasomotrices.
 - Essoufflements (dyspnée) et malaises.
 - Syndrome lupique (incluant éruption, troubles des articulations, douleur dans les muscles, etc.)

- Troubles du sommeil avec les symptômes suivants : jaunissement des yeux, sensation d'être fatigué) ou faible, perte d'appétit, inflammation du pancréas souvent avec douleur abdominale.
- Diminution des globules rouges (anémie).
- Endoussissement et faiblesse des bras et jambes.
- Maux de tête, sensation de fourmissement, étourdissements.
- Problèmes digestifs (douleur abdominale, constipation, nausées, éruption, démagéances, perte de cheveux, faiblesse).

- Sommeil agité (très rare).
- Mauvaise mémoire (très rare), perte de mémoire, confusion.
- Troubles de l'érection.
- Dépression.
- Inflammation des poumons causant des problèmes de respiration.
- Problèmes de tendon, parfois compliqués par une rupture.
- Problèmes du sommeil, y compris cauchemars.
- Troubles sexuels.

- Diabète. Vous pouvez débuter un diabète si vous avez un diabète. Vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle élevée. Votre médecin au cours de votre traitement avec ce médicament.

Biologiques :

L'augmentation de certains tests hépatiques et d'une enzyme dans le sang.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avertissements et précautions :

- Informez votre médecin :
 - De tout problème médical que vous avez ou avez eu.
 - Si vous consommez d'importantes quantités d'alcool.
 - Si vous avez ou avez eu une maladie du foie : STATICOL® peut entraîner une défaillance du foie.
 - Si vous devez subir une opération. Vous pouvez être amené à prendre un anesthésique.
 - Si vous êtes asthmatique, parce qu'un dosage différent peut entraîner une crise d'asthme.

Votre médecin devra vous prescrire un bilan sanguin avec symptômes de problèmes au foie pendant le traitement par STATICOL®. Votre médecin peut également vous prescrire un bilan sanguin après le début du traitement par STATICOL®.

Si vous prenez STATICOL®, vous serez suivis attentivement par votre médecin.

Si vous avez un diabète, vous serez suivis attentivement par votre médecin.

Si vous avez une insuffisance respiratoire, vous serez suivis attentivement par votre médecin.

En cas de douleurs musculaires, de sensibilité musculaire due à votre médicament traitant. Ceci, car en rares cas, les problèmes musculaires entraînent des lésions des reins ; et très rare.

Le risque d'atteinte musculaire est plus grand avec des

91,00

ATENOR® 100 mg
Comprimés sécables
Aténolol
Boîtes de 14 ; 28 ou 56

- Hypersensibilité à l'Aténolol,
 - Antécédent de réaction anaphylactique

notice avant de prendre des médicaments importants pour votre santé. Si vous avez besoin de la relire, demandez à votre pharmacien ou à votre médecin.

ent prescrit. Ne le c
r être nocif, même
ôtres.
ésirable, parlez-en à
sirable qui ne serait pa

est-il utilisé ?
avant de prendre

ET DANS QUI
QUANT/SELECT

mine certains effets, tation cardiovasculaire. suivants:

ngine de poitrine,

IS A CONNAITRE A
nt la prise du médic

iques obstructives a
t de maladie des bro

le traitement (défaillance),
et troisième
production cardiaque, et en

particulaire),
gements par minu

~~troubles artériels périphérique~~
troubles sévères (troubles circulatoires symétriques de engourdissements et troubles artériels périphériques dant sévères)

- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande rénale sécrétant des substances provoquant une hypertension severe),
 - Hypotension (diminution de la pression artérielle),

Amcard® 5 mg et 10 mg



Amlodipine
Comprimés

GEMPHARMA

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament a été prescrit spécialement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

ou si vous remarquez un effet indésirable



..... 10 mg
qsp un comprimé

TC : C08CA01.

ns :

u.

ois pour jour, qui pourra être
en fonction de la réponse au
10 mg.

e sujet âgé et l'insuffisant

d'association avec des
inhibiteurs de l'enzyme

IS N'AURIEZ DÛ :
pharmacien.

l'heure prévue, prenez la

rant la prise suivante, ne

ou si vous avez arrêté de
ques jours, contactez

nt pas été étudiées chez
ée.

énie, anorexie, nausées
ymes hépatiques. En cas

d'ictère, le traitement doit

lipine est prolongée chez
e produit avec précaution

en nombre suffisant,
que de l'Amlodipine
sure de précaution,
a grossesse.

lmodipine dans le lait
sible, l'administration

→ 75,20

ent en rapport avec
rs ou sensation de
urant les premières

semaines de tra

Comme avec les
la face peut ap

élèves.

On observe plus

augmentation de
angio-oedème, c

l'appétit, nausé

musculaires, my

impuissance, gyn

du sommeil, pa

dépressifs, malai

Comme avec les autres antagonistes calciques, les événements suivants

ont été rarement ra

arythmie. Ils peuvent

doivent faire discuter

INTERACTIONS MI

Déconseillé (par)

- Dantrolène (perfu

Dantrolène est pot

ont reçu l'associati

Nécessitant des p

-Alpha-1-bloquants

hypotenseur.

-Baclofène : majoration de l'effet antihypertenseur.

-Rifampicine : diminution des concentrations plasmatiques de l'antagoniste

du calcium par augmentation de son métabolisme hépatique.

-Itraconazole : risque m

hépatique de la dihyd

A prendre en comp

-Béta-bloquants : h

insuffisance cardia

-Antidépresseurs : r

isque d'hypotensi

-Corticoides, tétra

antihypertenseur (

-Neuroleptiques : o

orthostatique majo

Autres associati

Digoxine : l'Amlod

rénales de la digox

SURDOSE :

Un surdosage m

périphérique entraîn

probablement prolongé.

Toute hypotension consécutive à une intoxication

biologiques.

aire et la

STOCKAGE :

Ne pas dépas

Conserver à l'

GARDER HO

PRÉSENTATI

Amcard 5 mg

Amcard 10 m

CONDITION

Liste I (Table

Dernière mis

Laboratoires

254-260, Z.I.



PPV : 84DH80
PER : 01 / 24
LOT : K2 45



on et
illage.

28

Amcard® 5 mg et 10 mg

Amlodipine
Comprimés

GENPHARMA

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.


- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez des questions, demandez à votre pharmacien.

- C'est un médicament prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

- Si vous remarquez un effet indésirable, contactez votre pharmacien.

en. identiques, en à



CO
An
Ex
CL
Inh
INL
Ce
- Tr
- Tr
PO
Les
La d
au
Il
septembre, qui pourra être
ction de la réponse au
âgé et l'insuffisant
association avec des
iteurs de l'enzyme

semaine
Comme
la face
élèves
On ob
augmen
angio-o
l'appétit
muscul
impuls
du so
dépressif
Comme
ont été
arythm
doivent
INTERA
Décons
- Dantro
Dantrolé
ont reçu
Nécess
-Alpha-1
hypotens
-Baclofén
-Rifampic
du calcu
-Itracon
hépatiq
A prem
-Béta-b
insuffis
-Antidép
risque d
-Cortico
antihyp
-Neurole
orthostat
Autres a
Digoxine
rénale de
SURDOSSAGE :

Un surdosage massif pourrait provoquer une importante vasodilatation périphérique entraînant une hypotension systémique marquée et probablement prolongée. Toute hypotension consécutive à une intoxication aiguë nécessite une surveillance en unité de soins intensifs cardiologiques. Un vasoconstricteur peut être utilisé pour restaurer le tonus vasculaire et la pression artérielle. L'Amlodipine n'est pas dialysable.

STOCKAGE :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

Conserver à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉSENTATIONS :

Amcard 5 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

Amcard 10 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

CONDITION DE DELIVRANCE :

Liste I (Tableau A), uniquement sur ordonnance médicale.

Dernière mise à jour : juin 2011

Laboratoires GENPHARMA

254-260, Z.I. El Jadida - Maroc

PREZAR®

Losartan 50 mg

Comprimé pelliculé sécable, Boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la suivre.

PPV 84DH80
PER 12/23
LOT J3396-2

rimations à votre médecin ou à votre pharmacien.
d'auquel d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela
sérieux non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre

PPV: 84DH80
PER: 01/24
LOT: K245

difficultés à avaler ou

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'un patient d'une surveillance médicale en urgence ou d'un hospitalisation.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

Fréquents :

- Étourdissements,
- Ballonnements

artérielle (particulièrement après une prise de diurétiques),

à la dose tels que diminution de la pression

rate de magnésium, crise

PPV 84DH80
PER 04/25
LOT L1575

le sang (hypoglycémie),
le sang (hyperkaliémie),
ion rénale, y compris insuffisance rénale,
globules rouges dans le sang (anémie),
le sang, de la créatinine et du potassium

Le losartan (également connu sous le nom de valsartan) est un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II, une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale, une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

Indications thérapeutiques :

PREZAR® 50 mg

PPV 84DH80
PER 04/24
LOT K1231

type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie ≥ confirmées par des examens biologiques.

Un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine II doit être stabilisé

atrièle gauche. PREZAR®

soitement et Fréquemment
à votre médecin. Vérifiez

tre traitement quotidien
plié sécable sans l'avis

de votre médecin ou voi-

nement ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 50 mg

sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut

plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé

de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sécable).

La dose est trop forte ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou

PPV 84DH80
PER 04/24
LOT K1231

PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut

PPV 84DH80
PER 04/25
LOT L1575

PREZAR®

Losartan 50 mg

Veuillez à
• Garer
• Si vous
pourriez
• Si l'
médicament

Conseils
La...
LOSAI
Les...
Lacto...
Il OY-
Liste...
Clas...
Le losar...
une subs...
une augm...
voisaines sa...
une pression art...

PPV: 84DH80
PER: 05/24
LOT: K1477



Comprimé pelliculé sécable, Boîtes de 14 et 30

Utiliser ce médicament.

ions à votre médecin ou à votre pharmacien
un d'autre, même en cas de symptômes identiques, ce
table non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre

50 mg
de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry

des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est
veiseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit
l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des
et la dégradation de la fonction renale chez les patients ayant

PPV: 84DH80
PER: 03/25
LOT: L1008

type 2 présentant une insuffisance rénale et une proteinurie ≥
firmes par des examens biologiques.
un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de
tance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit
nitrile gauche. PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable

raîtement et Fréquence d'administration:
à votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre

votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est
difficile sécable sans l'aide de votre médecin.
ns de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre
à dose appropriée de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable
partant de continuer à prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé
être un contrôle régulier de votre pression artérielle.

1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet
aines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut,
rimes de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé
séable est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou

comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut
imes de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de
nelle.

à antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les
e ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques
inhibiteurs alpha glucosidases).

our. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque
jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100
aine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose
exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable
je de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable).
ment associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de
eur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des
ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas
peut-être nécessaire.

PPV: 84DH80
PER: 11/24
LOT: K3274




PPV: 84DH80
PER: 09/23
LOT: J2492



PPV: 45DH00
PER: 01/24
LOT: K246



PPV: 84DH80
PER: 02/23
LOT: J622



séable :
es composants
t préférable d'e
si vous pren
ble d'avoir de
50 mg, compre
angéosines, g
plus d'1 patient
REZAR® 50 mg
ssion
e, j., im do
purpura
habituel
AT), qui habi
souvent
avant
susceptib
af vous êtes en
percez ce stade de la grossesse.
Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR®.
• Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèv
• Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées,
organisme.
• Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent le q
sons sel pouvant conduire à une perte importante de liquide et de sel



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg, comprimé sécable

Spironolactone

Encadré

P.P.V: 57DH70
LOT: B25776
EXP: 12.2022

cette notice
ment car
is
pourriez avoir
ons,
votre

lorsqu'il vous a été
personnellement prescrit. Ne le donnez
pas à d'autres personnes. Il pourrait leur
être nocif, même si les signes de leur
maladie

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 57DH70



6 118001 170029

a connaître avant de prendre
ALDACTONE, comprimé sécable ?

- 3. Comment prendre ALDACTONE,
comprimé sécable ?
- 4. Quels sont les effets indésirables
éventuels ?

NE,

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 57DH70



6 118001 170029

appartenant à la famille
des diurétiques épargneurs de potassium.
Ce principe actif augmente la quantité
d'eau et de sodium éliminée par les urines
mais n'augmente pas l'élimination du
potassium (c'est pourquoi on parle « de
diurétiques épargneurs de potassium »).

P.P.V: 57DH70
LOT: B24677
EXP: 06.2022



2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais ALDACTONE,

Le principe actif de ce médicament
(la spironolactone) peut provoquer un test
positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si
vous prenez, avez récemment pris ou
pourriez prendre tout autre médicament,
notamment les médicaments suivants :
médicaments de la même famille que la
spironolactone (diurétiques épargneurs de
potassium : tels que l'amiloride, le
canrenoate de potassium, l'éplerénone, le
triamtérine ou le potassium),
médicament utilisé pour le traitement de
certaines tumeurs des glandes surrénales,
le mitotane,
certains médicaments utilisés avant ou
après une greffe pour éviter le rejet du
greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
médicaments destinés à baisser la tension
artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de
conversion et les antagonistes des
récepteurs de l'angiotensine II),
triméthoprime et triméthoprime-
sulfaméthoxazole.

ALDACTONE, comprimé sécable avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé :

- si vous êtes enceinte ou si vous pensez
l'être,
- si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
si vous pensez être enceinte ou planifiez
une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre
ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ALDACTONE, comprimé sécable contient du lactose et du sodium.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une
intolérance à certains sucres, contactez-le
avant de prendre ce médicament.
Ce médicament contient moins de 1 mmol
(23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire
qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?

Veillez à toujours prendre ce médicament
en suivant exactement les indications de
votre médecin ou pharmacien. Vérifiez
auprès de votre médecin ou pharmacien
en cas de doute.

Posologie

Utilisation chez les enfants

La dose est adaptée par le médecin en
fonction de l'âge et de la taille de l'enfant.

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 57DH70



6 118001 170029

P.P.V: 57DH70
LOT: B26708
EXP: 09.2022



es

ALDACTONE 50MG 20 CPS
P.P.V: 56DH80



6 118001 170029

ALDACTONE 50MG 20 CPS
P.P.V: 56DH80




6 118001 170029

ALDACTONE 50MG 20 CPS
P.P.V: 56DH80



6 118001 170029

ALDACTONE 50MG 20 CPS
P.P.V: 56DH80



6 118001 170029

ALDACTONE 50MG 20 CPS
P.P.V: 56DH80



6 118001 170029

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable

