

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00005080

Société :

(164272)

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HAMEDAINE BRIKA VENUE LITAMA

Date de naissance :

Adresse : Ham Hly Abdellah Rue N° 23

Tél. 0662 34 30 94

Total des frais engagés : 15M,70 Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

الدكتور بن حميس مصطفى  
خبير محلق لدى المحاكم  
الطب العصام  
713 شارع 2 مارس الدار البيضاء  
الهاتف : 0522 215 723 - 0522 211 307

Date de consultation : 25/05/2023

Nom et prénom du malade : HAMEDAINE BRIKA VENUE LITAMA Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25 Mai 2023	C2	200000		 <p>د/هassan el sayed الطب العام شارع 2 مارس الباري الهاتف: 0522 211 307 - 0522 215 723</p>

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	25/03/2018	21,40

## ANALYSES - RADIOPHARMACIES

ANNEXE 2 - RADIOSURVUE			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

#### BELEVE DES FBAIS ET HONOBABIES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

## **[Création, remont, adjonction]**

## nel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## Docteur M'hamed BENNIS

## MEDECINE GENERALE

## Echographie

**Expert assermenté prés les Tribunaux**  
**Ex - Médecin Militaire**

## Sur Rendez - vous



الدكتور محمد بنبيس

## الطب العام

### الفحص بالصدى

## خبر محالف لدى المحاكم طيس عسكري سافقا

الزيارة بالموعد

الدارالبيضاء فـ Casablanca, le ..... ٢٣, ٢٣, ٢٠٢٣

25/05/2023

Madame HAMEDDINE VEUVE LTAMA BRIKA

1/ QLEDIZ 20 MG CP BTE DE 28

1 cr après le repas matin et soir

2/ CLOPRAME 10mg Cps

1 cp avant le repas matin, midi et soir

### 3/ REFLUXAID SIROP

1 c à s avant le repas matin-midi et soir

4/ KALMAGAS TRANSIT CP

1 cu avant le repas matin midi et soir

卷之三

دكتور بشرس محمد  
خبير مصطفى لدى المعماكم  
الطب العام  
الطب البشري  
العنوان: 211-307  
الهاتف: 0522 211 307  
الfax: 0522 215 723



CONFIDENTIEL

PIÈCE JUSTIFICATIVE. DOCUMENT D'ACCÈS

à la vente de médicaments

# CLOPRAME®

## (Métoclompramide)

### DENOMINATION DU MEDICAMENT

- CLOPRAME® comprimé sécable, boîte de 40
- CLOPRAME® solution buvable, flacon de 130 ml avec seringue doseuse

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel contenu cette notice

1. Qu'est-ce que CLOPRAME® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLOPRAME® ?
3. Comment prendre CLOPRAME® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CLOPRAME® ?
6. Informations supplémentaires

### 1- QU'EST-CE QUE CLOPRAME® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### - Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité

CLOPRAME® est un antémétiqe. Il contient un médicament appelé "métoclompramide". Il agit sur une partie du cerveau pour prévenir les nausées ou les vomissements.

#### - Indications thérapeutiques

##### 1-1 Population adulte :

Cloprame® comprimé sécable et Cloprame® solution buvable sont utilisés chez les adultes dans :

- la prévention des nausées et vomissements retardés pouvant survenir après une chimiothérapie.
- la prévention des nausées et vomissements induits par la radiothérapie.
- le traitement des nausées et vomissements incluant les nausées et vomissements pouvant survenir en cas de migraine.

En cas de migraine, le métoclompramide peut être pris avec des médicaments agissant sur la douleur administrés par voie orale pour augmenter l'efficacité de ces médicaments.

##### 1-2 Population pédiatrique :

Cloprame® comprimé sécable et Cloprame® solution buvable sont indiqués chez les enfants (âgés de 1 à 18 ans) si un autre traitement est inefficace ou ne peut être utilisé pour prévenir les nausées et vomissements retardés pouvant survenir après une chimiothérapie.

Les comprimés de Cloprame® 10 mg ne conviennent pas aux enfants pesant moins de 30 kg.

D'autres formes pharmaceutiques (par exemple la solution buvable) doivent être utilisées.

### 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLOPRAME® ?

#### - Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

#### - Ne prenez jamais CLOPRAME® (Contre-indications)

Ne prenez pas Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable si :

- vous êtes allergique au métoclompramide ou à l'un des composants de ce médicament.
- vous avez une hémorragie, une obstruction ou une perforation dans l'estomac ou de l'intestin.
- vous avez ou pouvez avoir une tumeur rare de la glande surrenale, située près du rein (phéochromocytome).
- vous avez déjà eu des mouvements musculaires anormaux (dyskinésie tardive), à l'occasion d'un traitement médicamenteux.
- vous êtes épileptique.
- vous avez la maladie de Parkinson.
- vous prenez de la lévodopa (médicament pour la maladie de Parkinson) ou des agonistes dopamnergiques.
- vous avez déjà eu dans le sang des quantités anormales d'un pigment sanguin (méthémoglobinémie) ou un déficit en NADH cytochrome-b5.

Ne donnez pas de métoclompramide à un enfant âgé de moins de 1 an.

Cloprame® comprimé sécable n'est pas adapté aux enfants pesant moins de 30 kg, d'autres formes pharmaceutiques (par exemple la solution buvable) doivent être utilisées.

Ne prenez pas Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable si vous avez des antécédents de battements du cœur anormaux (tels que tout autre problème cardiaque).

- Faites attention avec CLOPRAME® (Mises en garde spéciale d'emploi)

Demandez l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre CLOPRAME® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable si :

- vous avez des antécédents de battements du cœur anormaux (tels que tout autre problème cardiaque).
- vous avez des anomalies dans votre sang du taux de sels minéraux sodium et le magnésium.
- vous prenez d'autres médicaments connus pour agir sur votre rythme cardiaque.
- vous avez un problème neurologique (cerveau).
- vous avez des problèmes au niveau du foie ou des reins. La dose peut être réduite.

Votre médecin pourra vous prescrire des examens sanguins pour contrôler votre état de santé. En cas de quantités anormales (méthémoglobinémie), le traitement doit être immédiatement et définitivement arrêté.

Vous devez attendre au moins 6 heures entre chaque prise, même en cas de rejet de la dose, afin d'éviter un surdosage.

Le traitement ne doit pas durer plus de 3 mois en raison du risque d'effets indésirables.

#### Cloprame® solution buvable :

La solution buvable contient (0,336 mg/ml) moins de 1 mmol (23 mg) de sodium, qu'elle est essentiellement "sans sodium".

La solution buvable contient du parahydroxybenzoate de méthyle et des réactifs allergiques avec urticaire et gêne respiratoire.

#### - Enfants et adolescents :

Des mouvements anormaux (troubles extrapyramidaux) peuvent survenir chez les jeunes enfants. Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 3 ans.

Les comprimés de Cloprame® 10 mg ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans.

D'autres formes pharmaceutiques (par exemple la solution buvable) doivent être utilisées.

#### - Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Si vous prenez, avec pris récemment ou allez prendre, d'autres médicaments ou médicaments ou pharmacien.

En effet, Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable peuvent aggraver certains médicaments.

De même, certains médicaments peuvent modifier l'effet de Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable. Ces médicaments sont :

- anticholinergiques (médicaments utilisés pour les nausées et vomissements).
- dérivés morphiniques (médicaments utilisés pour la douleur).
- médicaments sédatifs,
- médicaments utilisés pour traiter les troubles mentaux.
- digoxine (médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque).
- cyclosporine (médicament utilisé pour traiter certains problèmes de peau et de système immunitaire).
- mivacurium et suxamethonium (médicaments utilisés pour la chirurgie).
- fluoxétine et paroxétine (médicaments utilisés pour traiter l'anxiété et la dépression).

#### - Aliments et boissons (Interactions avec les aliments et boissons)

Ne pas prendre d'alcool pendant le traitement avec Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable.

#### - Interactions avec les produits de phytothérapie

Sans objet.

#### - Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou prendre un test de grossesse avant de prendre ce médicament.

Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable peut être pris pendant la grossesse.

Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable passe dans le lait maternel.

#### - Sportifs

Sans objet.

#### - Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser de la machinerie

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir somnolent, avoir des sismes, des saccades anormaux et une contracture générale.

avoir pris Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable peut entraîner une diminution de l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser de la machinerie.

#### - Excipients à effet notoire

Solution buvable : - parahydroxybenzoate de méthyle (0,336 mg/ml)

### 3- COMMENT PRENDRE CLOPRAME® ?

#### - Instruction pour un bon usage

Sans objet

#### - Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration

##### 3-1 Posologie des comprimés sécables et de la solution buvable

Toute indication (patients Adultes) :

La dose recommandée est de 10 mg par prise, jusqu'à 4 fois par jour.

La dose journalière maximale recommandée est de 40 mg.

La durée de traitement recommandée est de 1 à 3 mois.

#### Prévention des nausées et vomissements retardés après une chimiothérapie (enfants âgés de 1 à 18 ans)

La dose recommandée est de 0,1 à 0,15 mg/kg, jusqu'à 4 fois par jour.

La dose quotidienne maximale est de 0,5 mg/kg.

Vous ne devez pas prendre ce médicament plus de 4 fois par jour.

#### 3-2 Mode d'administration

##### - Comprimé sécable :

Cloprame® comprimé sécable n'est pas adapté aux enfants pesant moins de 30 kg.

D'autres formes pharmaceutiques (par exemple la solution buvable) doivent être utilisées.

##### - Solution buvable :

Utiliser la seringue pour administrer la solution buvable.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

La solution buvable doit être prise par voie orale.

**CLOPRAME® 10 mg**  
40 comprimés sécables  
PPU 17DH30  
EXP 01/2026  
LOT 28064 7

**CLOPRAME® 10 mg**  
40 comprimés sécables  
Barcode: 6 118000 030164



Comprimé  
Voie orale

# KALMAGAS® Transit

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

## COMPOSITION :

Charbon végétal activé, Rhubarbe (Rheum palmatum) extrait sec, Fenouil (Foeniculum vulgare) huile essentielle, Menthe poivrée (Mentha piperita) huile essentielle, Wakamé (Undaria pinnatifida), F.O.S (Fructo-Oligosaccharides).

## PROPRIÉTÉS :

KALMAGAS® Transit est à base de charbon végétal activé et d'actifs naturels dont la synergie contribue à éliminer les gaz et à soulager les spasmes intestinaux tout en facilitant le transit procurant ainsi un confort intestinal global.

## UTILISATION :

KALMAGAS® Transit  
associé à une const

## CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 à 3 fois par jour

## PRÉCAUTIONS :

- A utiliser en complément de l'alimentation
- Respecter la dose journalière recommandée
- Tenir hors de la portée des enfants
- Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

Complément alimentaire

Fabriqué par Pharmalife  
Importé et distribué au  
Autorisation ministère de

LOT : 220853  
PER : 11/2025  
PPC : 79,90dh

KALMAGAS®  
Transit



KALMAGAS®  
Transit

# REFLUXAID®

Comprimés à croquer anti-reflux

Sirop anti-reflux

Sticks anti-reflux

#### Dans quel cas utiliser REFLUXAID® :

REFLUXAID® est un dispositif médical à usage oral qui, grâce à son action mécanique, est destiné à être utilisé pour limiter les symptômes du reflux gastro-oesophagien et de l'oesophagite.

L'utilisation du produit limite la sensation de brûlure (brûlure d'estomac), de régurgitation, de la difficulté à avaler (dysphagie), de la déglutition douloureuse (odynophagie), de la toux, et de l'enrouement.

#### Composition :

**COMPRIMÉS À CROQUER** : Sorbitol, Alginate de Magnésium, Extrait d'Anisum Stellatum, Extrait de Foeniculum Vulgare, Extrait de Chamomilla Recutita, Extrait de Lavandula Angustifolia, Extrait de Tilia Platyphyllos, stéarate de magnésium, acésulfame K, sucralose, arômes.

**SIROP (BOUTEILLE ET STICKS)** : Alginat

Extrait de Chamomilla Recutita, Extrait Lavandula, Extrait d'Angustifolia, Extrait sodium, p-hydroxybenzoate, p-hydroxybe

#### Formes :

Boîte de 24 comprimés à croquer (1 g)

Sirop 250 ml avec doseur

Boîte de 24 sticks de 10 ml

#### Mode d'emploi :

**COMPRIMÉS À CROQUER** : 1-2

**SIROP (BOUTEILLE ET STICKS)** :

plus de 12 ans : 10-20 ml ou 1-2

12 ans : 1 demi-dose.

#### Contre-indications :

Ne pas utiliser en cas d'hypersen

LOT



2300704  
2026/01  
PPC 70 DHS

#### Avertissements :

Ne pas dépasser la dose recommandée. Le traitement et consulter un médecin avant la date d'expiration indiquée. La température peut affecter les caractéristiques de la qualité du produit entre 4°C et 30°C.

*Ne contient pas de gluten, de lactose*



Fabriqué par :  
Pharcomed S.r.l.



Distribué par :  
Promoplus Pha

Dispositif