

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M23-004939

165115

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10855 Société : RAN
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : PNC Réformé
 Nom & Prénom : ABRUQ NAWAL
 Date de naissance : 03/03/77
 Adresse : 06 Rue Abdelhak ben Nafyu Apt 9 Rés. El Honda Quartier Palmier Casablanca
 Tél. : 0669737996 Total des frais engagés : 3.959,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr BOUHADDIOUI Laila
ENDOCRINOLOGIE - DIABETOLOGUE
 Cachet du médecin : Tél. : 05 37 72 52 87/06 59 83 83 75
 IF : 34155421 INP : 101036317
 ICE 0016432500000050
 Date de consultation : 25.05.2023
 Nom et prénom du malade : ABRUQ Nawal Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : autre cancer
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : / /

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin
25/05/2023	C			
30/05/2023	C			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant des Honoraires
	30/5/23	7,15

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
A.M. Riad Tél: 05 37 71 05 06 05 23-05 37 71 50 60 25995358 - IF : 3349088	27/05/2023	B2150	326,000,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION			
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 B [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	
		COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. L. BOUHADDIOUI IHRAI

*Spécialiste en Endocrinologie
Maladies Métaboliques - Diabète*

Nutrition - Obésité - Stérilité

Maladies des Seins

*Diplômée de la Faculté de Médecine
de Montpellier*

الدكتورة بوحدوي اهراي ليلي

أختصاصية في أمراض

الغدد وداء السكري

خريجة كلية الطب

بمنبلي

Rabat, le 25/05/2023 الرباط في

N° ABROU Navval

- NFS, fente

- calcés, etc

- glycémie

- HbA1c

- cholest, LDL, HDL, trigly

- TGO, TGP, TAT

- urée, créatinine, urée

- TSH, T4, T3

- ACate, TPO

- VS, CRP

L.A.M. Riad

Tél : 05 37 71 05 06

05 37 57 23 23-05 37 71 50 60

Pat : 25995358 - IF : 3349086

Dr BOUHADDIOUI Laila
ENDOCRINOLOGIE - DIABETOLOGUE
Tél.: 05 37 72 52 87/06 59 83 83 75
IF : 34155421 INP: 101036317
ICE 00164525000050

4, زنقة أبو فارس المريني ساحة بيتري - الرباط - الهاتف : 05 37 72 52 87 - الموصول : 06 59 83 38 75

4, Rue Abou Faris Al Marini, Place Piétri - Rabat - Tél.: 05 37 72 52 87 - GSM : 06 59 83 38 75

البريد الإلكتروني : E-mail : lailabouhaddioui@gmail.com

Dr. L. BOUHADDIOUI IHRAI

الدكتورة بوحدوي اهراري ليلي

*Spécialiste en Endocrinologie
Maladies Métaboliques - Diabète*

Nutrition - Obésité - Stérilité

Maladies des Seins

*Diplômée de la Faculté de Médecine
de Montpellier*

اختصاصية في أمراض

الغدد وداء السكري

خريجة كلية الطب

بمنبلي

Rabat, le 30/09/2023 الرباط في

N° ABROUQ Maximal

60,000

540,00

FERREX

1 flacon / 1 boîte

- D3 NORN 200

89,50 x2

8 gélules

179,00

719,00

Total

4, زنقة أبو فارس الميرني - الرباط - الهاتف : 05 37 72 52 87 - المحمول : 06 59 83 38 75

4, Rue Abou Faris Al Marini, Place Piétri - Rabat - Tel : 05 37 72 52 87 - GSM : 06 59 83 38 75

E-mail : lailabouhaddioui@gmail.com البريد الإلكتروني

Dr. BOUHADDIOUI Laila
DIABETOLOGUE
Tel : 05 37 72 52 87 / 06 59 83 38 75
INP : 101036317
IF : 05 37 72 52 87

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول:

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية:
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة:

يستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

هذا الدواء، يحوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH)، وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة:

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سيسيالات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبية مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية: الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سيسيالات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ:

في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى:

إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواءً آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول:

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية:
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة:

يستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH)، وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة:

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سيسيالات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبية مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية: الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سيسيالات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ:

في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى:

إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواءً آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول:

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية:
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تقلل امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة:

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH).

وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة:

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سبسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبية مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية: الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سبسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ:

في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى:

إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواءً آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول:

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية:
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تقلص امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة:

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السائق واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH).

وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة:

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سيسيالات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبية مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية: الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سيسيالات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ:

في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى:

إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواءً آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول:

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية:
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة:

يستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH)، وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة:

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سبسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبية مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية: الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سبسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ:

في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى:

إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواءً آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

يستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH)، وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سيسيالات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية : الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سيسيالات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني وداء ترسب الأصغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى :

إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثا دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :
إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :
لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :
هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH).

وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سبسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية : الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سبسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى :
إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثا دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الإختبارات التشخيصية :
هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH)، وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سيسيالات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا و لا وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية : الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سيسيالات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد و يغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى :

إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثا دواء آخر، بما في ذلك تلك التي تم

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PRV 60,00 Dhs



6 118001 440016

21872/08

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول:

- مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبيرازول و بانتوبرازول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية:
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات:
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تقلل امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة:
يستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات:
لم يلاحظ أي آثار على قدرة السائق واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:
هذا الدواء، يحتوي على 1400 ملغ السوربيتول في كل قارورة. السوربيتول مصدر للفركتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك أو (طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، أو تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثي (IFH)، وهي حالة وراثية نادرة، لا يمكن للمريض أن يحل فيها الفركتوز. تستشير أنت أو (طفلك) طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

نشرة:

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سيسيالات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبية مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة:

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله:

المجموعة الصيدلانية العلاجية: الحديد ثلاثي التكافؤ، مستحضرات عن طريق الفم.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء، لعلاج نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب:

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سيسيالات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديروني و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ:
في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى:
إذا كنت تأخذ أو أخذت حديثاً دواءً آخر، بما في ذلك تلك التي تم

D3 NORM[®]
200 UI GOUTTES BUVABLES



8 051128 634501

Lot:
A consommer
avant le:
PPC : 89,50 DH

230285

03/2026

D3 NORM[®]
200 UI

ON :

compte-gouttes de 30 ml.

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3 (5µg/1 goutte).

PROPRIETES :

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.

D3 NORM[®]
200 UI GOUTTES BUVABLES



8 051128 634501

Lot:
A consommer
avant le:
PPC : 89,50 DH

230285

03/2026

D3 NORM[®]
200 UI

ON :

compte-gouttes de 30 ml.

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3 (5µg/1 goutte).

PROPRIETES :

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.



L.A.M. RIAD

13, Angle Avenue Almelia et rue Meziata - Hay Riad
(City Center - ACIMA) - RABAT

Tél : 05 37 71 05 06 / 05 37 57 23 23 - Fax : 05 37 71 50 60

Site-Web : www.laboriad.ma - E-mail : laboratoireriad@gmail.com

FACTURE N° : 230502257

Rabat le 27-05-2023

Mme Nawal ABROUQ

Date de l'examen : 27-05-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0106	Cholestérol total	B30	B
0108	Cholestérol H D L	B50	B
0109	Cholestérol L D L	B50	B
PS	Prélèvement sanguin	E20	E
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0135	Urée	B30	B
0154	Ferritine	B250	B
0161	T4 libre	B200	B
0163	TSH	B250	B
0165	T3L	B300	B
0216	Numération formule	B80	B
0223	VS	B30	B
0348	AntiThyroïdiens : Microsomaux 150 201	B150	B
0370	CRP	B100	B
0384	25 Hydroxy cholecalciférol	B450	B
	Créatinine	B30	B
	Acide Urique	B30	B
	ALAT (GPT): ALANINE AMINO TRANSFERASES	B50	B
	ASAT (GOT)	B50	B
	Gamma G.T.	B50	B
	Calcium	B30	B

Total des B : 2400

TOTAL DOSSIER : 3240.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois mille deux cent quarante dirhams .



Patente N° : 25995358 - CNSS: 8114357 - IF: 3349086 - RIB: 013 810 01214 000040 001 27 94 BMCI RYAD NAKHIL -
ICE: 001685262000044 - INPE: 103060877



LABORIAD

Dr Jalil ELATTAR

Médecin Biologiste

مركز التحليلات الطبية الرياض

CENTRE DE BIOLOGIE RIAD

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée.
- Cytogénétique Moléculaire.

Page 1 / 7

Edité le 27-05-2023 à 12:19

Prescripteur : **Dr Laila BOUHADDIOUI IHRAI**

EXAMEN du 27-05-2023

Mme ABROUQ Nawal

Code Patient :1211202043

Né(e) le : 03-03-1977



Prélevé le : 27-05-2023 à 08:38

HEMATOLOGIE

(Fluorescence en Cytométrie de Flux sur SYSMEX-XN 1000)

ETUDE DE LA LIGNEE ERYTHROCYTAIRE

Hématies :	3.900	M/mm ³	(3.800-5.400)	4.140
Hémoglobine :	<u>12.3</u>	g/dL	(12.5-15.5)	13.0
Hématocrite :	<u>35.6</u>	%	(37.0-47.0)	38.5
VGM :	91.3	μ ³	(82.0-98.0)	93.0
CCMH :	34.6	%	(32.0-36.0)	33.8
TCMH :	31.5	pg	(>27.0)	31.4
RDW :	12.8	%	(12.0-16.0)	12.7

ETUDE DE LA LIGNEE LEUCOCYTAIRE

Leucocytes :	4.540	/mm ³	(4.000-10.000)	3.740
Poly. Neutrophiles :	48.1	% soit 2 184	/mm ³ (1 800-7 500)	53.5
Poly. Eosinophiles :	1.3	% soit <u>59</u>	/mm ³ (100-400)	1.9
Poly. Basophiles :	0.9	% soit 41	/mm ³ (<200)	0.5
Lymphocytes :	42.8	% soit 1 943	/mm ³ (1 000-4 500)	34.2
Monocytes :	6.9	% soit 313	/mm ³ (200-1 000)	9.9

Plaquettes (RC)

115 Mille/mm³ (150-400)

VMP (RC)

12.9 fl (6.9-10.8)

16-09-2022

145

12.6

13, Angle Avenue Almelia et rue Meziata - Hay Riad

(City Center - ACIMA) - RABAT

Tél : 05 37 71 05 06 / 05 37 57 23 23 - Fax : 05 37 71 50 60

E-mail : contact@laboriad.ma - Site-Web : www.laboriad.ma



Urgences
24H-7J/7



LABORIAD

Dr Jalil ELATTAR

Médecin Biologiste

مركز التحليلات الطبية الرياض

CENTRE DE BIOLOGIE RIAD

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée.
- Cytogénétique Moléculaire.

2305272023 – Mme Nawal ABROUQ

Page 2 / 7

VITESSE DE SEDIMENTATION

26-03-2022

1ère Heure
((VES STATIC ALL DIAG))

17 mm

(<15)

18

BIOCHIMIE SANGUINE

ALAT : ALANINE AMINO TRANSFERASES

26-03-2022

ALAT (GPT)
(Méthode IFCC Beckman Coulter AU 480)

11 UI/L

(<35)

12

ASAT : ASPARTATE AMINO TRANSFERASES

26-03-2022

ASAT (TGO)
(Méthode IFCC Beckman Coulter)

16 UI/L

(<35)

17

GLYCEMIE A JEUN
(Méthode Hémokinase-G6PDH Beckman Coulter)

0.94 g/L
5.22 mmol/L

(0.74-1.06)

(4.11-5.88)

26-03-2022

0.90

Consensus:

Taux Normal: 0.60 à 1.0 g/L

Diminution de la tolérance au glucose: 1.00 à 1.26 g/L

DIABETE: > 1.26 g/L

(observé sur 2 prélèvements distincts)

INDICE DE LIPEMIE
INDICE D'HEMOLYSE
INDICE D'ICTERE

Limpide
Non hémolysé
Non ictérique



Urgences
24H-7J/7

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée.
- Cytogénétique Moléculaire.

2305272023 – Mme Nawal ABROUQ

Page 3 / 7


26-03-2022

HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE
(Technique HPLC TOOSOH)

4.9 %

(4.0-6.0)

4.8



Interprétation des résultats selon la standardisation du NGSP :

- HBA1C entre 4.0 et 6.0 % : intervalle non diabétique
- HBA1C inférieur à 6.5 % : excellent équilibre glycémique (DNID)
- HBA1C inférieur à 7.0 % : excellent équilibre glycémique (DID)
- HBA1C entre 7.0 et 8.0 % : bon équilibre glycémique
- HBA1C à 8 % : Action corrective suggérée**

Remarque :

Le dosage de l'HBA1C est réservé au suivi de l'équilibre glycémique chez les diabétiques

26-03-2022

CHOLESTEROL TOTAL

(Méthode CHOD-PAP Beckman Coulter)

2.03 g/L

(<2.00)

1.81

5.25 mmol/L

(<5.17)

26-03-2022

HDL – CHOLESTEROL

(Méthode Immuno-inhibition Beckman Coulter)

0.79 g/L

(>0.40)

0.65

2.04 mmol/L

(>1.03)





LABORIAD

Dr Jalil ELATTAR
Médecin Biologiste

مركز التحليلات الطبية الرياض

CENTRE DE BIOLOGIE RIAD

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée.
- Cytogénétique Moléculaire.

2305272023 – Mme Nawal ABROUQ

Page 4 / 7

26-03-2022

1.13

CHOLESTEROL LDL

(Méthode CHO-PAP Beckman Coulter)

1.18 g/L

3.1 mmol/L

Recommandations AFSSAPS 2005 :

LDL-CHOLESTEROL

Doit être <	2,2	g/L	:	Si absence de risque cardio-vasculaire
" " <	1,9	g/L	:	Si 1 facteur de risque cardio-vasculaire
" " <	1,6	g/L	:	Si 2 facteurs de risque cardio-vasculaire
" " <	1,3	g/L	:	Si 3 ou + facteurs de risque cardio-vasculaire
" " <	1,0	g/L	:	Si haut risque cardio-vasculaire

Facteurs de risque possibles : Age, tabagisme, HTA, diabète type II, antécédents coronariens

HDL-CHOLESTEROL

<	0,40	g/L	:	Facteur de risque cardio-vasculaire
>	0,60	g/L	:	Facteur considéré comme protecteur

26-03-2022

TRIGLYCERIDES

(Méthode GPO-PAP Beckman Coulter)

0.72 g/L

(<1.50)

0.44

0.81 mmol/L

(<1.70)

Conclusion :

Bilan lipidique à interpréter avec le médecin en fonction de la clinique et de la thérapeutique

13-04-2021

ACIDE URIQUE

(Méthode Uricase-PAP Beckman Coulter)

46.2 mg/L

(26.0-60.0)

47.2

274.9 µmol/L

(154.7-357.0)

07-02-2020

UREE

(Méthode Uréase-GLDH Beckman Coulter)

0.32 g/L

(0.17-0.43)

0.24

5.33 mmol/L

(2.83-7.16)

26-03-2022

CREATININE

(Méthode Enzymatique Standardisation IDMS Beckman AU 480)

8.7 mg/L

(5.1-9.5)

8.9

77.0 µmol/L

(45.1-84.1)



Urgences
24H-7J/7



LABORIAD

Dr Jalil ELATTAR

Médecin Biologiste

مركز التحليلات الطبية الرياض

CENTRE DE BIOLOGIE RIAD

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée.
- Cytogénétique Moléculaire.

2305272023 – Mme Nawal ABROUQ

Page 5 / 7

DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE ESTIMEE SELON LA FORMULE

CKD-EPI

(Chronic Kidney Disease-Epidemiology CKD-EPI)

Clairance CKD-EPI 79.89 ml/min (>60.00)

Calcul tenant compte du sexe pour les sujets adultes Caucasiens.

Patient de type caucasien ? Oui

Les formules d'estimation ne remplacent pas la mesure du DFG par méthode de référence et ne sont pas validées pour:

- Les patients de type non caucasien.
- Les patients âgés de plus de 75 ans.
- Les patients de poids extrême ou dont la masse musculaire est élevée ou faible.
- Les patients dénutris ou ayant une alimentation pauvre en protéines animales.

CALCIUM

(Méthode o-CPC Beckman Coulter)

95.3 mg/L (88.0-106.0)
2.37 mmol/L (2.19-2.64)

07-02-2020

95.7

FERRITINE

(Chimiluminescence Beckman Coulter)

19 ng/mL (11-306)

16-09-2022

38

Gamma G.T.

(Méthode IFCC Beckman Coulter)

5 U/L (<38)

07-02-2020

9



Urgences
24H-7J/7



LABORIAD

Dr Jalil ELATTAR

Médecin Biologiste

مركز التحليلات الطبية الرياض

CENTRE DE BIOLOGIE RIAD

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée.
- Cytogénétique Moléculaire.

2305272023 – Mme Nawal ABROUQ

Page 6 / 7

HORMONOLOGIE

16-09-2022

TSH.us

(Chimiluminescence Beckman Coulter)

1.089 $\mu\text{UI/mL}$

(0.340–5.600)

1.306

Remarque:


Chez le Nouveau-né, on observe une augmentation physiologique de la TSH (TSH Normes N-Né < 20 $\mu\text{UI/mL}$)

Valeurs de référence Femme Enceinte

1er Trimestre: 0.030 à 2.300 $\mu\text{UI/mL}$

2ème Trimestre: 0.030 à 3.100 $\mu\text{UI/mL}$

3ème Trimestre: 0.130 à 3.500 $\mu\text{UI/mL}$



07-02-2020

F.T.3 – Triiodothyronine Libre (RC)

(Chimiluminescence Beckman Coulter)

2.68 pg/mL

(2.50–3.90)

3.73

07-02-2020

F.T.4 – Thyroxine Libre

(Chimiluminescence Beckman Coulter)

12.3 pmol/L

(7.8–14.3)

14.0

158.3 ng/dL

(100.4–184.0)

07-02-2020

Ac Anti-THYROPEROXYDASE

(Chimiluminescence BECKMAN COULTER)


<1.0 UI/mL

(<9.0)

<1.0



Urgences
24H-7J/7



LABORIAD

Dr Jalil ELATTAR
Médecin Biologiste

مركز التحليلات الطبية الرياض

CENTRE DE BIOLOGIE RIAD

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée.
- Cytogénétique Moléculaire.

2305272023 – Mme Nawal ABROUQ

Page 7 / 7

VITAMINES

16-09-2022

25-OH-VITAMINE D (D2 et D3)

(Diasorin Liaison –CLIA Chimiluminescence)

Les données de la littérature actuelle suggèrent les intervalles suivants:

26.7 ng/mL

(30.0–80.0)

36.1

66.8 nmol/L

(75.0–200.0)

< à 5	ng/mL	:	Déficit profond
5 à 10	ng/mL	:	Déficit modéré
10 à 30	ng/mL	:	Niveau insuffisant
30 à 80	ng/mL	:	Niveau suffisant
> à 100	ng/mL	:	Toxicité

PROTEINES SPECIFIQUES

26-03-2022

C.R.P US

(Immunoturbidimétrie Beckman Coulter)

<1.00 mg/L

(<5.00)

<1.00

Remarques:

La Procalcitonine (PCT) est disponible, elle permet:

- 1- Diagnostic précoce de l'infection bactérienne systémique, du sepsis et de la défaillance multi-viscérale.
 - 2- Indication de la sévérité et du pronostic de l'infection.
 - 3- Diagnostic différentiel entre infection bactérienne et infection virale.
 - 4- Diagnostic différentiel entre infection systémique et maladie inflammatoire aigüe.
 - 5- Surveillance de la survenue d'infection chez les patients à haut risque (transplantés, immunosuppression,...).
- (RC) : Résultat contrôlé



Dr. Jalil ELATTAR
13, Angle Avenue Almella
et Rue Meziata Hay Riad-RABAT
Tél : 05 37 71 05 06
05 37 57 23 23
Fax : 05 37 71 50 60

Demande validée biologiquement par Dr. Jalil ELATTAR

13, Angle Avenue Almella et rue Meziata - Hay Riad

(City Center - ACIMA) - RABAT

Tél : 05 37 71 05 06 / 05 37 57 23 23 - Fax : 05 37 71 50 60

E-mail : contact@laboriad.ma - Site-Web : www.laboriad.ma



Urgences
24 H-7J/7