

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-801125

☒ **Maladie**

☐ **Dentaire**

☐ **Optique**

☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12232 Société : RAM
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : SARADOUNE DOUNIA
 Date de naissance : 25/03/1984
 Adresse : Résidence Canloj App B1, 2ème Etage, BORDJ BOUK
 Mohammédia
 Tél. : 0600303260 Total des frais engagés : 992,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 12/07/2023
 Nom et prénom du malade : SARADOUNE DOUNIA Age : 39 ans
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : ABCES mammaire
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 12/07/23
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/06/2023	G	1	200,-	INF: [Signature]
			150,-	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	12.06.23	392,50



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	G		00000000	00000000	35533411	11433553	B		MONTANTS DES SOINS
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	G																	
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Pr. Chems Eddoha MOUNZIL BENSLAMA
Spécialiste en Gynécologie Obstétrique

Ancien Professeur à la faculté de médecine de Rabat
Ancien Médecin Commandant à l'Hôpital Militaire de Rabat
Ancienne Assistante des Hôpitaux de Paris
Diplômée de la Faculté de Médecine René Descartes à Paris
en Stérilité et Reproduction, Echographie, Coelioscopie
et Hystéroscopie

الدكتورة شمس المونزيل بنسلامة
اختصاصية في امراض النساء والتوليد
استاذة جامعية سابقا بكلية الطب بالرباط
طبيبة عسكرية سابقا بالمستشفى العسكري بالرباط
طبيبة مساعدة سابقا بمستشفيات باريس
خريجة كلية الطب روني ديكارت بباريس
وحائزة على دبلوم العقم والتناسل. الفحص بالأمواج
الجراحة بالمنظار والفحص الداخلي للرحم

Casablanca, le **12.06.2023** في الدار البيضاء،

Mme SAADOUNE Dounia

1 FLUPEN 500

67.00x2

2 gélules le matin, à midi et le soir, pendant 10 jours.

2 D-CURE

2500

56.30

1 ampoule par semaine pendant 1 mois .

3 TARDYFERON B9 cp pellic : B/30

2 boîtes

51.60x2

Prendre 1 comprimé le matin, avant le repas, pendant 2 mois.

4 RELAXIUM B 6 375 MG

29.00

1 gélule le soir, pendant 3 mois.

5 LERO BASE

30x2 80

2 capsules le matin, pendant 3 mois.

PHARMACIE LOUZIA
Dr HADDIOU Imadeddine
Béni Yakhlef Mohammedia

Pr Chems MOUNZIL BENSLAMA

Pr. C. MOUNZIL BENSLAMA
Gyneco - Obst - Maârif
30, Rue du Marché 2^{ème} étage - Maârif - Casablanca - Tél: 0522 23 09 59

FLUPEN®

Flucoxaciline

FLUPEN 500 mg, gélule

FLUPEN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Ou est-ce que FLUPEN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUPEN ?
3. Comment prendre FLUPEN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUPEN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. UTIEST-CE QUE FLUPEN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
Pénicillines résistantes aux bêta-lactamases.

Indications thérapeutiques

FLUPEN contient la substance active flucoxaciline, qui fait partie d'un groupe de médicaments appelés « pénicillines ». Ces médicaments sont également appelés « antibiotiques » et ils agissent en tuant les bactéries qui causent les infections.

FLUPEN est utilisé pour traiter :

- les infections pulmonaires
- les infections de la gorge ou du nez
- les infections des oreilles
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections cardiaques
- les infections des os et des articulations
- la méningite
- les infections du système digestif
- les infections sanguines
- les infections des reins, de la vessie ou de l'urètre (le tube qui transporte l'urine de la vessie).

FLUPEN peut également être utilisé pour prévenir les infections lors d'une intervention chirurgicale majeure, en particulier la chirurgie cardiaque ou orthopédique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUPEN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre FLUPEN, poudre pour suspension buvable.

Ne prenez pas ce médicament si :

- Vous êtes allergique à la flucoxaciline ou à tout autre antibiotique à base de pénicilline (voir les informations dans la rubrique 4).

- Vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Vous avez déjà souffert de problèmes hépatiques (par exemple, un ictère) après avoir pris de la flucoxaciline.
- Vous avez eu une réaction allergique aux antibiotiques β-lactamines (par exemple pénicillines, céphalosporines).

Mises en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament si :

- Vous souffrez de problèmes rénaux, car vous pouvez avoir besoin d'une dose plus faible que la normale (des convulsions peuvent survenir très rarement chez les patients souffrant de problèmes rénaux et qui prennent des doses élevées)
- Vous souffrez de problèmes hépatiques, car ce médicament pourrait aggraver les symptômes
- Vous avez 50 ans ou plus
- Vous avez d'autres maladies graves (à part l'infection traitée par ce médicament)
- Vous avez déjà eu un gonflement du visage ou une éruption cutanée en prenant un antibiotique
- Vous donnez FLUPEN à un nouveau-né
- Vous suivez un régime hyposodique
- Vous prenez ce médicament pendant une longue période dans le cas des tests réguliers de la fonction hépatique et rénale sont conseillés
- Vous prenez ou allez prendre du paracétamol. Il existe un risque d'anémie sanguine et plasmatique (acidose métabolique à trou anionique élevé) qui survient en cas d'augmentation de l'acidité plasmatique, lorsque la flucoxaciline est utilisée en même temps que le paracétamol, en particulier dans certains groupes de patients à risque, par exemple les patients présentant une insuffisance rénale sévère, une septicémie ou une maintenance, en particulier si les doses quotidiennes maximales de paracétamol sont utilisées. L'acidose métabolique à trou anionique élevé est une maladie grave qui nécessite un traitement urgent.

Autres médicaments et FLUPEN

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament si vous prenez d'autres médicaments, en particulier :

- Probénécide ou sulfapyrazone (utilisés pour traiter la goutte)
- Méthotrexate (un médicament de chimiothérapie)
- Vaccin typhoïde oral (les antibiotiques peuvent le rendre moins efficace)
- Sugammadex (utilisé avec les anesthésiques généraux)
- Pipéraciline (un antibiotique administré par injection)
- Warfarine (médicament pour prévenir la coagulation du sang)
- Paracétamol
- Autres types de traitements antibactériens tels que les agents bactériostatiques (par exemple chloramphénicol et tétracyclines).

Certains médicaments peuvent affecter la façon dont d'autres fonctionnent. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela est valable pour les médicaments avec ou sans ordonnance.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous envisagez d'être enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous envisagez d'être enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
FLUPEN peut avoir une influence négligeable ou nulle sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Tests

Une surveillance régulière de la fonction hépatique et rénale doit être effectuée lors de la prise de FLUPEN pendant une longue période. Dites à votre médecin que vous prenez FLUPEN si vous subissez des tests d'urine ou des tests sanguins car cela peut affecter les résultats.

FLUPEN 500 mg, gélule

Ce médicament contient 26,28 mg de sodium (soit 1,14 mmol) par gélule. À prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

FLUPEN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Ce médicament contient 16,05 mg de sodium (par 5 ml soit 0,70 mmol) (5 ml). À prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient un agent colorant azoïque, le jaune orangé S qui peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT PRENDRE FLUPEN ?

La posologie dépend de l'âge, du poids et de la fonction rénale du patient, tout autant que de la sévérité de l'infection.

Posologie

La posologie est formulée en dose totale quotidienne devant être administrée en 3 à 4 prises par jour.

Adultes :

Voie orale : la dose totale quotidienne est de 1 à 3 g, répartis en 3 à 4 prises.

Enfants :

La posologie d'un enfant de 25-50 kg est de 25-50 mg par voie orale.

Personnes âgées :

Aucun ajustement de la posologie n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale.

Insuffisance rénale :

L'excrétion d'un médicament est diminuée en cas d'insuffisance rénale. La posologie doit être ajustée en fonction de la sévérité de l'insuffisance rénale (voir la notice du médicament).

Posologie à 12 heures :

La posologie doit être ajustée en fonction de la sévérité de l'insuffisance rénale (voir la notice du médicament).

L'hémodialyse :

La posologie doit être ajustée en fonction de la sévérité de l'insuffisance rénale (voir la notice du médicament).

Mode d'administration :

Un minimum d'un verre d'eau doit être pris avec le médicament.

FLUPEN doit

67,00

FLUPEN®

Flucoxaciline

FLUPEN 500 mg, gélule

FLUPEN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Ou est-ce que FLUPEN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUPEN ?
3. Comment prendre FLUPEN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUPEN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. UTIEST-CE QUE FLUPEN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
Pénicillines résistantes aux bêta-lactamases.

Indications thérapeutiques

FLUPEN contient la substance active flucoxaciline, qui fait partie d'un groupe de médicaments appelés « pénicillines ». Ces médicaments sont également appelés « antibiotiques » et ils agissent en tuant les bactéries qui causent les infections.

FLUPEN est utilisé pour traiter :

- les infections pulmonaires
- les infections de la gorge ou du nez
- les infections des oreilles
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections cardiaques
- les infections des os et des articulations
- la méningite
- les infections du système digestif
- les infections sanguines
- les infections des reins, de la vessie ou de l'urètre (le tube qui transporte l'urine de la vessie).

FLUPEN peut également être utilisé pour prévenir les infections lors d'une intervention chirurgicale majeure, en particulier la chirurgie cardiaque ou orthopédique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUPEN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre FLUPEN, poudre pour suspension buvable.

Ne prenez pas ce médicament si :

- Vous êtes allergique à la flucoxaciline ou à tout autre antibiotique à base de pénicilline (voir les informations dans la rubrique 4).

- Vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Vous avez déjà souffert de problèmes hépatiques (par exemple, un ictère) après avoir pris de la flucoxaciline.
- Vous avez eu une réaction allergique aux antibiotiques β -lactamines (par exemple pénicillines, céphalosporines).

Mises en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament si :

- Vous souffrez de problèmes rénaux, car vous pouvez avoir besoin d'une dose plus faible que la normale (des convulsions peuvent survenir très rarement chez les patients souffrant de problèmes rénaux et qui prennent des doses élevées)
- Vous souffrez de problèmes hépatiques, car ce médicament pourrait aggraver les symptômes
- Vous avez 50 ans ou plus
- Vous avez d'autres maladies graves (à part l'infection traitée par ce médicament)
- Vous avez déjà eu un gonflement du visage ou une éruption cutanée en prenant un antibiotique
- Vous donnez FLUPEN à un nouveau-né
- Vous suivez un régime hyposodique
- Vous prenez ce médicament pendant une longue période dans le cas de tests réguliers de la fonction hépatique et rénale sont conseillés
- Vous prenez ou allez prendre du paracétamol. Il existe un risque d'anémie sanguine et plasmatique (acidose métabolique à trou anionique élevé) qui survient en cas d'augmentation de l'acidité plasmatique, lorsque la flucoxaciline est utilisée en même temps que le paracétamol, en particulier dans certains groupes de patients à risque, par exemple les patients présentant une insuffisance rénale sévère, une septicémie ou une malnutrition, en particulier si les doses quotidiennes maximales de paracétamol sont utilisées. L'acidose métabolique à trou anionique élevé est une maladie grave qui nécessite un traitement urgent.

Autres médicaments et FLUPEN

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament si vous prenez d'autres médicaments, en particulier :

- Probénécide ou sulfapyrazone (utilisés pour traiter la goutte)
- Méthotrexate (un médicament de chimiothérapie)
- Vaccin typhoïde oral (les antibiotiques peuvent le rendre moins efficace)
- Sugammadex (utilisé avec les anesthésiques généraux)
- Pipéraciline (un antibiotique administré par injection)
- Warfarine (médicament pour prévenir la coagulation du sang)
- Paracétamol
- Autres types de traitements antibactériens tels que les agents bactériostatiques (par exemple chloramphénicol et tétracyclines).

Certains médicaments peuvent affecter la façon dont d'autres fonctionnent. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela est valable pour les médicaments avec ou sans ordonnance.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous envisagez d'être enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous envisagez d'être enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
FLUPEN peut avoir une influence négligeable ou nulle sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Tests

Une surveillance régulière de la fonction hépatique et rénale doit être effectuée lors de la prise de FLUPEN pendant une longue période. Dites à votre médecin que vous prenez FLUPEN si vous subissez des tests d'urine ou des tests sanguins car cela peut affecter les résultats.

FLUPEN 500 mg, gélule

Ce médicament contient 26,28 mg de sodium (soit 1,14 mmol) par gélule. À prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

FLUPEN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Ce médicament contient 16,05 mg de sodium (par 5 ml soit 0,70 mmol / 5 ml). À prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient un agent colorant azoïque, le jaune orangé S qui peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT PRENDRE FLUPEN ?

La posologie dépend de l'âge, du poids et de la fonction rénale du patient, tout autant que de la sévérité de l'infection.

Posologie

La posologie est formulée en dose totale quotidienne devant être administrée en 3 à 4 prises par jour.

Adultes :

Voie orale : la dose totale quotidienne est de 1 à 3 g, répartis en 3 à 4 prises.

Enfants :

La posologie d'un enfant de moins de 12 ans est de 25-50 mg par voie orale.

Personnes âgées :

Aucun ajustement de la posologie n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale.

Insuffisance de l'excrétion :

En cas d'insuffisance rénale, la posologie doit être ajustée en fonction de la fonction rénale (voir la rubrique 2).

Mode d'administration :

Les gélules de FLUPEN doivent être prises avec de l'eau, à jeun, 30 minutes avant les repas.

Mode d'administration :

La poudre pour suspension buvable doit être prise avec de l'eau, à jeun, 30 minutes avant les repas.

Mode d'administration :

Le minimum d'administration est de 1 gélule ou 5 ml de poudre pour suspension buvable.

FLUPEN doit



Gélule
Voie orale

Relaxium[®]

B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg

équivalent en Magnésium150 mg

Vitamine B6.....1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg

équivalent en Magnésium... ..300 mg

Vitamine B62 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg

équivalent en Magnésium... ..375 mg

Vitamine B62 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, T
à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA201818053

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA201818053

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA201918120

Deva Pharmaceutique
AJDI Pharmacien Responsable

Deva
Pharmaceutique

100-147, Zone Industrielle 71 94000 - Clichy-sous-Bois



(Fer et acide folique)

• QU'EST-CE QUE IARDYFERON B9, comprimé pellicule ?

éviter de prendre TARDYFERON B9 comprimé pelliculé. Si vous prenez les médicaments suivants, vous devez séparer leurs

118001
DYFERON B9
pelliculés
0,350 mg



2084

(Fer et acide folique)

• QU'EST-CE QUE IARDYFERON B9, comprimé pellicule ?

Si vous prenez les médicaments suivants, vous devez séparer leurs

6 118001...
ARDYFERON B9
imés pelliculés
lique 0,350 mg



Notice: Information de l'utilisateur

D-CURE 25 000 UI ; solution[®] buvable ; boîte de 4 ampoules.

D-CURE 2.400 UI ; solution buvable en gouttes ; flacon de 10 mL.

Cholécalciférol (Vitamine D 3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?
3. Comment prendre D-Cure ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure ?
6. Information supplémentaires.

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique :
Vitamines.

Indications thérapeutiques :

Le D-CURE est indiqué dans les cas suivants :

- Prophylaxie de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- prophylaxie de rachitisme chez les nouveau-nés prématurés,
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes portant un risque identifié,
- prophylaxie de l'ostéoporose,
- apport déficient en vitamine D : stéatorrhée, obstruction biliaire, cirrhose, gastrectomie, personnes âgées (aîlées ou sortant peu) ;
- traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, prise d'anti-contraceptifs ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes présentant un mal absorption ;
- traitement de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- hypoparathyroïdie idiopathique ou post-opératoire, pseudo-hypoparathyroïdie ;
- traitement d'appoint, en association avec le calcium, des médicaments inhibant la résorption ostéoclastique ou stimulant la formation osseuse, utilisés dans

N.B. : Une alimentation variée joue également un rôle prépondérant dans la prévention des carences en vitamine D.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?

Ne prenez jamais D-CURE :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une sensibilité particulière à la vitamine D (lésions tissulaires de différents organes).
- Si votre sang présente une teneur trop élevée en calcium en particulier chez le nourrisson.
- Si votre urine présente une teneur trop élevée en calcium en particulier lorsque des calculs rénaux sont présents.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre D-CURE.

- La vitamine D sera administrée avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale, une lithiase ou une maladie cardiaque car, chez ces patients, l'hypercalcémie sont plus importants.
- Il y a lieu de vérifier la phosphatémie.
- Suspender le traitement en cas de symptômes dus à l'excès en vitamine : fatigue, nausées, diarrhées, augmentation du volume des urines.
- L'utilisation de fortes doses de vitamine D suppose un contrôle étroit de la teneur en calcium dans le sang et/ou de la teneur en calcium dans les urines.
- La prudence s'impose chez les patients sous médicaments apparentés à la digitaline.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Interactions avec d'autres médicaments ».

Autres médicaments et D-Cure :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- La phénytoïne (médicament utilisé dans l'épilepsie), le phénobarbital (somnifère), la carbamazépine, la pyrimidone pris durant des périodes prolongées peuvent accélérer le cycle dans l'organisme du cholécalférol (= faire majeure circuler de la vitamine D).

MCC210MA118
20/11/2020

PPV: 56,30 DH
LDP: 22J24D
EXP: 10/2024