

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 6136 Société : RAM
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : EL NORJANI LAILA
 Date de naissance : 01/08/1963
 Adresse : 12, Rue tin Aouda Résidence DR SLIM
 II Apt 7 Racine casablanca
 Tél. : 056069519 Total des frais engagés : 1670,00 Dhs


Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

 Dr TARAIFI Said
 Spécialiste en Gynécologie Accouchement
 14, Rue du Marché - Maârif
 05 22 23 56 79 - CASA
 Auto. N° 9864

Date de consultation : 23/08/2023
 Nom et prénom du malade : DR ET MARJANI Lalla Age :
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 23/08/2023
 Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/5/23	CJ		300	 Dr. TARIQ Spécialiste en Gynécologie et Médecine de la Naissance 14, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Tel. 05 22 23 58 79 - Auto. N° 9864

PHARMACIE EXECUTION DES ORDONNANCES

PHARMACIE ALBAIDA Cachet du pharmacien Dr. SMAROGHIE puis SMAROGHIE	Date	Montant de la Facture
496, Bd Maqdad Lahrizi - Hay Khalid Ben Msick - Casablanca / Tel: 0522 37 27 95 INPE 92004043	03/05/23	851,40 DH

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Signature et signature du Laboratoire et du radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	03.05.23	B.370+PC	529,00 Dh

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553
P	

The diagram shows a 3D grid with 12 points labeled H, D, G, and B. The grid is centered at the origin (0,0,0). The vertical axis (z-axis) is labeled H at the top and B at the bottom. The horizontal axis (x-axis) is labeled D on the left and G on the right. The depth axis (y-axis) is labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The points are arranged in a grid pattern: the first point is at (1,1,1), the second is at (2,1,1), and so on, up to (12,1,1) at the top. The second point is at (1,2,1), the third at (2,2,1), and so on, up to (12,2,1) at the top. The third point is at (1,1,2), the fourth at (2,1,2), and so on, up to (12,1,2) at the top. The points are represented by small circles with numbers inside, and the axes are represented by arrows pointing in the positive directions of the respective axes.

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur TARARI Saïd
GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRICIEN
Diplômé d'état de la faculté de médecine de Strasbourg
Ancien médecin attachée au CHU de Strasbourg

SPECIALISTE
Chirurgie gynécologique - Endoscopie
Accouchement - Stérilité - Fécondation in vitro
Maladie des seins - Echographie

AUTORISATION N° 9864



الدكتور الطرازي سعيد
طبيب اخصاصي في أمراض النساء والتوليد
خريج كلية الطب
بستراسبورغ
اخصاصي في
الولادة - الجراحة
العمق - أمراض الثدي
إيكوكرافتي

رخصة رقم : 9864

Casablanca, le 03/05/2023 الدار البيضاء في

Mme EL MORJANI Laila Ep. OSMAN



BLISSEL GEL VAGINAL

1 application par jour pdt 30 jours, puis 1 jour sur 2 pendant 3 MOIS

POLYGYNAX

67,40 1 ovule par jour pdt 12 jours ; 2 boites, ,

851,40

PHARMACIE ALBAIDA

Dr. Samir OSMAN

496, Bd Maqdad Lahrizi - Hay Khalid
Ben M'sick - Casablanca / Tél: 0522 37 27 95



Cabinet : 14, Rue du Marché Maârif - Casablanca - Tél : 05 22 23 56 79 / 05 22 23 46 17 - Fax : 05 22 98 71 96

Email : doctararis@gmail.com - Patente : 35701862 IF : 40705998 ICE : 001663417000002

Urgences : Clinique l'Hermitage, 35 Bd. Anoual - Casablanca - Tél. : 05 22 86 55 66

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières.

- Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traitement ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires (embolie pulmonaire) ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant que vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hyperréactive (surdité causée par un épaississement)

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières.

- Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traitement ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hyperréactive (surdité causée par un épaississement

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières.

- Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traitement ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires (embolie pulmonaire) ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hyperréactive (surdité causée par un épaississement)

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières.

- Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traitement ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hyperréactive (surdité causée par un épaississement

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières.

- Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traitement ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hyperréactive (surdité causée par un épaississement

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières.

- Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traitement ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires (embolie pulmonaire) ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hypoglycémie (surdose causée par un épaississement excessif de la paroi de l'utérus).

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières.

- Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traitement ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires (embolie pulmonaire) ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hypersensible (surdité causée par un épaississement excessif de la peau).

Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

D·C·I: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire :

- Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :

BLISSEL contient de l'estriol, une hormone féminine identique à une hormone naturellement produite par votre corps, appelée œstrogène.

Blissel est utilisé : pour des problèmes vaginaux causé par la carence d'œstrogène.

Une telle carence peut réduire la paroi du vagin, et la rendre sèche. Ainsi, le rapport sexuel peut devenir douloureux ; en outre, vous pouvez développer des infections vaginales. Ces problèmes peuvent être réduits en utilisant des médicaments comme Blissel, qui contient de l'œstrogène.

Plusieurs jours ou semaines peuvent être nécessaires avant que vous n'observiez une amélioration.

Blissel est utilisé pour le traitement de la sécheresse vaginale qui est due au manque d'œstrogène après la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

Tout avec les bénéfices, TSH (Thérapie Substitutive Hormonale) a certains risques, dont vous devez tenir compte quand vous décidez si commencer à continuer.

Avant de commencer la TSH

Votre médecin doit vous poser des questions médicales personnelles et familiales. Il devra examiner votre sein ou votre abdomen pour un examen interne. Il le fera seulement vous, ou en cas de situations particulières. Informez votre médecin si vous avez des maladies

Contrôles périodiques

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin.

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuité de la thérapie hormonale substitutive.

N'utilisez pas Blissel

- Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez une **tumeur du sein** ;
- Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;
- Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;
- Si vous avez un **épaississement excessif revêtant l'utérus** (hyperplasie de l'endomètre) non en traité ;
- Si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des **problèmes dans les veines** (thrombose), par exemple dans les veines (thrombose veineuse profonde) ou dans les veines pulmonaires (embolie pulmonaire) ;
- Si vous avez des **troubles du système de coagulation** (comme, par exemple, une carence de protéine C, de S ou d'antithrombine) ;
- Si vous avez ou si vous avez eu récemment des symptômes causés par des coagulations des artères, comme **un attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;
- Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** (qui affecte votre fonction hépatique) ne s'est pas encore normalisée ;
- Si vous avez une maladie rare du **sang** dénommée **hémophilie** (il s'agit d'une maladie héréditaire) ;
- Si vous êtes **allergiques** (hypersensibles) à l'estriol ou à n'importe lequel des autres composants de ce médicament (voir paragraphe 6).

Si n'importe laquelle de ces conditions apparaît pour la première fois pendant vous prenez Blissel, interrompez le traitement et consultez votre **médecin**.

Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion d'un tube dans le vagin. Cela peut causer une gêne ou une irritation chez les femmes ayant une **atrophie vaginale** (amincissement ou inflammation des parois vaginales). Veuillez informer votre **médecin** si vous avez ou si vous avez eu l'un(e) des troubles/maladies suivant(e)s qui, dans certains cas, peuvent réapparaître ou s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL :

- trouble cardiaque ou circulatoire,
- excès de cholestérol ou d'autres substances grasses dans le sang,
- changements au niveau de vos seins,
- endométriose (croissance anormale de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus),
- tumeur bénigne dans l'utérus (myome).

Blissel® 50 µg/g
Estriol

Gel vaginal, boîte d'un tube de 10 g



6 118001 440054

Lot:	206
EXP:	03-2024
PPV (Dhs):	98,00

hyperréactive (surdité causée par un épaississement)



LABORATOIRE SCHEHERAZAD

CABINET MEDICAL D'EXAMENS HISTO - CYTOPATHOLOGIQUES

4, Bd Zerkouni 5^{ème} étage - 20140 Casablanca - Tél.: 05.22.22.69.88/89 - Fax: 05.22.20.51.17 - E-mail: labocasa2@gmail.com
INPE: Lab: 091070078 / Med.: 093002921- ICE: 001502419000087

Docteur Schéhérazad HACHCHADI - AGHZADI
C.E.S. d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Diplômée de la Faculté de Médecine de DIJON
Ex. Enseignante à la Faculté de Médecine de BESANÇON
Membre Actif de l'Academie Internationale de Pathologie

LABORATOIRE OSMAN

Pour
Mme EL MORJANI LAILA

Prescripteur : DR TARARI SAID
Age : 59 ANS
Référence : 1SAR1W3
Parvenu : Le 03/05/2023
Répondu : Le 04/05/2023
Organe : UTERUS-COL.
Ménopausée;
Frottis du col.

- FROTTIS CERVICAL EN MILIEU LIQUIDE -

MATERIEL EXAMINÉ

Frottis cervical utérin parvenu effectué en phase liquide, à l'aide d'une Cervex-brush et analysé en mono-couche .

QUALITÉ DU FROTTIS.

Prélèvement est très peu productif .

CLASSE DU FROTTIS SELON LE SYSTÈME DE BETHESDA :ASC-US & CGA

- * Présence de cellules malpighiennes dotées d'un noyau hypertrophique et hyperchromatique entouré d'un cytoplasme plus foncé
- * Présence de cellules glandulaires possédant un cytoplasme basophile entourant un noyau hypertrophique et hyperchromatique

CYTOLOGIE DESCRIPTIVE

Richesse : peu élevée

Type de cellules retrouvées :

- * cellules malpighiennes exocervicales parabasales et surtout basales
- * cellules endocervicales

FLORE MICROBIENNE

Flore mixte sans spécificité ;

CONCLUSION:

- Frottis atrophique avec présence de légères dystrophies nucléaires jonctionnelles glandulaires et malpighiennes dont l'origine ne peut être précisée (lésions de type ASC-US et de type CGA) :
- A contrôler après traitement .

LABORATOIRE SCHEHERAZAD
Casablanca - Maroc
www.labocasa2.com

Très confraternellement,
DR HACHCHADI-AGHZADI Sc.

Laboratoire Osman

Analyses médicales

Fécondation in vitro

Congélation de sperme et d'embryons

Directeur Farid Osman

Pharmacien biologiste, ancien attaché des hôpitaux de Paris



مختبر عصمان

للتحليقات الطبية

المساعدة الطبية للإنجاب

تجمییة الحیوانات المنوية والاجنة

فرید عصمان مدیر
صيدلي ايجانی. خريج مستشفیات باریس

Casablanca le 03/05/2023

Prélèvement du 03/05/2023

Mme EL MORJANI LAILA

*Farid
F. Osman*

Organisme ANC

Référence: 3ECL5611 IPP: 00619

Code Patient 00619

Médecin: Dr. TARARI Saïd

page 1/1

FROTTIS CERVICAL EN MILIEU LIQUIDE

Conclusion

- Frottis atrophique avec présence de légères dystrophies nucléaires jonctionnelles glandulaires et malpighiennes dont l'origine ne peut être précisée (lésions de type ASC-US et de type CGA)
- A contrôler après traitement.

laboratoire Scheherazad dossier n° 1SAR1W3

BACTERIOLOGIE

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

- Aspect..... : limpide
- Couleur..... : jaune
- Culot..... : nul

EXAMEN DIRECT

- Leucocytes..... : <10p3
- Hématies..... : absence
- Cellules épithéliales. : rares
- Cylindres..... : absence
- Cristaux..... : absence
- Protozoaires : absence
- Levures..... : absence

(< 10p3 / ml) <10p3 (25/05/22)

COLORATION DE GRAM..... : flore commensale

CULTURE

- Numération de germes.. : <10p3
- Culture..... : négative

(< 10p3/ml) <10p3 (25/05/22)

Farid Osman
Directeur

Laboratoire Osman

Analyses médicales

Rés. Benomar: 21,rue Abou Abdellah Nafii - Maârif-CASABLANCA

Tél.: 0522.251329 / 0522.251222 Fax: 0522.251222

IF 40704810 PATENTE 35701216 CNSS 1159715 RC 188604 ICE 001664600000071

E-mail : faridosman@menara.ma

Site web: www.laboratoireosman.com

Facture réf.: 3ECL5611



Horaire continu: 8h à 17h
Samedi : 8h à 12h 30

ICE 001664600000071

Date: 03/05/2023

Organisme: ANC

Nom et Prénom: EL MORJANI LAILA

Code 00619

Référence: 3ECL5611



Médecin: TARARI Saïd

Analyses demandées

CBU=B123 POUR=B17 FMC=B230

Net à payer : 529.00 Dh

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

CINQ CENT VINGT NEUF Dhs 00 Cts

LABORATOIRE OSMAN
Résidence BENOMAR
Maârif CASABLANCA
Tel 0522 25 13 29 0522 25 12 22
www.laboratoireosman.com

cachet et signature

Docteur TARARI Saïd

GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN

Diplômé d'état de la faculté de médecine de Strasbourg

Ancien médecin attachée au CHU de Strasbourg

SPECIALISTE

Chirurgie gynécologique - Endoscopie

Accouchement - Stérilité - Fécondation in vitro

Maladie des seins - Echographie

AUTORISATION N° 9864



الدكتور الطاري سعيد

طبيب اخصاصي في أمراض النساء والتوليد

خريج كلية الطب

بستراسبورغ

اخصاصي في

الولادة - الجراحة

العمق - أمراض الثدي

إيكوغرافي

رخصة رقم : 9864

Casablanca, le 03/05/2023 الدار البيضاء في

Mme EL MORJANI Laila Ep. OSMAN

- ECBU + uroculture + numération de germes et antibiogramme

Dr TARARI Said
Spécialiste en Gynécologie et Accouchement
1 Rue du Marché - Maârif
Tel 05 22 23 56 79 - CASA
Aut. N° 9864

LABORATOIRE OSMAN
Résidence BENOMAR
Maârif CASABLANCA
Tel 0522 25 13 29 0522 25 12 27
www.laboratoireosman.com
3 ECL56A1

Cabinet : 14 , Rue du Marché Maârif - Casablanca - Tél : 05 22 23 56 79 / 05 22 23 46 17 - Fax : 05 22 98 71 96

→ Email : doctararis@gmail.com - Patente : 35701862 IF : 40705998 ICE : 001663417000002

Urgences : Clinique l'Hermitage , 35 Bd. Anoual - Casablanca - Tél. : 05 22 86 55 66

Docteur TARARI Saïd

GYNECOLOGUE OBSTÉTRICIEN

Diplômé d'état de la faculté de médecine de Strasbourg

Ancien médecin attaché au CHU de Strasbourg

SPECIALISTE

Chirurgie gynécologique - Endoscopie

Accouchement - Stérilité - Fécondation in vitro

Maladie des seins - Echographie

AUTORISATION N° 9864



الدكتور الطاري سعيد

طبيب اخصاصي في أمراض النساء والتوليد

خريج كلية الطب

بستراسبورغ

إخصاصي في

الولادة - الجراحية

العمق - أمراض الثدي

إيكو كرافتي

رخصة رقم : 9864

Casablanca, le 03/05/2023 الدار البيضاء في

Mme EL MORJANI Laila Ep. OSMAN

Prière de faire un :

Frottis cervico-vaginal monocouche de dépistage

DDR = ménopausée

AGE = 60 ans

Contraception :

Dr. TARARI Saïd
Spécialiste en Gynécologie Accouchement
14. Rue du Marché Maârif - Maârif
Tél. 05 22 23 56 79 - CASA
Auto. N° 9864

LABORATOIRE OSMAN
Résidence BENOMAR
Maârif CASABLANCA
Tel 0522 25 13 29 0522 25 12 22
www.laboratoireosman.com
32 CL 56 11

Cabinet : 14, Rue du Marché Maârif - Casablanca - Tél : 05 22 23 56 79 / 05 22 23 46 17 - Fax : 05 22 98 71 96

Email : doctararis@gmail.com - Patente : 35701862 IF : 40705998 ICE : 001663417000002

Urgences : Clinique l'Hermitage , 35 Bd. Anoual - Casablanca - Tél. : 05 22 86 55 66