

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/05/2023	C	300 DN	INP : 09401004	DOCTEUR M. BOURGEOIS Né le 10/01/1973 Téléphone : 06 65 04 33 10 MANOIR DE RENOBREZ 2522510 - 06 65 04 33 10

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE Samuel BOURGEOIS en Pharmacie et en Homeopathie 17/05/23	17/05/23	516,90

09205890

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
G		
B		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur ATTAR Zineb

Neurologue-Epileptologue
Adulte-Enfant

الدكتورة عطار زينب

اختصاصية في أمراض الدماغ والأعصاب
والعمود الفقري والعضلات وإختصاص أمراض
الصرع (الكبار والأطفال)



- Vidéo Electroencéphalogramme « EEG »
- ElectroNeuroMyogramme (ENMG)



Casablanca le :

14/05/2023

دعاية
E3Zahaf

1)

Duration aq
1 aq le matin / 1 m/s
172,30 x 3 = 516,90

2) Brisdal suspension
braille

1 ml

1 ml

333,67

3 mois



الصفا 404 شارع القدس، إقامة السكك الأنفاق، الطابق 3 رقم 18، عين الشق، الدار البيضاء

Essakane 404, Bd Al Qods, Résidence Essakane El Anik, 3^{ème} Etage N° 18, Ain Chok - CASABLANCA.

Tél : 05 22 52 25 16

Email : attar.neurologie@gmail.com

الهاتف : 05 22 52 25 16

GSM : 06 65 04 33 10

المحمول : 06 65 04 33 10

PRISDAL® 1 mg/ml

Boîte d'un flacon de 60 ml, solution buvable
RESPERDONE

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Car elle contient des informations importantes pour vous.

- Si vous avez des questions, vous pouvez avoir besoin de la re lire.

- Si vous avez des symptômes, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel contient cette notice :

1- Qu'est-ce que PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable ?

3- Comment prendre PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable ?

6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE PRISDAL® 1 mg/ml, SOLUTION BUVABLE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité :

Code ATC : N05XA08

PRISDAL® 1 mg/ml, Solution buvable appartient à un groupe de médicaments appellés

« antipsychotiques ».

Indications thérapeutiques :

PRISDAL® est indiqué dans les cas suivants :

- La schizophrénie, où vous pouvez voir, entendre ou percevoir des choses qui ne sont pas là, avoir des croyances erronées ou ressentir une suspicion inhabituelle, ou vous sentir confus.

- L'épisode maniaque, au cours duquel vous pouvez vous sentir excité, voir une élévation de l'humeur, être agité, enthousiaste ou hyperactif. L'épisode maniaque survient au cours d'une maladie appelée « trouble bipolaire ».

- Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les personnes présentant une maladie d'Alzheimer qui peuvent faire une élévation de l'humeur. Des médicaments alternatifs non médicamenteux doivent être utilisés au préalable.

- Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les enfants (jusqu'au 5 ans) et les adolescents présentant un déficit intellectuel et des troubles des conduites.

PRISDAL® peut aider à atténuer les symptômes de votre maladie et empêcher vos symptômes de réapparaître.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PRISDAL® 1 mg/ml, SOLUTION BUVABLE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet.

Contre-indications :

Ne prenez jamais PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable :

Si vous êtes allergique à la rispédoncine, ou à l'un des excipients contenus dans ce médicament.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précède s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi ;

Faites attention avec PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable si :

- Vous avez un problème cardiaque. Les exemples incluent un rythme cardiaque irrégulier, une douleur à la poitrine, une sensation de pression ou si vous utilisez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée. PRISDAL® 1 mg/ml, solution buvable peut entraîner une baisse de la tension artérielle. Votre docteur pourra nécessiter une adaptation.

- Vous avez connaissance de tout facteur qui pourra favoriser la survenue d'un accident vasculaire cérébral, tel que la tension artérielle élevée, un trouble cardiovasculaire ou des troubles des vaisseaux sanguins du cerveau. Votre docteur pourra nécessiter une adaptation.

- Vous avez déjà eu des symptômes incluant une température élevée, une raideur musculaire, une transpiration, ou un état de conscience diminuée suite à l'ingestion d'un médicament.

- Vous avez déjà eu des symptômes incluant une température élevée, une

raideur musculaire, une transpiration, ou un état de conscience diminuée suite à l'ingestion d'un médicament.

- Médicaments qui peuvent changer l'activité électrique de votre cœur, tels que

les médicaments contre le paludisme, les problèmes de rythme cardiaque, les

alergies (antihistaminiques), certains antidiépresseurs ou d'autres médicaments

destinés à des problèmes mentaux.

- Médicaments qui entraînent un ralentissement des battements du cœur.

- Médicaments qui entraînent une baisse du potassium dans le sang (par exemple, certains diurétiques).

- Médicaments qui traitent la tension artérielle augmentée. PRISDAL® peut diminuer la tension artérielle.

- Médicaments de la maladie de Parkinson (par exemple levodopa).

- Médicaments augmentant l'activité du système nerveux central

(psychostimulants, tels que la méthylphénidate).

- Comprimes facilitant l'élimination des urines (urétiques) utilisés dans les problèmes cardiaques ou les gonflements de certaines parties de votre corps dans une accumulation de quantités trop importantes d'eau (par exemple furosemide ou chlorothiazide). PRISDAL® peut aussi ou du furosemide peut entraîner une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral ou de décès chez les personnes âgées élémentaires.

- Les médicaments suivants peuvent diminuer l'effet de la rispédoncine :

- Rilampicline (un médicament pour traiter certaines infections).

- Carbamazépine, phénytoïne (médicaments de l'épilepsie).

- Phénothiazines (médicaments utilisés dans le traitement des psychoses ou pour calmer).

- Cimétidine, ranitidine (qui bloquent l'acidité de l'estomac).

- Itraconazole et ketoconazole (médicaments pour le traitement des infections fongiques).

- Certains médicaments utilisés dans le traitement du VIH/SIDA, comme le ritonavir.

- Vérapamil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et/ou anomalie du rythme cardiaque.

- Sertaline et fluoxamine, médicaments utilisés pour traiter la dépression et d'autres troubles psychiatriques.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments, vous pourrez avoir besoin d'une dose différente de rispédoncine.

- Les médicaments suivants peuvent augmenter l'effet de la rispédoncine :

- Antécédents (telle que paracétamol, ibuprofène, antidiépresseurs tricycliques).

- Médicaments appelés bêta-bloquants (utilisés pour traiter une tension artérielle élevée).

- Phénothiazines (médicaments utilisés dans le traitement des psychoses ou pour calmer).

- Cimétidine, ranitidine (qui bloquent l'acidité de l'estomac).

- Itraconazole et ketoconazole (médicaments pour le traitement des infections fongiques).

- Certains médicaments utilisés dans le traitement du VIH/SIDA, comme le ritonavir.

- Vérapamil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et/ou anomalie du rythme cardiaque.

- Sertaline et fluoxamine, médicaments utilisés pour traiter la dépression et d'autres troubles psychiatriques.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments, vous pourrez avoir besoin d'une dose différente de rispédoncine.

- Si vous n'êtes pas certain que ce qui précède s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PRISDAL®.

Interactions avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture. Vous devez éviter de boire de l'alcool pendant le traitement par PRISDAL®.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous alliez, si vous pensez être enceinte ou

planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez le prendre.

- Les symptômes suivants peuvent apparaître chez les nouveau-nés dont les mères ont utilisé la rispédoncine, durant le dernier trimestre (les trois derniers mois de leur grossesse) : tremblement, râles et/ou faiblesse musculaire, endormissement, agitation, problème de respiration et difficultés à s'alimenter. Si votre bébé développe l'un de ces symptômes, vous devez contacter votre médecin.

- PRISDAL® peut augmenter votre taux d'une hormone appelée « prolactine » qui peut avoir un impact sur la fertilité.

Spécificités

Effets contre-indiqués

Effets contre-indiqués à l'administration par voie buccale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie parentérale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie nasale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie oculaire

Effets contre-indiqués à l'administration par voie cutanée

Effets contre-indiqués à l'administration par voie intraveineuse

Effets contre-indiqués à l'administration par voie intraveineuse et/ou intramusculaire

Effets contre-indiqués à l'administration par voie intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale

Effets contre-indiqués à l'administration par voie rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale et/ou intraveineuse et/ou intramusculaire et/ou nasale et/ou oculaire et/ou rectale

2. Introduire la seringue (pipette) dans le flacon.
3. Tout en tenant la callette du flacon, tirez le piston vers le bas jusqu'à la graduation correspondant au nombre de millilitres ou milligrammes que vous devez prendre.
4. Tout en tenant la callette du flacon, sortez la seringue (pouvez entièrement du flacon.
5. Videz la seringue dans une boîte non alcoolisée, à l'exception thé. Abaissez le piston.
6. Fermez le flacon.
7. Rinsez la seringue (pipette) avec de l'eau.

PRISDAL®
Risperidone

1 mg/ml

Flacon de 60 ml

6 118001 251872

en début de jour

solution buvable

à mi-jour

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

et/ou au début de la matinée

et/ou au début de la soirée

et/ou au début de la nuit

ns les oreilles,

suption de la

condicione

de votre

coeur,

mal de la

puissances dans

les oreilles,

suption de

la respiration

elles très dures,

les oreilles,

suption de

