

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

16FIFB

Coumer

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 831 Société : Agence Rabat

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL HADDAD M^{es}

Date de naissance : 1935

Adresse : Lot Janini N° 9 Tabriquet Salé

Tél. : 0666440693 Total des frais engagés : 1247, DH Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Souad SOUFIANI
Hépato - Gastro - Entérologue
3. Av. Amir My Abdellah - Rabat
INP : 101130789
Tél : 0527 73 66 89 - GSM : 0638 00 19 46

Date de consultation : 4/10/2013

Nom et prénom du malade : EL HADDAD MOHAMED Age : 1935

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Dr Abdellah m^{es} tr.

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



9



Déclaration de Maladie

M22- 0005089

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
14/7/23	6		Hépato - Gastro - Entérologue Dr. Souad SOUFIANI Hôpital Universitaire du Médecin Amrik MY ADDELLAH Rabat 3, Av. Amrik MY ADDELLAH - Rabat INP : 101130788 GSM : 0639 00 19 45
- JULI 2023	Echographie Abdomine		300,000 Dhs
			400,000 Dhs

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie AL MOUAHAD Av. El Moudidine, N° 9 Tél: 037 86 09 68 Hôpital Universitaire du Médecin Amrik MY ADDELLAH	14/7/2023	547.20

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX

ODF PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
H	25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G		

[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

MONTANTS DES SOINS	DATE DU DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

DATE DE L'EXECUTION	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET D'HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

Dr Souad SOUFIANI

Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif et de l'Anus
Endoscopie - Echographie Digestive
Ancienne Attachée d'Echographie et d'Endoscopie
Digestive au CHU Ibn Sina



الدكتورة سعاد السفياني

اختصاصية في أمراض
الجهاز الهضمي والبواسر
ملحقة سابقاً في الكشف الداخلي للجهاز الهضمي
والفحص بالأمواج فوق الصوتية بمستشفى ابن سينا

Rabat, le 4/4/2023

Hôpital

ECHOGASTRO

Dr. SOUAD SOUFIANI
Hépato - Gastro - Entérologue
3, Av. Amir My Abdellah - Rabat
Tél : 0537 73 66 89 - GSM : 0639 00 19 46

Med.

2x 80,40

- Deluidat 200 mg q=

1q x 2/j ailleurs x 1 mois

2x 113,70

- Paraciphex 20mg

1cp/j x 2 mois

2x 79,90

- Kalmagas transit :

2q x 2/j x 10/j

et au besoù.

T=547-20

SALE - TBL - 03/07/86 09:30
HELI - MEDICAL - 03/07/86 09:30
ARMÉE AL MOURADI
Dr. Souad SOUFIANI
Hépato - Gastro - Entérologue
3, Av. Amir My Abdellah - Rabat
INP 101130789
Tél : 0537 73 66 89 - GSM : 0639 00 19 46



Comprimé
Voie orale

KALMAGAS®

Transit

LOT : 230270
PER : 03/2026
PPC : 79,90DH

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION :

Charbon végétal activé, Rhubarbe (*Rheum palmatum*) extrait sec, Fenouil (*Foeniculum vulgare*) huile essentielle, Menthe poivrée (*Mentha piperita*) huile essentielle, Wakamé (*Undaria pinnatifida*), F.O.S (Fructo-Oligosaccharides).

PROPRIÉTÉS :

KALMAGAS® Transit est à base de charbon végétal activé et d'actifs naturels dont la synergie contribue à éliminer les gaz et à soulager les spasmes intestinaux tout en facilitant le transit procurant ainsi un confort intestinal global.

UTILISATION :

KALMAGAS® Transit est recommandé en cas de Ballonnement intestinal associé à une constipation.

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, de préférence après les repas.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par Thérapharm.

Autorisation ministère de la santé n° : DA20191310339DMP/20UCAMAv3.



Comprimé
Voie orale

KALMAGAS®

Transit

LOT : 230270
PER : 03/2026
PPC : 79,90DH

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION :

Charbon végétal activé, Rhubarbe (*Rheum palmatum*) extrait sec, Fenouil (*Foeniculum vulgare*) huile essentielle, Menthe poivrée (*Mentha piperita*) huile essentielle, Wakamé (*Undaria pinnatifida*), F.O.S (Fructo-Oligosaccharides).

PROPRIÉTÉS :

KALMAGAS® Transit est à base de charbon végétal activé et d'actifs naturels dont la synergie contribue à éliminer les gaz et à soulager les spasmes intestinaux tout en facilitant le transit procurant ainsi un confort intestinal global.

UTILISATION :

KALMAGAS® Transit est recommandé en cas de Ballonnement intestinal associé à une constipation.

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, de préférence après les repas.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par Thérapharm.

Autorisation ministère de la santé n° : DA20191310339DMP/20UCAMAv3.

**LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST
NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ
CERTAINS PATIENTS :**

Lactose

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT (POSOLOGIE ET
MODE D'ADMINISTRATION) :**

RESERVE A L'ADULTE.

1 comprimé, 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

**FREQUENCE ET MOMENTS AUXQUELS LE MEDICAMENT
DOIT ETRE ADMINISTRE :**

3 prises par jour.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.**

**EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS
INDESIRABLES) :**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : rares réactions cutanées.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONDITIONS DE DELIVRANCE :

CE MEDICAMENT EST INSCRIT SUR LE TABLEAU C
VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DELIVRER QUE SUR PRESENTATION DE VOTRE ORDONNANCE.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE limite D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULAIRES DE CONSERVATION :

Ce médicament est à conserver à l'abri de la lumière.

UT. AV. :

11 25

P.P.V

LOT N° : G T 6 6 1 5 8 0 0 0

® Marque déposée
Laboratoires PFIZER S.A.
0,5 km route de Oualidia - El Jadida

**LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST
NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ
CERTAINS PATIENTS :**

Lactose

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT (POSOLOGIE ET
MODE D'ADMINISTRATION) :**

RESERVE A L'ADULTE.

1 comprimé, 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

**FREQUENCE ET MOMENTS AUXQUELS LE MEDICAMENT
DOIT ETRE ADMINISTRE :**

3 prises par jour.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.**

**EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS
INDESIRABLES) :**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : rares réactions cutanées.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONDITIONS DE DELIVRANCE :

CE MEDICAMENT EST INSCRIT SUR LE TABLEAU C
VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DELIVRER QUE SUR PRESENTATION DE VOTRE ORDONNANCE.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE limite D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULAIRES DE CONSERVATION :

Ce médicament est à conserver à l'abri de la lumière.

UT. AV. :

11 25

P.P.V

LOT N° : G T 6 6 1 5 8 0 0 0

® Marque déposée
Laboratoires PFIZER S.A.
0,5 km route de Oualidia - El Jadida



Ranipex® 10 et 20 mg

Rabéprazole sodique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

RANCIPHEX® 10 mg.

RANCIPHEX® 20 mg.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

RANCIPHEX® 10 mg.

La substance active est :

Rabéprazole sodique	10 mg
Pour un comprimé gastro-résistant.	

RANCIPHEX® 20 mg

La substance active est :

Rabéprazole sodique	20 mg
Pour un comprimé gastro-résistant.	

Les autres composants :

Mannitol, oxyde de magnésium, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium, éthylcellulose, phthalate d'hydromélose, monoglycérides diacétyle, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente sous forme de comprimés gastro-résistants. Boîtes de 14, 28 et 56.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons.

RANCIPHEX® contient la substance active rabéprazole sodique. Il appartient à un groupe de médicaments appelés «inhibiteurs de la Pompe à Protons» (IPPs). Ils fonctionnent par diminution de la quantité d'acide produite par votre estomac.

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

RANCIPHEX® est utilisé dans le traitement :

- Du «Réflux Gastro-Œsophagien» (RGO), qui peut inclure des brûlures d'estomac. Le RGO se produit lorsque de l'acide et des aliments s'échappent de votre estomac et remontent dans votre oesophage.

- Des ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin. Si ces ulcères sont infectés par des bactéries appelées «Helicobacter Pylori» (H. Pylori), des antibiotiques vous seront prescrits. L'utilisation de comprimés de RANCIPHEX® en association à des antibiotiques élimine l'infection et permet la cicatrisation de l'ulcère. Cela empêche également l'infection et l'ulcère de se reproduire.

- Du syndrome de Zollinger-Ellison: lorsque votre estomac produit trop d'acide.

6. POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION

Instructions pour un bon usage

Prenez toujours RANCIPHEX® exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Si vous avez un doute, vous devez vérifier avec votre médecin ou avec votre pharmacien.

Prise de ce médicament

Prenez ce médicament à l'heure fixe de son emballage seul.

Les effets indésirables sont généralement modérés et s'améliorent sans que vous ayez besoin d'arrêter de prendre ce médicament.

Arrêtez de prendre RANCIPHEX® et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical urgent :

- Réactions allergiques - les signes peuvent inclure : gonflement soudain de votre visage, difficulté à respirer ou pression sanguine basse pouvant causer un évanoissement ou une chute.
- Signes fréquents d'infection, tels qu'un mal de gorge, une température élevée (fièvre), ou un ulcère dans votre bouche ou votre gorge.
- Confusions ou saignements faciles.
- Ces effets indésirables sont rares (touchent moins de 1 personne sur 1000).
- Eruptions vésiculeuses, douleur ou ulcération de votre bouche et de votre gorge.
- Ces effets indésirables sont très rares (touchent moins de 1 personne sur 10000).

Autres effets indésirables possibles :

Fréquents (touchent moins de 1 personne sur 10)

- Infections.
- Sommeil difficile.
- Maux de tête, vertiges.
- Toux, nez qui coule ou mal de gorge (pharyngite).
- Effets sur votre estomac ou votre intestin tels que douleurs au ventre, diarrhées, flatulence, nausées, vomissements ou constipation.
- Courbatures ou mal de dos.
- Faiblesse ou syndrome pseudo-grippal.

Peu fréquents (touchent moins de 1 personne sur 100)

- Nervosité ou somnolence.
- Infection au niveau des poumons (bronchite).
- Sinus douloureux et bouchés (sinusite).
- Bouche sèche.
- Indigestion ou rotis (éruption).
- Eruption cutanée ou rougeur de la peau.
- Douleur au niveau des muscles, des jambes ou des articulations.
- Infection de la vessie (infection des voies urinaires).
- Douleur thoracique.
- Frissons ou fièvre.
- Modifications du fonctionnement de votre foie (mesurable par des tests sanguins).

Rares (touchent moins de 1 personne sur 1000)

- Perte d'appétit (anorexie).
- Dépression.
- Hypersensibilité (incluant des réactions allergiques).
- Troubles visuels.
- Douleur dans la bouche (stomatite) ou perturbations du goût.
- Irritation ou douleur de l'estomac.
- Troubles au niveau du foie ayant pour conséquence un jaunissement de votre peau et du blanc de vos yeux (jaunisse).
- Eruption cutanée avec démangeaisons ou formation de cloques sur votre peau.
- Sudation.
- Troubles des reins.
- Prise de poids.
- Modification des globules blancs dans le sang (mesurable par des tests sanguins) pouvant entraîner des infections fréquentes.
- Diminution des plaquettes dans le sang entraînant des saignements ou des contusions plus facilement que d'habitude.

Autres effets indésirables possibles (fréquence inconnue)

- Augmentation de la taille des seins chez l'homme.
- Réfexion d'eau.
- Faible taux de sodium dans le sang pouvant causer fatigue et confusion, spasmes musculaires, convulsions et coma.
- Les patients ayant déjà eu des problèmes au niveau du foie peuvent très rarement développer une encéphalopathie (maladie du cerveau).
- Si vous prenez RANCIPHEX® pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une déorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération cardiaque, une confusion mentale, une perte de coordination et une faiblesse.



Ranipex® 10 et 20 mg

Rabéprazole sodique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

RANCIPHEX® 10 mg.

RANCIPHEX® 20 mg.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

RANCIPHEX® 10 mg.

La substance active est :

Rabéprazole sodique	10 mg
Pour un comprimé gastro-résistant.	

RANCIPHEX® 20 mg

La substance active est :

Rabéprazole sodique	20 mg
Pour un comprimé gastro-résistant.	

Les autres composants :

Mannitol, oxyde de magnésium, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium, éthylcellulose, phthalate d'hydromélose, monoglycérides diacétyle, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente sous forme de comprimés gastro-résistants. Boîtes de 14, 28 et 56.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons.

RANCIPHEX® contient la substance active rabéprazole sodique. Il appartient à un groupe de médicaments appelés «inhibiteurs de la Pompe à Protons» (IPPs). Ils fonctionnent par diminution de la quantité d'acide produite par votre estomac.

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

RANCIPHEX® est utilisé dans le traitement :

- Du «Réflux Gastro-Œsophagien» (RGO), qui peut inclure des brûlures d'estomac. Le RGO se produit lorsque de l'acide et des aliments s'échappent de votre estomac et remontent dans votre oesophage.

- Des ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin. Si ces ulcères sont infectés par des bactéries appelées «Helicobacter Pylori» (H. Pylori), des antibiotiques vous seront prescrits. L'utilisation de comprimés de RANCIPHEX® en association à des antibiotiques élimine l'infection et permet la cicatrisation de l'ulcère. Cela empêche également l'infection et l'ulcère de se reproduire.

- Du syndrome de Zollinger-Ellison: lorsque votre estomac produit trop d'acide.

6. POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION

Instructions pour un bon usage

Prenez toujours RANCIPHEX® exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Si vous avez un doute, vous devez vérifier avec votre médecin ou avec votre pharmacien.

Prise de ce médicament

Prenez ce médicament à l'heure fixe de son emballage seul.

Les effets indésirables sont généralement modérés et s'améliorent sans que vous ayez besoin d'arrêter de prendre ce médicament.

Arrêtez de prendre RANCIPHEX® et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical urgent :

- Réactions allergiques - les signes peuvent inclure : gonflement soudain de votre visage, difficulté à respirer ou pression sanguine basse pouvant causer un évanoissement ou une chute.
- Signes fréquents d'infection, tels qu'un mal de gorge, une température élevée (fièvre), ou un ulcère dans votre bouche ou votre gorge.
- Confusions ou saignements faciles.
- Ces effets indésirables sont rares (touchent moins de 1 personne sur 1000).
- Eruptions vésiculeuses, douleur ou ulcération de votre bouche et de votre gorge.
- Ces effets indésirables sont très rares (touchent moins de 1 personne sur 10000).

Autres effets indésirables possibles :

Fréquents (touchent moins de 1 personne sur 10)

- Infections.
- Sommeil difficile.
- Maux de tête, vertiges.
- Toux, nez qui coule ou mal de gorge (pharyngite).
- Effets sur votre estomac ou votre intestin tels que douleurs au ventre, diarrhées, flatulence, nausées, vomissements ou constipation.
- Courbatures ou mal de dos.
- Faiblesse ou syndrome pseudo-grippal.

Peu fréquents (touchent moins de 1 personne sur 100)

- Nervosité ou somnolence.
- Infection au niveau des poumons (bronchite).
- Sinus douloureux et bouchés (sinusite).
- Bouche sèche.
- Indigestion ou rotis (éruption).
- Eruption cutanée ou rougeur de la peau.
- Douleur au niveau des muscles, des jambes ou des articulations.
- Infection de la vessie (infection des voies urinaires).
- Douleur thoracique.
- Frissons ou fièvre.
- Modifications du fonctionnement de votre foie (mesurable par des tests sanguins).

Rares (touchent moins de 1 personne sur 1000)

- Perte d'appétit (anorexie).
- Dépression.
- Hypersensibilité (incluant des réactions allergiques).
- Troubles visuels.
- Douleur dans la bouche (stomatite) ou perturbations du goût.
- Irritation ou douleur de l'estomac.
- Troubles au niveau du foie ayant pour conséquence un jaunissement de votre peau et du blanc de vos yeux (jaunisse).
- Eruption cutanée avec démangeaisons ou formation de cloques sur votre peau.
- Sudation.
- Troubles des reins.
- Prise de poids.
- Modification des globules blancs dans le sang (mesurable par des tests sanguins) pouvant entraîner des infections fréquentes.
- Diminution des plaquettes dans le sang entraînant des saignements ou des contusions plus facilement que d'habitude.

Autres effets indésirables possibles (fréquence inconnue)

- Augmentation de la taille des seins chez l'homme.
- Réfexion d'eau.
- Faible taux de sodium dans le sang pouvant causer fatigue et confusion, spasmes musculaires, convulsions et coma.
- Les patients ayant déjà eu des problèmes au niveau du foie peuvent très rarement développer une encéphalopathie (maladie du cerveau).
- Si vous prenez RANCIPHEX® pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une déorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération cardiaque, une confusion mentale, une perte de coordination et une faiblesse.

DOCTEUR SOUAD SOUFIANI

SPECIALISTE DES MALADIES DE
L'APPAREIL DIGESTIF ET DE L'ANUS
Endoscopie-echographie Digestive
Ancienne Attachée D'echographie et
D'endoscopie Digestive Du C HU Ibn Sina

Facture

Mr ELHADDAD MOHAMMED
101130789

LE 4/7/2023

- Consultation spécialiste : 300.00DH
- Echographie abdominale : 400.00DH
- Arrêt de la présente facture a la Somme de : 700.00DH



3 Bis, AV Amir MY abdellah (imm Mac Donald's) Rabat Tel: 05 37 73 66 89
GSM: 0639001946