

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1336 Société : R.A.M

Actif  Pensionné(e)  Autre : Retraite

Nom & Prénom : BOULAL AFIFA


Date de naissance : 01/03/49

Adresse : 52 Rue de la PIÈCE 04518 CASA

Tél. : 0661 172 672 Total des frais engagés : 1857,63 + 230,50 Dhs 2088,13

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 12/06/2013

Nom et prénom du malade : BOULAL Afifa Age:

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Affection Rhumatologique


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PARMACIE RIVIERA r. ESSALHI Abdellaziz Angle Bd. Gbadam & Rue Marché Riviera 19700-Casablanca	12-06-23 26-06-23	MARMAZ 39300 DR. ESSALHI Abdellaziz Angle Bd. Gbadam & Rue Marché Riviera 19700-Casablanca 11:05 AM 26.06.23

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	13.06.23	B810	1257,10

#### AUXILIAIRES MÉDICAUX

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

**Dr. Chahidi Naima**

RHUMATOLOGUE

Spécialiste des maladies des os, articulations  
et colonne vertébrale



الدكتورة نعيمة شهيدى

Ancienne interne des Hôpitaux de Paris

Pathologies rachidiennes (Paris)

Maladies rhumatismales (Lille)

Biothérapie

Ostéoporose

أخصائية في جراحة العظام  
و المفاصل و الروماتيزم

طبيبة داخلية سابقة بمستشفيات باريس  
أمراض المهدود الفقرى (باريس)

أمراض الروماتيزم (ليل - فرنسا)

العلاج بالأدوية البيولوجية  
شاشة العظام

Casablanca le : ..... ١٢٦٥٦١٢٣ .....

Am Boulaq Afif

① 1340 Colchicine 5mg 2x4jj + Ng ..

② Relaxine 375mg 1x1jj le mardi et samedi

99 -  
x2

③ Venoxxal Crel 82.5

x2 à prendre de 200ml au bout de 20mn à faire

par un tiers

Espace Andalouse, 1er étage, N°6 - Maarif - Casablanca  
Tél. : 05 22 95 14 38 / 06 66 71 75 15 / E-mail : chahidirhumatologie@gmail.com

Dr. CHAHIDI NAIMA  
Rhumatologue  
T.S.V.P.

173، شارع يعقوب المنصور، فضاء الأندلس، الطابق الأول رقم 05 22 95 14 38 - الدار البيضاء

173, Boulevard Yacoub El Mansour, Espace Andalouse, 1er étage, N°6 - Maarif - Casablanca

Tél. : 05 22 95 14 38 / 06 66 71 75 15 / E-mail : chahidirhumatologie@gmail.com

④ Dipal Cet

19,-

apple x 21 x 575 pudi

per kg.

01.05.00 49700-CASABLANCA  
LES ESPERANCES-MARCHÉ RIVIERA  
DR. ESSALY 361 RUE  
HANNIBAL GELAIZI  
78+5  
489 09

~~Dr. CHAILLY~~  
Tél: 05 22 95 14 35  
Espace Andalousie  
173, bd  
Dr. CHAILLY  
Tél: 05 22 95 14 35  
Espace Andalousie

# COLCHICINE OPACALCIUM 1mg, comprimé sécable, boîte de 20 (Colchicine cristallisée)

## MISE EN GARDE SPECIALES

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.  
Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable?
3. Comment prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE Colchicine Opocalcium 1 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIGOUTTEUX, Anti-inflammatoire. code ATC : M04AC01

Ce médicament est préconisé dans :

- Le traitement et la prévention des crises de goutte,
- La maladie périodique,
- La maladie de Behcet,
- Autres accès aigus microcristallins.
- Traitement de la péricardite aiguë idiopathique en association aux traitements anti-inflammatoires classiques au cours d'un premier épisode de péricardite ou d'une récidive.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie rénale grave (défaillance du fonctionnement du rein),
- Si vous avez une maladie grave du foie (défaillance du fonctionnement du foie),
- Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine).
- Si vous êtes enceinte (dans l'indication péricardite).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable.

### Mises en garde spéciales

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir rubrique «Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable») est contre-indiquée.

### Précautions d'emploi

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

Informez votre

docteur, votre pharmacien ou votre infirmier.

Colchicine est contre-indiquée compte-tenu de l'association avec les AINS.

que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, ou si vous prenez d'autres médicaments.

Ne prenez pas de colchicine avec des aliments et boissons.

Colchicine est contre-indiquée compte-tenu de l'association avec les AINS.

que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, ou si vous prenez d'autres médicaments.

13,40

machines

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable contient du lactose et du saccharose



Gélule  
Voie orale

# Relaxium® B6

**Deva**  
PRODUITS DÉPARTEMENTAUX

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin ..... 260 mg

équivalent en Magnésium ..... 150 mg

Vitamine B6 ..... 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin ..... 520 mg

équivalent en Magnésium ..... 300 mg

Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin ..... 650 mg

équivalent en Magnésium ..... 375 mg

Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

## PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA/

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA/

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA/





Gélule  
Voie orale

# Relaxium® B6

**Deva**  
PRODUITS DÉPARTEMENTAUX

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin ..... 260 mg

équivalent en Magnésium ..... 150 mg

Vitamine B6 ..... 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin ..... 520 mg

équivalent en Magnésium ..... 300 mg

Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin ..... 650 mg

équivalent en Magnésium ..... 375 mg

Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

## PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA/

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA/

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA/



# **VENOXYL**

## **GEL**

### **COMPOSITION :**

- Aqua
- Alcohol denat
- Carbomer
- Arachis Hypogaea
- Menthol
- Triethanolamine
- Benzophénone 4
- CI 42090-
- CI 19140

### **PROPRIETES :**

**VENOXYL GEL**, grâce à l'originalité de ses actions synergiques, lutte efficacement contre :

- lourdeur et pesanteur des jambes
- Sensation de chaleur des jambes
- Mauvaise circulation

**VENOXYL GEL** par son action décongestionnante apporte aux jambes fatiguées une sensation immédiate de fraîcheur, hydrate et redonne élasticité à la peau.

### **CONSEILS D'UTILISATION :**

- Prendre une noix de **VENOXYL GEL** pour chaque jambe dans le creux de votre main
- Etaler **VENOXYL GEL** en remontant de la cheville à la cuisse jusqu'à absorption complète du produit
- Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'appliquer **VENOXYL GEL** 2 fois par jour
- Convient à tous les types de peaux
- Ne tâche pas.

### **PRECAUTION D'EMPLOI :**

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.

### **PRESENTATION :**

Tube de 40 ml

LABORATOIRES



USAGE EXTE

LABORA  
7, RUE du  
78360

VF73 0925  
LOT \_\_\_\_\_  
Prix 82.50  
PER YL

# **VENOXYL**

## **GEL**

### **COMPOSITION :**

- Aqua
- Alcohol denat
- Carbomer
- Arachis Hypogaea
- Menthol
- Triethanolamine
- Benzophénone 4
- CI 42090-
- CI 19140

### **PROPRIETES :**

**VENOXYL GEL**, grâce à l'originalité de ses actions synergiques, lutte efficacement contre :

- lourdeur et pesanteur des jambes
- Sensation de chaleur des jambes
- Mauvaise circulation

**VENOXYL GEL** par son action décongestionnante apporte aux jambes fatiguées une sensation immédiate de fraîcheur, hydrate et redonne élasticité à la peau.

### **CONSEILS D'UTILISATION :**

- Prendre une noix de **VENOXYL GEL** pour chaque jambe dans le creux de votre main
- Etaler **VENOXYL GEL** en remontant de la cheville à la cuisse jusqu'à absorption complète du produit
- Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'appliquer **VENOXYL GEL** 2 fois par jour
- Convient à tous les types de peaux
- Ne tâche pas.

### **PRECAUTION D'EMPLOI :**

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.

### **PRESENTATION :**

Tube de 40 ml

LABORATOIRES



USAGE EXTE

LABORA  
7, RUE du  
78360

VF73 0925  
LOT \_\_\_\_\_  
Prix 82.50  
PER YL

# DIFAL® 1% Gel

## Diclofénac sodique

### PRESENTATIONS ET COMPOSITION :

Gel dosé à 1% de Diclofénac sodique : Tubes de 20 g et de 50 g.

### PROPRIETES :

Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l'acide phénylacétique du groupe des acides arylcarboxyliques.  
Sous forme de gel, il possède une activité locale anti-inflammatoire et antalgique.

### INDICATIONS :

Traitements locaux de courte durée chez l'adulte (à partir de 15 ans), en cas de traumatologie bénigne, entorses, contusions.

- Tendinites des membres supérieurs et inférieurs.
- Oedèmes post-opératoires et post-traumatiques.
- Traitement symptomatique de l'arthrose douloureuse des doigts et des genoux.

### CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie au diclofénac ou aux substances d'activité proche, autres AINS.
- Hypersensibilité à l'un des composants.
- A partir du début du 6ème mois de la grossesse.
- Peau lésée, quelle que soit la lésion : dermatoses suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

### EFFETS INDÉSIRABLES :

Cas fréquents :

Réactions cutanées : éruptions, eczéma ; érythèmes, dermatites (incluant les dermatites de contact).

Cas rares :

Réactions cutanées : dermatose bulleuse. Un prurit associé est parfois observé.

Cas très rares et cas isolés :

Réactions cutanées : éruption pustuleuse, urticaire, purpura, ulcérations locales.

Réactions d'hypersensibilité : œdème angioneurotique (œdème de Quincke).

Problèmes respiratoires : la survenue de crise d'asthme peut être liée chez certains sujets à une allergie à l'aspirine ou à un AINS. Dans ce cas, DIFAL 1% Gel est contre-indiqué.

Autres réactions cutanées : cas isolés de photosensibilité.

Autres effets systémiques des AINS :

Ils sont fonction du passage transdermique du principe actif et donc de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée, du degré d'intégrité cutanée, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement occlusif (effets digestifs, rénaux).

### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Réservez à l'adulte (à partir de 15 ans).

### Mises en garde :

- Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux ; appliquer uniquement sur la région douloureuse.
- L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

### Précautions d'emploi :

DIFAL® 1% Gel ne doit pas être utilisé sous pansement occlusif.

### Grossesse :

Le diclofénac est contre-indiqué au cours du troisième trimestre de la grossesse au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus).

### Allaitement :

Le diclofénac, comme tous les AINS, passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'administrer chez la femme qui allait. Si la situation impose son utilisation, le diclofénac Gel ne doit pas être appliqué sur les seins chez les mères qui allaitent.

### EN CAS DE DOUTE : DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

DIFAL® 1% Gel est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Réservez à l'adulte (à partir de 15 ans).

### Posologie :

1 application, 3 fois par jour.

Durée de traitement : La durée de traitement est limitée à 4 jours.

### Mode d'administration :

Voie locale - Usage externe. A ne pas avaler.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

### EN CAS DE DOUTE : DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

En raison du faible passage systémique lors d'un usage normal du gel, les interactions médicamenteuses sont peu probables.

### CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Durée de conservation après ouverture = 6 mois.

### Délivrance : Libre.

DIFAL® 1% Gel - Tube de 20 g - AMM N° : 03 DMP/21/NNP

DIFAL® 1% Gel - Tube de 50 g - AMM N° : 04 DMP/21/NNP

Edition : Janvier 2013



IMP ADIR 02/20  
NDFAZ9YFA01

di Naima



الدكتورة نعيمة شهيدى

أخصائية في جراحة العظام  
والمفاصل و الروماتيزم

طبيبة داخلية سابقة بمستشفيات باريس  
أمراض العمود الفقري (باريس)  
أمراض الروماتيزم (ليل - فرنسا)  
العلاج بالأدوية البيولوجية  
هشاشة العظام

NOUVELLE DEMANDE

NOUVELLE DEMANDE

CLOGUE  
es des os, articulations  
vertébrale  
; Hôpitaux de Paris  
diennes (Paris)  
ismales (Lille)  
'apie  
rose

Casablanca le : ..... ٢٣.٦.١٤٢٣

Mme BOULAL Afifa

Mme BOULAL Afifa  
03-03-1949  
2306133046



SUR CAHIER  
CHAHIN

Osteoporose

Alzheimer

Vertebre

Osteopénie = 1-

Hypertension

Créatininémie

MSAF MÉDIAT



173، شارع يعقوب المنصور، فضاء الأندلس، الطابق الأول رقم 6 - المعاريف - الدار البيضاء

173, Boulevard Yacoub El Mansour, Espace Andalouse, 1er étage, N°6 - Mâarif - Casablanca

Tél. : 05 22 95 14 38 / 06 66 71 75 15 / E-mail : chahidirhumatologie@gmail.com

# Dr. Chahidi Naima

RHUMATOLOGUE

Spécialiste des maladies des os, articulations  
et colonne vertébrale



Ancienne interne des Hôpitaux de Paris

Pathologies rachidiennes (Paris)

Maladies rhumatismales (Lille)

Biothérapie

Ostéoporose

الدكتورة نعيمة شهيدى

أخصائية في جراحة العظام  
والمفاصل والروماتيزم

طبيبة داخلية سابقة بمستشفى باريس

أمراض العمود الفقري (باريس)

أمراض الروماتيزم (ليل - فرنسا)

العلاج بالأدوية البيولوجية

شاشة العظام

Casablanca le : 26.06.2023



Mme BOULAL Afifa

Maphar  
Bd Alklimia N° 6, Ql.  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
UVEDOSE 100 000 UI/2 ml  
SOL BUV  
P.P.V : 19,50 DH  
5 118001 185030

Maphar  
Bd Alklimia N° 6, Ql.  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
UVEDOSE 100 000 UI/2 ml  
SOL BUV  
P.P.V : 19,50 DH  
5 118001 185030

Maphar  
Bd Alklimia N° 6, Ql.  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
UVEDOSE 100 000 UI/2 ml  
SOL BUV  
P.P.V : 19,50 DH  
5 118001 185030

19,50

1 ampoule / 15 jours

x3

Puis après 15 jours commence

2/ curogyl 03

89,50 10 gouttes / jour pendant 3 mois

T = 1481,-

Dr. CHAHIDI Naima  
Rhumatologue  
173 Avenue Yacoub El Mansour  
Espace Andalouse, 1er étage, N°6  
Tél. : 05 22 95 14 38 / 06 66 71 75 15 / E-mail : chahidirhumatologie@gmail.com

173، شارع يعقوب المنصور، فضاء الأندلس، الطابق الأول رقم 6 - المعاريف - الدار البيضاء

173, Boulevard Yacoub El Mansour, Espace Andalouse, 1er étage, N°6 - Mâarif - Casablanca

Tél. : 05 22 95 14 38 / 06 66 71 75 15 / E-mail : chahidirhumatologie@gmail.com



# Curogyl® D3

Vitamine D3

(Cholecalciférol)

## FORME ET PRÉSENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte-gouttes de 30 ml.

## COMPOSITION :

Huile de soja, antioxydant : acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3.  
(1 goutte = 200 UI = 5µg ).

## PROPRIÉTÉS :

Curogyl® D3 gouttes buvables aide à couvrir les besoins en vitamine D au quotidien. Il renforce la solidité osseuse en favorisant l'assimilation du calcium et stimule les défenses immunitaires naturelles de l'organisme.

## CONSEILS D'UTILISATION :

Suivre les recommandations d'un professionnel de la santé. Bien agiter avant emploi. Les gouttes sont à diluer dans un liquide froid de préférence (lait, jus de fruits...). Le flacon est muni d'un compte goutte.

1 goutte = 200 UI

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par Thérapharm - Casablanca.

Autorisation ministère de la santé n° : 20211711315/MAv3DMP/CA/18

# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

Dr. Mohammed BEZZARI

Médecin Biogiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



مختبر  
التحليلات الطبية

Dr. Kaoutar OUAZZANI

Pharmacienne Biogiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd

## FACTURE N° 2306133046 LABORATOIRE CASALAB PALMIER

Casablanca le 13/06/2023

INPE : 093002574

Mme Afifa BOULAL

Demande N° 2306133046

Date de l'examen : 13/06/2023

Récapitulatif des analyses		
Analyse		Clé
Prise de sang Adulte		E25
Albuminémie (Méthode immunologique)		B60
Transaminases P (TGP)		B50
Transaminases O (TGO)		B50
Calcium		B30
Créatinine		B30
Glycémie		B30
Gamma glutamyl transférase ( GGT)		B50
Hémoglobine glycosylée		B100
Vitamine D		B450

Total des B : 850  
Total à payer : **1257.50** Dirhams

Arrêtée la présente facture à la somme de :

**mille deux cent cinquante-sept dirhams cinquante centimes**

\*(HN) = analyse hors nomenclature



# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

Dr. Mohammed BEZZARI

Médecin Biologiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



مختبر  
التحليلات الطبية

Dr. Kaoutar OUAZZANI

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd

## LABORATOIRE CASALAB PALMIER®

Dossier N°: 2306133046

Résultats de : Mme BOULAL Afifa

Né(e) le : 03/03/1949 – 74 ans

N° CIN :

Date du prélèvement : 13/06/2023 09:21. ASS

Edition du : 13/06/2023 à 12:15

Madame Le Dr Naima CHAHIDI ( Rhumato )

Cher confrère, nous vous remercions de votre confiance, et nous vous transmettons les résultats de votre patient.

< Compte-rendu complet >

## BIOCHIMIE

14/10/2021

### Créatinine:

(Dosage colorimétrique cinétique)

5,0 mg/L

44,3 µmol/l


(3,0–12,0)

(26,6–106,2)

6,0

53,1

• Antériorité : Crétatnine (mg/L)



### Calcium

(Arsenazo III)

94,2 mg/L

2,36 mmol/L

(84,0–102,0)

(2,10–2,55)



Dossier n° 2306133046 – Mme Afifa BOULAL

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CASALAB PALMIER SCP

50, Rue Al Mortada - Palmier - Casablanca

05 22 236 717 / 05 22 988 383 05 22 236 729 accueil.casalab@gmail.com

IF : 37741235 • Patente : 34777267 • CNSS : 6576120 • ICE : 002189772000081



# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

Dr. Mohammed BEZZARI

Médecin Biologiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



Urgences 24h/24 7j/7

# مختبر التحليلات الطبية

Dr. Kaoutar OUAZZANI

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd

## Métabolisme Glucidique

25/10/2014

HbA1c

(HPLC: (HLC-723.G7))

5,7 %

(4,0-6,0)

5,9


### Interprétation des résultats:

Sujet non traité pour un diabète:

- Normal : 4-6%

Sujet diabétique de type II traité:

- Bon contrôle: < ou = à 6.5%
- Contrôle acceptable : 6.6 - 8.00%
- Mauvais contrôle : > à 8%



Dossier n° 2306133046 de Mme Afifa BOULAL



215

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CASALAB PALMIER SCP

50, Rue Al Mortada - Palmier - Casablanca

05 22 236 717 / 05 22 988 383 05 22 236 729 accueil.casalab@gmail.com

IF : 37741235 • Patente : 34777267 • CNSS : 6576120 • ICE : 002189772000081



# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

**Dr. Mohammed BEZZARI**

Médecin Biogiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



# مختبر التحليلات الطبية

**Dr. Kaoutar OUAZZANI**

Pharmacienne Biogiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd


25/10/2014

**Glycémie à jeun:**  
(Hexokinase G6PD-H)

0,90 g/L  
5,00 mmol/L

(0,74-1,09)  
(4,11-6,05)

0,97  
5,38




25/10/2014

**Transaminases GOT (ASAT):**  
(Dosage enzymatique)

15 U/L

(0-32)

16



Dossier n° 2306133046 de Mme Afifa BOULAL

3 / 5



# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

**Dr. Mohammed BEZZARI**

Médecin Biologiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



مختبر  
التحليلات الطبية

**Dr. Kaoutar OUAZZANI**

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd

25/10/2014


## Transaminases GPT (ALAT):

(Dosage enzymatique)

11 U/L

(0-33)

12



25/10/2014


## Gamma glutamyl-transferase (GGT):

(Test colorimétrique enzymatique)

13 U/L

(8-50)

10



## Albumine

(Test colorimétrique)

## 25-OH-Vitamine D (D2+D3)

(COBAS 6000)

40,80 g/L (28,00-54,00)

620,16 μmol/L (425,60-820,80)

19,13 ng/mL (30,00-100,00)



### Interprétation des résultats:

- <10 ng/ml : Carence
- Entre 10 et 30 ng/ml: Déficit
- Entre 30 et 100 ng/ml : Normal
- >100 ng/ml : Toxicité potentielle

Dossier n° 2306133046 de Mme Afifa BOULAL

4 / 5



# LABORATOIRE CASALAB PALMIER SCP

Dr. Mohammed BEZZARI

Médecin Biogiste

Diplômé de l'université Catholique  
de Louvain à Bruxelles, Belgique



Urgences 24h/24 7j/7

Validation biologique par : Le Dr M. BEZZARI

Dr K. OUAZZANI

مختبر  
التحليلات الطبية

Dr. Kaoutar OUAZZANI

Pharmacienne Biogiste

Diplômée de l'université Paris Descartes  
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd



Dossier n° 2306133046 de Mme Afifa BOULAL

5 / 5

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CASALAB PALMIER SCP

50, Rue Al Mortada - Palmier - Casablanca

05 22 236 717 / 05 22 988 383 05 22 236 729 accueil.casalab@gmail.com

IF : 37741235 • Patente : 34777267 • CNSS : 6576120 • ICE : 002189772000081

