

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Hôpital Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

N° W19-423243

**Maladie**

**Dentaire**  
Cadre réservé à l'adhérent (e)

**Optique**

**Autres**

Matricule : 109321 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : SALAH YOUNTASSAR

Date de naissance :

Adresse : HAY EL HAMRA ou RUE 03 5711 12 Apt 13, ATN

.....CHOK CASA

Tél. : 06 61 85 63 89 Dr. BAROUJI GENEYMA Total des frais engagés : 611,110 Dhs

Gynécologue-Obstétricienne

Cadre réservé au Médecin

Qads, Elite Center, Etg. 3

N° 25, Air Chock - Casablanca

Tél: 05 20 53 05 85-06 65 21 15 51

Cachet du médecin :

Date de consultation : 07/06/2023

Nom et prénom du malade : MOUNTASSAR VIA FAA

Age: 21

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : maladie du cycle

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) : YAA



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/06/23	Lg écho		3012 100	INP : 061301966  Dr. BAROUD Oumeyma Gynécologue-Obstétricienne 30, Bd Al Quds Elite Center, Etg. 3 N° 25, Ain Chock - Casablanca

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Amina RIDOLINE Docteur en Pharmacie Tél: 05 22 52 55 10 Casablanca Chira Rue 15 N° 2 Hay	07/06/23	214,40

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				INP : [REDACTED]
				Coefficient des travaux [REDACTED]
				Montants des soins [REDACTED]
				Début d'exécution [REDACTED]
				Fin d'exécution [REDACTED]
				Coefficient des travaux [REDACTED]
				Montants des soins [REDACTED]
				Date du devis [REDACTED]
				Date de l'exécution [REDACTED]




ODF PROTHESSES DENTAIRES

Determination du coefficient masticatoire

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	35533411
G	11433553	

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr. OUMEYMA BAROUD

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique

Diplômée des Facultés de Médecine de Casablanca,  
Paris- Descartes et Clermont Ferrand

Ancien Médecin Interne au CHU Ibn Rochd

Ancien Médecin des Hôpitaux de France

- Suivi de grossesse et accouchement
- Échographie 3D/4D
- Infertilité/ Assistance Médicale à la Procréation
- Chirurgie Gynécologique et Maladies du Sein
- Cœlioscopie - Hystéroscopie - Colposcopie



الدكتورة أميمة بروود

اختصاصية في أمراض النساء والتوليد  
خريجة كلية الطب بالدار البيضاء  
باريس و كليرمون فيران  
طبيبة داخلية سابقة في مستشفى ابن رشد  
طبيبة سابقة في مستشفيات فرنسا


- تبع الحمل والتوليد
- الفحص بالصدى
- تبع العقم والمساعدة على الإنجاب
- جراحة أمراض النساء والتوليد
- التشخص والجراحة بالمنظار

07/06/2023

MLLE MOUNTASSAR WAFAA

84,800 X2 • Duphaston 10 mg - comprimé pelliculé  
1 comprimé par jour pendant 10j puis 1 Comprimé/j du 16e au  
25e j du cycle, pendant 3 mois  
44,60x1

214,40



Dr. BAROUD Oumeyma  
Gynécologue-Obstétricienne  
30, Bd Al Qods, Elite Center, Etg. 3  
N° 25, Ain Chock - Casablanca  
Tél: 05 20 53 05 85-06 65 21 15 51

30 شارع القدس، البيت سنتر الطابق 3 رقم 25 - الدار البيضاء

30, Boulevard Al Qods, Elite Center, 3ème étage, N° 25

05 20 53 05 85 06 65 21 15 51 @dr.o.baroud.gyneco@gmail.com

ces médicaments. Si vous prenez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec un estrogénèse dans le cadre d'un THS, les informations suivantes sont importantes. Veuillez lire également la notice qui accompagne votre médicament oestrogénique.

**Ménopause précoce** Il existe peu de données sur les risques du THS quand il est utilisé pour traiter la ménopause précoce. Il y a un faible niveau de risque chez les plus jeunes femmes. Cela signifie que l'équilibre des avantages et des risques pour les jeunes femmes utilisant un THS pour la ménopause précoce peut être meilleure que chez les femmes âgées.

**Examens médicaux** Avant de débuter un traitement THS, votre médecin doit vous poser des questions sur vos antécédents médicaux personnels et familiaux. Il est indispensable d'effectuer un examen clinique et gynécologique complet. Pendant toute la durée du traitement, des examens réguliers seront effectués, y compris un examen des seins. Il faut en tout cas procéder au moins une fois par an à une évaluation soignante des avantages et des risques et ne poursuivre le THS que tant que les avantages prédominent par rapport aux risques. Vous devrez peut-être être surveillé régulièrement par votre médecin pendant l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

**Cancer de la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre)** Chez les femmes dont l'utérus est intact, la prise prolongée d'un THS à l'oestrogénèse seul a un risque plus élevé de cancer et un épaississement abnormal de la muqueuse utérine. Ce risque supplémentaire peut être évité en combinant des comprimés de progestatif ainsi que des oestrogènes pendant au moins 12 jours. **THS et cancer du sein** Des données suggèrent que la prise de THS combine estro-progestatif et probablement aussi la prise d'estrogènes seuls peut augmenter le risque de cancer du sein. Ce sur-risque dépend de la durée d'utilisation du THS et apparaît après quelques années. Cependant, il retourne au niveau normal après quelque années (au plus 5 ans) après l'arrêt du traitement (THS).

Votre médecin vous demandera de contrôler régulièrement, seins et de l'informer en cas de certains changements.

**THS et cancer ovarien** Le cancer de l'ovaire est rare - beaucoup plus rare que le cancer du sein. L'utilisation d'un THS par estrogène seuls ou par une combinaison d'estrogènes et de progestatifs a été associée à une légère augmentation du risque de cancer ovarien. Le risque de cancer ovarien varie en fonction de l'âge. Par exemple, chez les femmes âgées entre 50 et 54 ans qui ne prennent pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez 2 femmes sur 2000 en moyenne sur une période de 5 ans. Chez les femmes ayant pris un THS pendant 5 ans, il y aura environ 3 cas sur 2000 utilisatrices (soit environ un cas supplémentaire).

**THS et thrombose** La recherche a montré que les femmes sous THS ont environ 1,3 à trois fois plus de risque de thrombose veineuse profonde (un caillot de sang se formant dans une veine dans les jambes, les poumons ou ailleurs dans le corps) que chez les femmes non utilisatrices de THS. Ce risque supplémentaire est plus important pendant la première année d'utilisation de THS.

L'apparition de caillots sanguins peut être graves. Si un caillot sanguin arrive aux poumons, il peut causer une douleur dans la poitrine, un essoufflement, un évanoissement ou même la mort. Le risque d'apparition de caillots sanguins dans les veines augmente si :

- vous êtes âgés,
- vous avez un cancer,
- vous êtes en surpoids,
- vous prenez des estrogènes,
- vous êtes enceinte ou vous venez d'avoir un enfant,
- Si vous avez déjà eu une thrombose veineuse profonde ou avez un autre trouble de la coagulation sanguine ou qu'un proche parent a eu une thrombose veineuse profonde
- vous ne pouvez pas marcher pendant une longue période suite à une intervention chirurgicale importante, une blessure ou une maladie (voir aussi « Intervention chirurgicale »),
- vous avez un lupus érythémateux disséminé. (Maladie affectant le système immunitaire).

Si l'une de ces conditions s'applique à vous, consultez votre médecin pour savoir si vous devez prendre le THS. Si vous avez une thrombose veineuse dans une jambe ou dans une autre partie du corps, arrêtez de prendre le THS. Consultez votre médecin pour savoir si vous devez prendre le THS.

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### **Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé seul :**

**Arrêtez de prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et consultez un médecin immédiatement si vous notez un des effets indésirables suivants :**

- troubles du foie : les signes peuvent inclure un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse), une sensation de faiblesse, un malaise ou une douleur abdominale (touche moins de 1 patiente sur 100), réactions allergiques : les signes peuvent inclure une difficulté à respirer ou des réactions telles qu'une sensation d'être malade, des vomissements, une diarrhée ou une pression artérielle faible (touche moins de 1 patiente sur 1000), gonflement de la peau autour du visage et de la gorge qui peut entraîner des difficultés à respirer (touche moins de 1 patiente sur 1000).

Arrêtez immédiatement de prendre Duphaston 10 et si vous remarquez un des effets indésirables mentionnés ci-dessus.

#### **Autres effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé seul :**

**Très fréquent (touchant plus de 1 personne sur 10)**:

- Saignement vaginal

**Fréquent (touchant moins de 1 patiente sur 10) :**

- migraines, étourdissements, douleurs abdominales

- nausées, vomissements, vertiges ou douloureuses, les moins fréquentes que la normale.



**Touchant moins de 1 patiente sur 100 :**

- maigrissement, augmentation du poids

- le foie (jaunissement de la peau ou des yeux, sensation de sensation générale de malaise ou mal de ventre)

- réactions allergiques cutanées : éruption, démangeaisons importantes et/ou urticaire.

- augmentation du poids

**Touchant moins de 1 patiente sur 1000 :**

- augmentation de la taille des tumeurs sensibles aux progestatifs (telles qu'un méningiome)

- anémie due à une destruction des cellules rouges du sang (anémie hémolytique)

- hypersensibilité

- somnolence

- accumulation soudaine de liquide dans la peau ou les muqueuses (par exemple gorge ou langue), difficultés respiratoires et / ou démangeaisons et éruption cutanée, souvent comme réaction allergique (œdème angioneurotique)

- gonflement des seins

- gonflement dû à une rétention de liquide, souvent au niveau des jambes ou des chevilles.

#### **Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé en association avec un oestrogène (THS oestro-progestatif) :**

Si vous prenez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec un estrogène, veuillez lire également la notice qui accompagne votre médicament estrogénique. Voir la rubrique 2 "Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament" pour plus d'informations concernant les effets indésirables mentionnés ci-après.

**Arrêtez de prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et consultez un médecin immédiatement si vous notez un des effets indésirables suivants :**

- gonflement douloureux dans une jambe, douleur soudaine dans la poitrine ou difficulté à respirer. Ces signes pourraient être ceux d'un caillot sanguin,
- douleur dans votre poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou. Cette douleur pourrait être le signe d'une crise cardiaque,
- maux de tête sévères, inexplicables, migraine (avec ou sans problème de vision). Ces signes pourraient être ceux d'un accident vasculaire cérébral.

ces médicaments. Si vous prenez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec un estrogénèse dans le cadre d'un THS, les informations suivantes sont importantes. Veuillez lire également la notice qui accompagne votre médicament oestrogénique.

**Ménopause précoce** Il existe peu de données sur les risques du THS quand il est utilisé pour traiter la ménopause précoce. Il y a un faible niveau de risque chez les plus jeunes femmes. Cela signifie que l'équilibre des avantages et des risques pour les jeunes femmes utilisant un THS pour la ménopause précoce peut être meilleure que chez les femmes âgées.

**Examens médicaux** Avant de débuter un traitement THS, votre médecin doit vous poser des questions sur vos antécédents médicaux personnels et familiaux. Il est indispensable d'effectuer un examen clinique et gynécologique complet. Pendant toute la durée du traitement, des examens réguliers seront effectués, y compris un examen des seins. Il faut en tout cas procéder au moins une fois par an à une évaluation soignante des avantages et des risques et ne poursuivre le THS que tant que les avantages prédominent par rapport aux risques. Vous devrez peut-être être surveillé régulièrement par votre médecin pendant l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

**Cancer de la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre)** Chez les femmes dont l'utérus est intact, la prise prolongée d'un THS à l'oestrogène seul a un risque plus élevé de cancer et un épaississement abnormal de la muqueuse utérine. Ce risque supplémentaire peut être évité en combinant des comprimés de progestatif ainsi que des oestrogènes pendant au moins 12 jours. **THS et cancer du sein** Des données suggèrent que la prise de THS combine estro-progestatif et probablement aussi la prise d'estrogènes seuls peut augmenter le risque de cancer du sein. Ce sur-risque dépend de la durée d'utilisation du THS et apparaît après quelques années. Cependant, il retourne au niveau normal après quelque années (au plus 5 ans) après l'arrêt du traitement (THS).

Votre médecin vous demandera de contrôler régulièrement, seins et de l'informer en cas de certains changements.

**THS et cancer ovarien** Le cancer de l'ovaire est rare - beaucoup plus rare que le cancer du sein. L'utilisation d'un THS par estrogène seuls ou par une combinaison d'estrogènes et de progestatifs a été associée à une légère augmentation du risque de cancer ovarien. Le risque de cancer ovarien varie en fonction de l'âge. Par exemple, chez les femmes âgées entre 50 et 54 ans qui ne prennent pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez 2 femmes sur 2000 en moyenne sur une période de 5 ans. Chez les femmes ayant pris un THS pendant 5 ans, il y aura environ 3 cas sur 2000 utilisatrices (soit environ un cas supplémentaire).

**THS et thrombose** La recherche a montré que les femmes sous THS ont environ 1,3 à trois fois plus de risque de thrombose veineuse profonde (un caillot de sang se formant dans une veine dans les jambes, les poumons ou ailleurs dans le corps) que chez les femmes non utilisatrices de THS. Ce risque supplémentaire est plus important pendant la première année d'utilisation de THS.

L'apparition de caillots sanguins peut être graves. Si un caillot sanguin arrive aux poumons, il peut causer une douleur dans la poitrine, un essoufflement, un évanoissement ou même la mort. Le risque d'apparition de caillots sanguins dans les veines augmente si :

- vous êtes âgés,
- vous avez un cancer,
- vous êtes en surpoids,
- vous prenez des estrogènes,
- vous êtes enceinte ou vous venez d'avoir un enfant,
- Si vous avez déjà eu une thrombose veineuse profonde ou avez un autre trouble de la coagulation sanguine ou qu'un proche parent a eu une thrombose veineuse profonde
- vous ne pouvez pas marcher pendant une longue période suite à une intervention chirurgicale importante, une blessure ou une maladie (voir aussi « Intervention chirurgicale »),
- vous avez un lupus érythémateux disséminé. (Maladie affectant le système immunitaire).

Si l'une de ces conditions s'applique à vous, consultez votre médecin pour savoir si vous devez prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé ou si vous avez une thrombose veineuse profonde. Si lors de l'utilisation de THS, vous avez une thrombose veineuse, arrêtez le THS. Consultez votre médecin pour savoir si vous devez prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### **Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé seul :**

**Arrêtez de prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et consultez un médecin immédiatement si vous notez un des effets indésirables suivants :**

- troubles du foie : les signes peuvent inclure un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse), une sensation de faiblesse, un malaise ou une douleur abdominale (touche moins de 1 patiente sur 100), réactions allergiques : les signes peuvent inclure une difficulté à respirer ou des réactions telles qu'une sensation d'être malade, des vomissements, une diarrhée ou une pression artérielle faible (touche moins de 1 patiente sur 1000), gonflement de la peau autour du visage et de la gorge qui peut entraîner des difficultés à respirer (touche moins de 1 patiente sur 1000).

Arrêtez immédiatement de prendre Duphaston 10 et si vous remarquez un des effets indésirables mentionnés ci-dessus.

#### **Autres effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé seul :**

**Très fréquent (touchant plus de 1 personne sur 10)**

- Saignement vaginal

**Fréquent (touchant moins de 1 patiente sur 10) :**

- migraines, états

- nausées, états, douleurs abdominales

- vertiges, états, étourdissements ou douloureuses, les moins fréquentes que la normale.



6  
18000 010517  
Zeta 10, route côtière 111, Quartier industriel de Casablanca - Maroc - B20 PPV : sauf celles sensibles

jins de 1 patiente sur 100) :

lentes, sensibles

à la peau (jaunissement de la peau ou des yeux, sensation de sensation générale de malaise ou mal de ventre)

réactions allergiques cutanées : éruption, démangeaisons importantes et/ou urticaire.

- augmentation du poids

**Rares (touchant moins de 1 patiente sur 1000) :**

- augmentation de la taille des tumeurs sensibles aux progestatifs (telles qu'un méningiome)

- anémie due à une destruction des cellules rouges du sang (anémie hémolytique)

- hypersensibilité

- somnolence

- accumulation soudaine de liquide dans la peau ou les muqueuses (par exemple gorge ou langue), difficultés respiratoires et / ou démangeaisons et éruption cutanée, souvent comme réaction allergique (œdème angioneurotique)

- gonflement des seins

- gonflement dû à une rétention de liquide, souvent au niveau des jambes ou des chevilles.

#### **Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé en association avec un oestrogène (THS oestro-progestatif) :**

Si vous prenez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec un estrogène, veuillez lire également la notice qui accompagne votre médicament estrogénique. Voir la rubrique 2 "Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament" pour plus d'informations concernant les effets indésirables mentionnés ci-après.

**Arrêtez de prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et consultez un médecin immédiatement si vous notez un des effets indésirables suivants :**

- gonflement douloureux dans une jambe, douleur soudaine dans la poitrine ou difficulté à respirer. Ces signes pourraient être ceux d'un caillot sanguin,
- douleur dans votre poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou. Cette douleur pourrait être le signe d'une crise cardiaque,
- maux de tête sévères, inexplicables, migraines (avec ou sans problème de vision). Ces signes pourraient être ceux d'un accident vasculaire cérébral.

Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

Grâziers, cette notice contient des informations importantes pour vous.

1. Est-ce que Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé est dans quelles conditions utilisée ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre ce médicament ?

4. Quels sont les effets secondaires du médicament ?

5. Comment prendre ce médicament ?

6. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

7. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

8. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

Veuillez lire l'information ci-dessous pour prendre cette notice de manière correcte.

1. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

2. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

3. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

4. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

5. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

6. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

7. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

8. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

Grâziers, cette notice contient des informations importantes pour vous.

1. Est-ce que Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé est dans quelles conditions utilisée ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre ce médicament ?

4. Quels sont les effets secondaires du médicament ?

5. Comment prendre ce médicament ?

6. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

7. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

8. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

Veuillez lire l'information ci-dessous pour prendre cette notice de manière correcte.

1. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

2. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

3. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

4. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

5. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

6. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

7. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

8. Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé avec des alliments et de la nourriture.

Grâziers, cette notice contient des informations importantes pour vous.

1. Est-ce que Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé est dans quelles conditions utilisée ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Duphasation 10 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre ce médicament ?

4. Quels sont les effets secondaires du médicament ?

5. Comment prendre ce médicament ?

6. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

7. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

8. Pourquoi ces comprimés doivent-ils être pris avec de la nourriture ?

# Dr. OUMEYMA BAROUD

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique

Diplômée des Facultés de Médecine de Casablanca,

Paris- Descartes et Clermont Ferrand

Ancien Médecin Interne au CHU Ibn Rochd

Ancien Médecin des Hôpitaux de France

• Suivi de grossesse et accouchement

• Échographie 3D/4D

• Infertilité/ Assistance Médicale à la Procréation

• Chirurgie Gynécologique et Maladies du Sein

• Cœlioscopie - Hystéroscopie - Colposcopie



الدكتورة أميمة بروود

اختصاصية في أمراض النساء و التوليد

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

باريس و كليرمون فيران

طبيبة داخلية سابقة في مستشفى ابن رشد

طبيبة سابقة في مستشفيات فرنسا

• تبع الحمل و التوليد

• الفحص بالصدى

• تبع العقم و المساعدة على الإنجاب

• جراحة أمراض النساء و الثدي

• التشخيص و الجراحة بالمنظار

07/06/23.

Mme Mountasser Wafaoui

Résumé : échographie 100 Ihs.

Dr. BAROUD Oumeyma  
Gynécologue-Obstétricienne  
30, Bd Al Qods, Elite Center, Etg. 3  
N° 25, Ain Chock - Casablanca  
Tél: 05 20 53 05 85 / 06 65 21 15 51

# Dr. OUMEYMA BAROUD

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique

Diplômée des Facultés de Médecine de Casablanca,

Paris- Descartes et Clermont Ferrand

Ancien Médecin Interne au CHU Ibn Rochd

Ancien Médecin des Hôpitaux de France

- Suivi de grossesse et accouchement

- Échographie 3D/4D

- Infertilité/ Assistance Médicale à la Procréation

- Chirurgie Gynécologique et Maladies du Sein

- Cœlioscopie - Hystéroskopie - Colposcopie



# الدكتورة أميمة بروド

اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

خريجة كليات الطب بالدار البيضاء

باريس و كليرمون فيران

طبيبة داخلية سابقة في مستشفى ابن رشد

طبيبة سابقة في مستشفيات فرنسا

- تتبع الحمل والتوليد

- الفحص بالصدى

- تتبع العقم والمساعدة على الإنجاب

- جراحة أمراض النساء والثدي

- التشخيص والجراحة بالمنظار

07/06/2023

MLLE MOUNTASSAR WAFAA

## Echographie pelvienne

Opérateur: Dr Baroud

machine utilisée: samsung HS40

nom et prénom : Mlle MOUNTASSAR WAFAA

DDN : 18/09/2001

Examen réalisé par voie sus pubienne

Date : 07/06/2023

Utérus de taille normale de contours réguliers d'échostructure homogène.

Biométrie utérine :

Longueur : 58mm

Largeur : 31mm

Endomètre épaisseur : 10mm

Ligne de vacuité fine médiane.

Ovaires

Droit : 12,3ml

Gauche : 9,8ml

Cul de sac de Douglas libre .

Conclusion :

OVAIRES AUGMENTÉS DE VOLUME: SOPK ?.

PAS D'AUTRE ANOMALIE DÉCELABLE DANS LES LIMITES DE CET EXAMEN.

Dr. BAROUD Oumeyma  
Gynécologue-Obstétricienne  
30, Boulevard Al Qods, Elite Center, Etg. 3  
N° 25, Ain Chock - Casablanca  
Tél: 05 20 53 05 85-06 65 21 15 51

30 شارع القدس، إيليت سنتر الطابق 3 رقم 25 - الدار البيضاء

30, Boulevard Al Qods, Elite Center, 3ème étage, N° 25

05 20 53 05 85 06 65 21 15 51 @dr.o.baroud.gyneco@gmail.com

