

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

M22- 0041877

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

1736

Société :

Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

KOTNI

APimed

Date de naissance :

01-01-1952

Adresse :

LOT DAHA Rue 1 N°36

Q.I sidi BERHNASSI

Casablanca Maroc

Tél. :

06421150702

Total des frais engagés :

1700,50

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

الدكتور رشيد ابن الخطاب الصقراوي
Dr. SEFRIoui BENKHATTAB Rachid
CARDIOLOGUE
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Cessa
Tél: 05 22 73 15 00 / 05 22 76 77 76

Date de consultation : 4.07.23

Nom et prénom du malade : OUNALEK Khasiya Age: 65

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Doul thoracique - Di coronar

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie : Osteoarach

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca - Maroc Le : 04/07/23

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/6/03	Cr	A	300 DH	Dr. SERIOUI BENKHATTAB Rachid
4/7/03	Cr. N	-	Cr. D.	Dr. SERIOUI BENKHATTAB Rachid Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Benhadj - Casablanca (02) 22 73 15 60 / 05 22 76 77 76 Dr. SERIOUI BENKHATTAB Rachid

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Dr. KENZO Chafchouni, Route de Sétif 110 km 9,5 Setif 03 22 67 41 03	04/07/2023	1064,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
EL KHARAB Dr Ben Boudjedra Hammam Dr Sidi Bernoussi Casablanca +212 524 803 059 +212 524 803 059 +212 524 803 059 +212 524 803 059	2023/07/23	B 350	412.50

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'QDF

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth (1-8) on both the upper and lower arches. A coordinate system is overlaid, with the vertical axis labeled 'H' at the top, the horizontal axis labeled 'D' on the left, and the diagonal axis labeled 'P' at the bottom right.

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Rachid Ben Khattab Sefrioui

CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine de Lille (FRANCE)

Ancien Médecin Attaché des Hôpitaux Français

Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

Echographie Doppler Couleur Cardiaque et Vasculaire

Holter Rythmique et Tensionnel

Epreuve d'effort



الدكتور رشيد بن الخطاب الصرفوي

طبيب اخصائي في امراض القلب و الشريان

نخص القلب و الشريان بالصدر و الدربان باللوران

تخطيط القلب لثاء، الجهد

خريج كلية الطب بليل (فرنسا)

طبيب اخصائي بمستشفيات فرنسا سابقا

Casablanca le : 04 Juillet 2023

الدار البيضاء في:

130 / 80

Mme OUMALEK KHADIJA

316,00 x 2
PLAVIX 75

2 cp par jour * 1 mois , puis 1 cp par jour * 2 mois

CARDIO ASPIRINE

1 comprimé par jour * 1 mois

COSTAL 10 MG

84,80 1 comprimé par jour * 1 mois

BREXIN COMPRIMÉS

1 comprimé par jour * 10 jours

DULASTAN

2 comprimés 2 fois par jour * 5 jours

RELAXIUM B 6 300 MG

1 comprimé le matin * 30 jours

ALPRAZ 0,5

1/2 comprimé matin et soir pendant 1 mois

TAHOR 40

1 comprimé par jour * 1 mois

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Plavix 75 mg , cp pel b 28
P.P.V : 316,00 DH
6 118001 081257



Dr. SEFRIoui BENKHATTAB Rachid
CARDIOLOGUE
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél: 05 273 15 00 / 05 22 73 15 00



شارع أبي ذر الغفارى - أمل 3 زنقة 3 رقم 6 سيدى البرنوصى - البيضاء - الهاتف : 05 22 73 15 00 - الهاتف / الفاكس : 05 22 76 77 76

Bd. Abidar Alghifari Amal 3 Rue 3 N° 6 - Sidi Bernoussi - Casablanca - Tél : 05 22 73 15 00 - Tél/Fax : 05 22 76 77 76

COSTAL®10, 20
et 40 mgBoîtes de 10 et 30
comprimés pelliculés
(DCl : Atorvastatine)

Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment.
Si vous avez toute autre question, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été prescrit dans le cas de symptômes identiques, cela signifie que si l'un des effets indésirables décrits dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

LOT : 230055

EXP : 01/2026

F.M.C.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

	COSTAL® 10 mg	COSTAL® 20 mg	COSTAL® 40 mg
Atorvastatine calcium	10,34 mg	20,68 mg	41,36 mg
Équivalent à atorvastatine	10 mg	20 mg	40 mg

Exipient : Pharmascorb regular, microcélac 100, cellulose microcristalline, amidon prégalatinisé, hydroxypropyl cellulose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, opadry (blanc II), éthanol 96% et eau purifiée qsp un comprimé pelliculé.

Excipient à effet notable : lactose monohydrate.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

COSTAL® comprimés pelliculés appartiennent à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

COSTAL® comprimés pelliculés est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, COSTAL®, comprimés pelliculés peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais COSTAL®, comprimés pelliculés :

- Si vous êtes hypersensible (allergique) à COSTAL®, comprimés pelliculés ou à un autre médicament similaire utilisé pour diminuer les lipides dans le sang, ou à l'un des composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez ou avez eu une maladie du foie
- Si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexpliqués
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable
- Si vous êtes enceinte ou essayez de l'être
- Si vous allaitez.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Faites attention avec COSTAL®, comprimés pelliculés:

Si vous présentez l'une des situations suivantes, COSTAL®, comprimés pelliculés peut ne pas être adapté pour vous :

- vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral.
- vous avez des problèmes aux reins.
- l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie).
- vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexpliquées, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires.
- vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate).
- vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool.
- vous avez des antécédents de maladie du foie.
- vous êtes âgés de plus de 70 ans.

Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COSTAL®, comprimés pelliculés

- Si vous avez une insuffisance respiratoire sévère.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang pour déterminer si votre taux de cholestérol avec COSTAL®, comprimés pelliculés, est dans le cadre de votre

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Ce médicament n'affecte normalement pas votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Cependant, ne conduisez pas si ce médicament affecte votre aptitude à conduire. Utilisez pas d'appareils ou de machines si votre capacité à les utiliser est affectée par ce médicament.

POSÉDATION, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par COSTAL® comprimés pelliculés.

La posologie initiale habituelle de COSTAL® est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalle d'au moins 4 semaines. La dose maximale de COSTAL® est de 80 mg une fois par jour chez les adultes et est de 20 mg une fois par jour chez les enfants.

Les comprimés de COSTAL®, comprimés pelliculés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La durée du traitement par COSTAL®, comprimés pelliculés est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de COSTAL®, comprimés pelliculés est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

SURDOSAGE :

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de COSTAL® que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche pour avis.

INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES :

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Si vous arrêtez de prendre COSTAL®, comprimés pelliculés :

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS SECONDAIRES :

Comme tous les médicaments, COSTAL®, comprimés pelliculés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare affecte 1 à 10 patients sur 10000 :

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.
- Pathologie sévère avec peau et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.
- Faiblesse musculaire, endolorissement ou douleurs musculaires, associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causés par une atteinte musculaire anormale qui peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : affecte moins de 1 patient sur 10000

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématoxyles peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible.

Autres effets indésirables éventuels de COSTAL®, comprimés pelliculés

Effets Indésirables fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 100) :

- Inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez.
- Réactions allergiques.
- Augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang.
- Maux de tête.
- Nausées, constipation, flatulence, indigestion, diarrhée.
- Douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos.

Effets d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie.

Effets indésirables peu fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 1000) :

- Anorexie (perte d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique), vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie.



Genéte
Voie orale

Relaxium B6

Deva
Pharmaceutique

NT

COMPOSITION QUALITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....
équivalent en Magnésium

Vitamine B6.....

Excipients : stéarate de magnésium, atoires Deva Pharmaceutique

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin..... 520 mg
équivalent en Magnésium..... 300 mg

Vitamine B6 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin..... 650 mg
équivalent en Magnésium..... 375 mg

Vitamine B6 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

Deva
Pharmaceutique

148-147, Zone Industrielle 75 5440 - Coudehard

Code : AC2 - 00068



ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement cette notice.

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Le comprimé sécable : (e) d'une part le avant

LOT 2301311
T2 3025
PPV 35-70

ou à l'un des composants du médicament,

- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- insuffisance hépatique grave,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer agitation, une irritabilité, un engourdissement des extrémités, une somnolence, au bruit, à la lumière, etc...

Les modalités de prise

La diminution très progressive des doses et l'espacement des doses représentent la meilleure manière de se débarrasser de ce phénomène de sevrage. Le sevrage sera d'autant plus difficile que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de sevrage de gravité peut se produire.

TRANSITOIRE des symptômes qui avaient justifié la prescription.

Des troubles de mémoire et d'altérations des fonctions psychiques sont susceptibles d'apparaître quelques heures qui suivent la prise.

Chez certains sujets, la prise de ce médicament peut provoquer des réactions secondaires peu courantes mais recherchées : insomnie, agitation, nervosité, euves, tension, modifications de l'humeur, voire des comportements délétérios ou dangereux (agressivité, violence, ou son entourage, ainsi que du comportement automatiques).

Si une ou plusieurs réactions secondaires surviennent, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Les benzodiazépines et les psychotropes doivent être utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison de leur effet sur la somnolence et/ou de réactions secondaires qui peuvent favoriser des accidents et conséquences souvent graves chez la population.

En raison de la présence d'enzymes hépatiques de la classe des galactosémiés, les benzodiazépines doivent être utilisées avec prudence chez le sujet âgé, en raison de leur effet sur la somnolence et/ou de réactions secondaires qui peuvent favoriser des accidents et conséquences souvent graves chez la population.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament doit être suivie d'un suivi médical renforcé. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque, de maladie du foie, d'alcoolisme, de maladie respiratoire.

DULASTAN® 500mg/2mg

Comprimé

Boîte de 20

Paracétamol - Thiocolchicoside

- Si vous avez toute autre question
 - Ce médicament vous a été perso identiques, cela pourrait lui être no
 - Si l'un des effets indésirables dev
- parlez-en à votre médecin ou à vot

COMPOSITION :

Paracétamol.....

Thiocolchicoside.....

Excipients :

Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.

DULASTAN® 500mg/2mg دولاستان

Boîte de 20 comprimés

علبة من 20 قرصاً

37,00

2 mg

q.s.p..... 1 comprimé

à votre médecin ou à votre pharmacien.
même en cas de symptômes
mentionnés dans cette notice,

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgies.
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

Composition :

Piroxicam
(équivalent à 191,20 mg de pirox
β-cyclodextrine)
Excipients q.s.p.
Excipients à effet notoire

Sachets
20 mg

84,80
1 sachet
Aspartam et sorbitol

Propriétés :
Anti-inflammatoire non stéroïdien du groupe des oxicams.

Indications :

- Traitement des états douloureux aigus.
- Traitement des rhumatismes inflammatoires aigus et chroniques.

Contre-indications :

- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de piroxicam, de substances d'activité proche telles que autres AINS ou l'Aspirine.
- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Ulcère gastroduodenal en évolution, insuffisance hépatocellulaire sévère ou insuffisance rénale sévère.
- Enfants de moins de 15 ans.
- Phénylcétoneurie du fait de la présence de l'Aspartam dans les sachets.
- Association avec les anticoagulants oraux, autres AINS, héparine, lithium, méthotrexate et ticlopidine.
- En cas de grossesse et d'allaitement.

Effets indésirables :

Effets gastro-intestinaux : anorexie, pesanteurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, flatulences, diarrhées, ulcères.

Réactions d'hypersensibilité : dermatologiques, respiratoires et générales.

Effets sur le système nerveux central : céphalées, somnolences et vertiges.

Précautions d'emploi :

En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'une manifestation cutanée ou muqueuse, interrompre immédiatement le traitement et consulter votre médecin.

Ce médicament sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des antécédents digestifs.

L'attention doit être attirée chez les conducteurs et utilisateurs de machines sur la possibilité de vertiges et de somnolence.

Mode d'emploi et posologie :

Se conformer à la prescription médicale.

La posologie usuelle est de 20 mg par jour en une seule prise jusqu'à disparition des symptômes.

Formes et autres présentations :

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 et 20 comprimés effervescents

BREXIN® 20 mg - Boîte de 20 comprimés sécables

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 sachets

Liste I (Tableau A)

الدكتور رشيد بن الخطاب لطفيو

CARDIOLOGUE

Diplôme de la Faculté de Médecine de Lille (FRANCE)

Ancien Médecin Attaché des Hôpitaux Français

Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

Echographie Doppler Couleur Cardiaque et Vasculaire

Holter Rythmique et Tensionnel

Epreuve d'effort



طبيب اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

محض القلب والشرايين بالصري و الدربيل باللؤلؤ

تخطيط القلب (ثناء المجهود

خريج كلية الطب بليل (فرنسا)

طبيب اختصاصي بمستشفيات فرنسا سابقا

الدار البيضاء في : ٢٤ - ٥٦ - ٢٣
Casablanca le :

٩ - DUNALEK KHN, J.

- LDZ - HZL eLH

- Trigly ✓

- TGO - TGP

- Aev. UTL

- VS

- Crea

Laboratoire d'Analyses Médicales KHA
Dr EL KHAFIF Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 325
Hay Al Oods Sidi Bernoussi Casablanca
Tél: 05 22 76 77 76 / 05 22 73 15 00

الدكتور رشيد بن الخطاب لطفيو
Dr. SEFRIOUT BENKHATTAB Rachid
CARDIOLOGUE
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél: 05 22 73 15 00 / 05 22 76 77 76

شارع أبي ذر الغفارى - أمل 3 زنقة 3 رقم 6 سيدى البرنوصى - البيضاء - الهاتف : 05 22 76 77 76 / 05 22 73 15 00

Bd. Abidar Alghifari Amal 3 Rue 3 N° 6 - Sidi Bernoussi - Casablanca - Tél : 05 22 73 15 00 / 05 22 76 77 76



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يafa للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Yafa

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

د. أمال الخفيف

Patente : 31606078 - IF : 53000550 - CNSS . 2064872 - ICE : 001540529000093

FACTURE N° : 230700030

Casablanca le 03-07-2023

Mme OUMALEK Khadija Ep Kotni

Demande N°: 2307030035

Date de l'examen : 03-07-2023

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement	E10	E
B100	Acide urique sanguin	B30	B
B106	Cholestérol total	B30	B
B110	Cholestérol HDL+LDL	B80	B
B111	Créatinine	B30	B
B134	Triglycérides	B50	B
B146	Transaminases 0 (TGO)	B50	B
B147	Transaminases P (TGP)	B50	B
B223	Vitesse de sédimentation	B30	B

Total des B : 350

Total dossier: 412.50 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :
quatre cent douze dirhams cinquante centimes

INPE
093003440

Laboratoire d'Analyses Médicales Yafa
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
tel : 05 22 75 86 77 - Fax : 05 22 76 84 39

تاریخ اجراء التحاليل
غير قابل للتغيير

أوقات العمل : من الإثنين إلى الجمعة : 14h - 7h30 - 18h30 - 7h30 / السبت 14h - 7h30 أخذ العينات في المنزل بالميعاد

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 18h30 / Samedi : 7h30 - 14h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyaifa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

Pharmacienne Biologiste
Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

د.أمال الخفيف رمضانى

Prélèvement du : 03-07-2023

Edition : 03-07-2023

Mme OUMALEK Khadija Ep Kotni

Code Patient 1701130065 Référence : 2307030035

Prescripteur : Dr SEFRIoui BEN KHATTAB RACHID

Page : 1/3

HEMATOCYTOLOGIE

Vitesse de sédimentation

VS 1ère heure

25 mm (<>10)

VS 2ième heure

55 mm (<20)

1701130065
Dr. Amal El Khafif Ramdani
Signature

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement Validé par Dr Amal El Khafif Ramdani

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د.أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 03-07-2023

Edition : 03-07-2023

Mme OUMALEK Khadija Ep Kotni

Code Patient 1701130065 Référence : 2307030035

Prescripteur : Dr SEFRIoui BEN KHATTAB RACHID

Page : 3/3

HDL-Cholestérol
(Enzymatique Cobas C311)

0.51 g/L
1.32 mmol/L

(0.46-0.65)
(1.19-1.68)

0.59

LDL-Cholestérol (direct)

(Enzymatique Cobas C311)

0.60 g/L
1.55 mmol/L

(<1.00)
(<2.59)

1.51

Indications du traitement médical selon les recommandations de l'AFFSAPS:

- En l'absence de facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 2,20 g/l (5,7 mmol/l) ;
- En présence d'un facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,90 g/l (4,9 mmol/l) ;
- En présence de deux facteurs de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,60 g/l (4,1 mmol/l) ;
- En présence de plus de deux facteurs de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,30 g/l (3,4 mmol/l) ;
- En présence d'antécédents de maladie cardiovasculaire avérée ou de risques équivalents, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1 g/l (2,6 mmol/l).


Triglycérides
(Enzymatique Cobas C311)

1.03 g/l
1.17 mmol/l

(<1.50)
(<1.71)

21-06-2023

1.49



Transaminases GPT (ALAT)
(Cinétique Cobas C311)

15.0 UI/L

(7.0-35.0)

12.6

28-06-2022

Transaminases GOT (ASAT)
(Cinétique Cobas C311)

11.6 UI/L

(10.0-35.0)

13.4

28-06-2022

Horaires continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à faire par l'intermédiaire de M. Amal El Khafif Ramdani

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54
Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39
E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 03-07-2023

Edition : 03-07-2023

Mme OUMALEK Khadija Ep Kotni

Code Patient 1701130065 Référence : 2307030035

Prescripteur : Dr SEFRIoui BEN KHATTAB RACHID

Page : 2/3

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE


14-02-2023

Créatinine
(Cinétique Cobas C311)

9.2 mg/L
81.4 μ mol/L

(5.0-11.0)
(44.3-97.4)

8.1



Acide Urique
(Cinétique Cobas C311)

45.40 mg/l
270.13 μ mol/L

(24.00-57.00)
(142.80-339.15)

56.00

21-06-2023


Cholestérol total
(colorimétrique Cobas C311)

1.25 g/L
3.23 mmol/L

(1.54-2.01)
(3.98-5.20)

2.23

21-06-2023



21-06-2023

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile au numéro 52-54 Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Mousbara Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Dr. Amal El Khafif Ramdani
Signature