

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



**MUPRAS**

Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Optique


Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2847 Société : R. A. N.  
 Actif  Pensionné(e)  Autre : CHANSAD HA  
 Nom & Prénom : DOUNIA  
 Date de naissance : 06/01/1953  
 Adresse : 59 B<sup>3</sup> ZERIKTOUNI RESIDENCE  
LES FLEURS 9<sup>th</sup> ETG APP 28 CASA  
 Tél. 0651989687 Total des frais engagés : 940 Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 12/07/2023

Nom et prénom du malade : DOUNIA CHANSADE Age : .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : infection urinaire

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 12/07/2023

Signature de l'adhérent(e) : F

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/07/23	cs + Echo		600 Dh	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p><b>HARMACIE DE L'ITALIE</b>  <b>IBNOU ROUDI srl</b>  <b>1, RUE GRASSET, QUARTIER</b>  <b>DES HÔPITAUX - CASABLANCA</b>  <b>DE 72 49 20 20</b></p> <p><b>INPE :</b></p>	12/07/23	340,00

20060912

2020/06

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIBLES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

## [Création, remont, adjonction]

## Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION


Dr. Badredine DASSOULI

Chirurgien-Urologue

Reins, Vesse, Prostate

Endoscopie, Lithotripsie, Incontinence urinaire

Impuissance, Infertilité, Organes génitaux



الدكتور بدر الدين داسولي

اختصاصي في أمراض و جراحة

المسالك البولية و التناسلية

الكلوي، المثانة، البروستات

الجراحة بالمنظار، تكسير الحصى بالأشعة

السلس البولي، العجز الجنسي، العقم، الجهاز التناسلي

الدار البيضاء، فـ Le : mer. 12/07/2023

DOUNIA Chamsadha

170,00 X 2

1) CEFICO 200

1Cp matin et soir pd 16j

(NS)

PHARMACIE DE L'HOPITAL  
IBNOU ROCHD SARL  
11, RUE GRASSET, QUARTIER  
DES HOPITAUX - CASABLANCA  
05 22 49 20 20

Dr. B. DASSOULI  
Chirurgien Urologue  
دكتور بدر الدين داسولي  
اختصاصي في المسالك البولية و التناسلية

PHARMACIE DE L'HOPITAL  
IBNOU ROCHD SARL  
11, RUE GRASSET, QUARTIER  
DES HOPITAUX - CASABLANCA  
05 22 49 20 20

## CEFICO® 200 mg,

comprimé pelliculé boîtes de 8 et de 16  
(Céfixime trihydraté)

## CEFICO® 100 mg/5 ml,

poudre pour suspension buvable en flacon avec  
une seringue mesure en poids de l'enfant

Boîte d'un flacon de 30 ml et Boîte d'un flacon de 60 ml.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 1. Composition du médicament

#### CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :

Céfixime (DCI) trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....200,00 mg  
Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Stéarate de magnésium, OPADRAY Y-1-7000 (Hydroxypropylméthylcellulose, dioxyde de titane et polyéthylène glycol 400).....q.s.p.1 comprimé pelliculé.

#### CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :

Céfixime (DCI) trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....100,00 mg  
Excipients : Saccharose, Gomme arabique, Arôme strawberry, Benzoate de sodium.....q.s.p.5 ml de suspension reconstituée.

Excipients à effet notoire : Saccharose

### 2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Ce médicament est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines, du groupe des céphalosporines de 3ème génération, groupe proche de celui des pénicillines.

### 3. Indications thérapeutiques :

#### CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :

Ce médicament est indiqué dans le traitement de :

- Certaines infections urogénitales,
- Otites et sinusites aigües,
- Infections bronchiques et pulmonaires.

#### CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois dans le traitement des :

- Certaines infections urinaires,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aigües.

### 4. Posologie :

Mode d'administration : Voie orale.

#### CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :

La présentation CEFICO, comprimé à 200 mg est préconisée chez l'enfant de plus de 12 ans et chez l'adulte.

#### Chez l'adulte :

À titre indicatif, la posologie usuelle est de deux comprimés de 200 mg par jour.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

#### CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :

La présentation CEFICO 100 mg/5 ml, est préconisée chez l'enfant de plus de 6 mois à 12 ans.

À titre indicatif, la posologie de CEFICO chez l'enfant de plus de 6 mois est de 8 mg

en 5 ml et par jour, en deux prises, 8 heures d'intervalle.

import  
médic  
7. Mis  
Adres  
○ Si  
antibiot  
○ Si vo  
dose qu  
○ Si vo  
antibioti  
globules  
Pendant  
médecin  
○ Si vous  
diarrhée s  
○ Si vous  
○ Si vous  
avec décol  
mettre en  
syndrome d'  
○ Votre mé  
prescrire un t  
○ Comme pou  
(les bêta-lactamines), l'administrati  
d'encéphalopathie pouva  
de la conscience, ou en  
surdosage ou en cas i  
apparaissent, consultez  
rubriques 4 et 6).

En cas d'examen de l  
CEFICO peut fausser :  
○ La recherche de céton  
○ La recherche de gluco  
○ Les tests de diagnostic  
- Mention relative aux ex  
L'utilisation de ce méd  
intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou  
un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

### 8. Interactions :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous ou votre enfant prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### 9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement :

#### Grossesse :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

#### Allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Toutefois, si des troubles digestifs (diarrhée, infection par un champignon) ou des boutons apparaissent chez votre enfant, stoppez l'allaitement maternel ou la prise de médicament et consultez rapidement votre médecin.

### 10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines :

Ce médicament peut avoir une influence importante sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines notamment du fait de la survenue possible de vertiges ou d'une encéphalopathie (pouvant se traduire par des convulsions, une confusion, des troubles de conscience, ou des mouvements anormaux) (voir rubriques 4 et 6).

### 11. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Comme pour l'ensemble des médicaments appartenant à cette classe d'antibiotiques



## CEFICO® 200 mg,

comprimé pelliculé boîtes de 8 et de 16  
(Céfixime trihydraté)

## CEFICO® 100 mg/5 ml,

poudre pour suspension buvable en flacon avec  
une seringue mesure en poids de l'enfant

Boîte d'un flacon de 30 ml et Boîte d'un flacon de 60 ml.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 1. Composition du médicament

#### CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :

Céfixime (DCI) trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....200,00 mg  
Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Stéarate de magnésium, OPADRAY Y-1-7000 (Hydroxypropylméthylcellulose, dioxyde de titane et polyéthylène glycol 400).....q.s.p.1 comprimé pelliculé.

#### CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :

Céfixime (DCI) trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....100,00 mg  
Excipients : Saccharose, Gomme arabique, Arôme strawberry, Benzoate de sodium.....q.s.p.5 ml de suspension reconstituée.

Excipients à effet notoire : Saccharose

### 2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Ce médicament est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines, du groupe des céphalosporines de 3ème génération, groupe proche de celui des pénicillines.

### 3. Indications thérapeutiques :

#### CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :

Ce médicament est indiqué dans le traitement de :

- Certaines infections urogénitales,
- Otites et sinusites aigües,
- Infections bronchiques et pulmonaires.

#### CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois dans le traitement des :

- Certaines infections urinaires,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aigües.

### 4. Posologie :

Mode d'administration : Voie orale.

#### CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :

La présentation CEFICO, comprimé à 200 mg est préconisée chez l'enfant de plus de 12 ans et chez l'adulte.

#### Chez l'adulte :

À titre indicatif, la posologie usuelle est de deux comprimés de 200 mg par jour.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

#### CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :

La présentation CEFICO 100 mg/5 ml, est préconisée chez l'enfant de plus de 6 mois à 12 ans.

À titre indicatif, la posologie de CEFICO chez l'enfant de plus de 6 mois est de 8 mg

en 5 ml et par jour, en deux prises, 8 heures d'intervalle.

import  
médic  
7. Mis  
Adres  
○ Si  
antibiot  
○ Si vo  
dose qu  
○ Si vo  
antibioti  
globules  
Pendant  
médecin  
○ Si vous  
diarrhée s  
○ Si vous o  
○ Si vous o  
avec décoll  
mettre en c  
syndrome d'  
○ Votre mé  
prescrire un t  
○ Comme pou  
(les bêta-lactamines), l'administrati  
d'encéphalopathie pouva  
de la conscience, ou en  
surdosage ou en cas i  
apparaissent, consultez  
rubriques 4 et 6).

En cas d'examen de l  
CEFICO peut fausser :  
○ La recherche de céton  
○ La recherche de gluco  
○ Les tests de diagnostic  
- Mention relative aux ex  
L'utilisation de ce méd  
intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou  
un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

### 8. Interactions :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous ou votre enfant prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### 9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement :

#### Grossesse :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

#### Allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Toutefois, si des troubles digestifs (diarrhée, infection par un champignon) ou des boutons apparaissent chez votre enfant, stoppez l'allaitement maternel ou la prise de médicament et consultez rapidement votre médecin.

### 10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines :

Ce médicament peut avoir une influence importante sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines notamment du fait de la survenue possible de vertiges ou d'une encéphalopathie (pouvant se traduire par des convulsions, une confusion, des troubles de conscience, ou des mouvements anormaux) (voir rubriques 4 et 6).

### 11. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Comme pour l'ensemble des médicaments appartenant à cette classe d'antibiotiques



6 118000 083177


**Dr. Badredine DASSOULI**

**Chirurgien-Urologue**

**Reins, Vessie, Prostate**

**Endoscopie, Lithotripsie, Incontinence urinaire**

**Impuissance, Infertilité, Organes génitaux**



**الدكتور بدر الدين داسولي**

**اختصاصي في أمراض و جراحة**

**المسالك البولية و التناسلية**

**الكلي، المثانة، البروستات**

**الجراحة بالمنظار، تكسير الحصى بالأشعة**

**الصلس البولي، العجز الجنسي، العقم، الجهاز التناسلي**

**الدار البيضا، في: Casablanca, Le : mer. 12/07/2023**


## **DOUNIA Chams Dha**

### **NOTE D'HONORAIRE**

Consultation spécialisée	200 Dh
Echographie urinaire	400 Dh
Total	600 Dh

La présente note d'honoraire est arrêtée à la somme de : SIX CENTS Dirhams.

*Dr. Badredine DASSOULI  
Chirurgien Urologue  
دكتور بدر الدين داسولي  
مختص في المسالك البولية و التناسلية  
Tél : 0522 20 44 54*



الدار البيضاء، في: Casablanca, Le : ..... mer. 12/07/2023 .....

## COMPTE RENDU DE L'APPAREIL URINAIRE

## **DOUNIA Chams Dha**

*Cet examen est réalisé à l'aide d'un échographe doppler couleur « MINDRAY DC6 expert ».*

## **INDICATION :impériosité mictionnelle.**

- Les deux reins de tailles normales de contours réguliers de bonne différentiation cortico-médullaire légèrement hyper échogène
  - Le rein droit mesure 10.32 cm dont le cortex est 1.73 cm.
  - Le rein gauche mesure 10.47 cm dont le cortex est de 1.58 cm.
  - Vessie de bonne capacité transsonique à paroi régulier sans image suspecte.
  - Résidu post mictionnel 0 cc.

## **CONCLUSION :**

- Aspect échographique sans particularité.

Dr. B. NASSOUR  
Chirurgien Urologue  
دكتور ب. نصوور  
أخص في المسالك البولية والتناسلية

