

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0056194

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1816

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SLAOUI FETHNAÏA

Date de naissance : 1956

Adresse : 50 lot. KHTTAFIAI oujda

Tél. : 061820500

Total des frais engagés : 654,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09/06/23

Nom et prénom du malade : SLAOUI FETHNAÏA

Age: 67

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 09/06/23

Le : 09/06/23

Signature de l'adhérent(e) :

## VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie

M22-0056194

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : .....

Nom de l'adhérent(e) : .....

Total des frais engagés : .....

Date de dépôt : .....

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/6/1983	54,50

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exi  s par la Mutuelle.

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important:**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESSES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram illustrates the H-G-B coordinate system. The vertical axis is labeled 'H' at the top, with a small arrow pointing upwards. The horizontal axis is labeled 'G' on the right, with a small arrow pointing to the right. The diagonal axis is labeled 'B' at the bottom, with a small arrow pointing downwards. The axes intersect at a central point. A series of numbered circles (1 through 8) are arranged along each axis to indicate their orientation and relative positions.

**[Création, remont, adjonction]**

Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Fe 16-06-2023

Mme Shanti Khurana

40,0°

E. Flinders 20

A.S.

1)

141 50

Le mat, ?  
6j

2)

Abbol 13

15

1 CP α'21j 5j

54, 50

Dr. A. ALAQUI EI Mostafa

~~NEUROCHIRURGIEN~~

~~12, Rue Zakreddins Attoussi  
Casablanca - Tél: 05 24 81 41 66~~



090004029

# EFFIPRED® 20 mg

(Prednisolone)

PPU 400H00  
EXP 10/2025  
LCT 20018 15

## PRESENTATIONS

Boîte de 30 comprimés effervescents à 5 mg

Boîte de 20 comprimés effervescents à 20 mg

## COMPOSITION

- Comprimés effervescents à 5 mg

Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium).....5 mg

Excipient qsp.....1 comprimé effervescent

- Comprimés effervescents à 20 mg

Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium).....20 mg

Excipient qsp.....1 comprimé effervescent

## PROPRIETES

EFFIPRED® est un glucocorticoïde à usage systémique, utilisé principalement pour ses propriétés antiinflammatoire, antiallergique et immunodépressive.

## INDICATIONS

Affections rhumatologiques, respiratoires, ORL, ophtalmologiques, neurologiques, néphrologiques, néoplasiques, infectieuses, hématologiques, endocrinien, digestives, dermatologiques, et dans les connectivites et collagénoses.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

- Se conformer strictement à la prescription du médecin.

- Prendre les comprimés dissous dans un verre d'eau au cours des repas, de préférence en une prise le matin.

## CONTRE-INDICATIONS

- Tout état infectieux non traité par antibiotiques ou antimycosiques.

- Certaines viroses en évolution (herpès, varicelle, zona, hépatite)

- États psychotiques encore non contrôlés par un traitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET MISE EN GARDE

### En cas de traitement prolongé :

- Observer un régime pauvre en sucres et enrichi en protéines et en calcium

- Réduire l'apport en sodium en tenant compte de la teneur en sodium du comprimé (43 mg de sodium par comprimé à 20 mg et 28,6 mg de sodium par comprimé à 5 mg).

- Ne jamais arrêter brutalement le traitement mais diminuer progressivement les doses en suivant la prescription de votre médecin.

# ANDOL® 1000 mg

Tablettes de 8 Comprimés effervescents Paracétamol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la retrouver.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1- COMPOSITION DU MÉDICAMENT

**Principe actif :** Paracétamol ..... 1000 mg

**Excipients :** Acide citrique anhydre, Bicarbonate de sodium, Sorbitol, Carbonate de sodium anhydre, Povidone K29-30, Macrogol 6000, Arôme orange 74016-71, Arôme abricot 75731-31, Saccharine sodique, Aspartame, Beta-carotène 1%, Stéarate de magnésium ..... q.s.p. un comprimé effervescent.

**Excipients à effet notable :** Sodium, Sorbitol, Aspartame.

## 2- CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGÉSIE ET ANTI-PYRÉTIQUES-ANILIDES - Code ATC : N02BD01

## 3- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

ANDOL est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.

Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre, par exemple en cas de maux de tête, d'effet grippal, de douleurs dentaires, de courbatures, de règles douloureuses.  
Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans). Lire attentivement la rubrique Posologie.

Pour les enfants pesant moins de 50 kg, il existe d'autres présentations d'ANDOL dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4- POSOLOGIE

Attention ! Cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par unité ; ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant pesant plus de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans).

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 50 kg, il existe d'autres présentations d'ANDOL dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Posologie chez l'adulte et l'enfant à partir de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans)**

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 1000 mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

Dose de paracétamol à ne jamais dépasser

• Chez un adulte ou un enfant pesant plus de 50 kg :

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 grammes de paracétamol par jour (soit 3 comprimés effervescents par jour). Cependant, si vous avez des douleurs plus intenses, et uniquement sur les conseils de votre médecin, la dose totale peut être augmentée jusqu'à 4 grammes de paracétamol par jour (soit 4 comprimés effervescents par jour).

**NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACÉTAMOL PAR JOUR** (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

**Situations particulières :**

La dose maximale journalière ne doit pas dépasser 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/jour) dans les situations suivantes :

• si vous pesez moins de 50 kg,

• si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

• si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment,

• si vous souffrez de déshydratation,

• si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous avez des maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d'une hépatite chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).  
EN CAS DE DOUCE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDICIN A VOTRE PHARMACIEN.

## Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Vous devez dissoudre le comprimé dans un verre d'eau. Attrapez la solution complète avant de boire immédiatement après le contenu du verre.

## Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d'éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».

Chez l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, compris la nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures.

Chez l'adulte, les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), vous devez attendre au moins 8 heures entre chaque prise.

Si vous avez l'impression que l'effet d'ANDOL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Durée du traitement

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée :

• à 5 jours en cas de douleurs,

• à 3 jours en cas de fièvre.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

## 5- CONTRE INDICATIONS

Ne prenez jamais ANDOL 1000 mg, comprimé effervescent :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique composition.

• Si vous avez une maladie grave du foie.

• En cas de phénylktonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

• Pour traiter un enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer. Utilisez une autre forme.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez, pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

## 6- EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Rarement, une réaction allergique peut survenir :

• boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

• urticaire,

• brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer (œdème de Quincke),

• malaise aigu avec baisse importante de la pression artérielle (chock anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin.

A l'avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

De très rares cas d'effets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie, neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Autres effets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du

fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant entraîner une infection grave (agranulocytose).



14,50  
EXP :  
LOT N° :

avant de prendre ce médicament.

## 7- PRÉCAUTIONS

avant de prendre ce médicament.

## Faites attention avec ANDOL

• Si la douleur persiste plus de 5 jours, ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne continuez pas le traitement sans l'avis de votre médecin.

• La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.

• Vous devez demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

• Si vous pesez moins de 50 kg,

• Si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

• Si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment,

• Si vous souffrez de déshydratation,

• Si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves) ou si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang),

• si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

• La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

• En cas de sevrage (récent d'un alcoolisme chronique), le risque d'atteinte hépatique est majoré.

• En cas d'administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « Posologie »).

• En cas d'épithèle virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

• Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

• Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

## Analyses de sang

Prévenez votre médecin si vous prenez ANDOL et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les résultats de votre taux d'acide urique et de sucre (glycémie) dans le sang.

Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

EN CAS DE DOUCE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Enfants

Sans objet.

## 8- INTERACTIONS

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment ou pourrez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risquez un surdosage.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par la warfarine ou un AVK), la prise de ANDOL 1000 mg, comprimé

d'un ou plusieurs de ces médicaments peut entraîner une certaine augmentation de certains symptômes.

Le surdosage peut entraîner des pancréatites et des taux d'amylase et d'lipase élevés.

Si l'insuffisance rénale aigüe entraîne des globules rouges, les tests réduits en nombre peuvent entraîner une fatigue, un souffle et des infections fréquentes.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d'effets indésirables peut être augmenté.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale, le risque d