

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)
Matricole : 4681

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

No. J. H. I. B. natal

Date de naissance :

en/1952

Adresse :

El/45 Hay KHOZAM DULFA 882

Tél. :

0663621569

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 02/05/2023

Nom et prénom du malade : No. J. H. I. B. natal Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

H.A + D.I + infection

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 02/05/2023

Le : 20/07/2023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
82/05/23	C		150,0000+	<i>Docteur El Aribi Rachid Médecin Agrée par Ministère N° : 1589 Aut. N° : 24-93-03-09</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
P<small>HARMACIE</small> L<small>EXTENSION</small> 24 Rue Lissasfa Extension CASABLANCA Tél: 05 22 93 48 40	02-05-83	23 19.20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 B 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

Dr. Redouane El ARABI

Médecine Générale

Médecin Agréé Par le Ministère de la Santé

Echographie

Electrocardiogramme

Petite Chirurgie - Circoncision



الدكتور رضوان العربي

الطبيب العام

طبيب خبير محلف لدى المحاكم

الفحص بالصدى

تخطيط القلب

الجراحة الصغيرة - الختان

01
Péri.: 12/2022

KARDEGIC 160MG
SACHETS 830

P.P.V : 350H70

6 118001 081189

Casablanca, le : الدار البيضاء، في :

Mouttib

Mohammed

01/01/2024
Péri.: 05/2024

KARDEGIC 160MG
SACHETS 830

P.P.V : 350H70

6 118001 081189



550,00

1- Novomix 30

PHARMACIE L'EXTENSION

24 Rue 8 Lissasfa
Extension CASABLANCA
Tél: 05 22 93 48 40

35.70x3 2- KARDIGIC 160 mg 30x3

2- KARDIGIC 160 mg 30x3

111.10x3 3- PRÉTÉRAN 30x3

PHARMACIE L'EXTENSION

24 Rue 8 Lissasfa
Extension CASABLANCA
Tél: 05 22 93 48 40

168.90x2 4- AUGMENTIN 700 mg 30x2

4- AUGMENTIN 700 mg 30x2

51.40x8 5- EGYEPREN 250 mg 30x8

5- EGYEPREN 250 mg 30x8

82.10x4 6- INEX 20 mg 30x4

6- INEX 20 mg 30x4

جزءة الحاج فاتح - الرقم 141 الطابق السفلي - الشقة رقم 2 الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 93 03 09

141, Lot Haj Fateh Bd. Oued Daoura-RDC N°2 EL Oulfa-Casablanca-Tél.: 05 22 93 03 09

57.80x3 LD - n°13 (03 min)
 0 - 0 - 1

PROFENID 100MG
 CP PEL 830
 P.P.V : 70DH90

Barcode: 3 11000 0101 01 08/2002

7090 PROFENID 23/03/2002
 0 - 0
 23/19.20

Docteur El Aribi Redouan
 Le Médecin Agréé par
 Le Ministère de La Santé
 Tél: 05 22 93 1289
 Auf N° 293/03.03 AM, 10

PHARMACIE L'EXTENSIS
 24 Rue 8 Alissasfa
 Extension CASABLANCA
 Tél: 05 22 93 48 40

PPU: 168,20 DH
 LOT: 648525
 PER: 11/23

SYNTHEMEDIC
 22 rue zoubier bneu al aquam reches
 noires casablanca
 INEXIUM

20 mg Cpr GR
 Boîte 14
 64015DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH
 6 118001 020591

SYNTHEMEDIC
 22 rue zoubier bneu al aquam reches
 noires casablanca
 INEXIUM

20 mg Cpr GR
 Boîte 14
 64015DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH
 6 118001 020591

PPU: 168,20 DH
 LOT: 649757
 PER: 03/24

SYNTHEMEDIC
 22 rue zoubier bneu al aquam reches
 noires casablanca
 INEXIUM

20 mg Cpr GR
 Boîte 14
 64015DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH
 6 118001 020591

SYNTHEMEDIC
 22 rue zoubier bneu al aquam reches
 noires casablanca
 INEXIUM

20 mg Cpr GR
 Boîte 14
 64015DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH
 6 118001 020591

51,40

LD-NOR®

10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez ou des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexpliqués,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral,
- si vous avez des problèmes aux reins,
- si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie),
- si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexpliquées, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires,
- si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate),
- si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool,
- si vous avez des antécédents de maladie du foie,
- si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par LD-NOR afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de rhabdomyolyse, peut-être majoré en cas de prise simultanée de certains médicaments avec LD-NOR.

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la dose quotidienne maximale de 40 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants de 10 ans ou plus.

Les comprimés de LD-NOR doivent être pris au moment de la journée, au moins 4 heures avant ou après un repas. Ne prenez pas LD-NOR à jeun. Veillez à toujours prendre LD-NOR au même moment de la journée.

Veillez à toujours prendre LD-NOR au même moment de la journée.

La dose quotidienne recommandée est de 10 mg par jour. Si vous prenez LD-NOR au-delà de 10 mg par jour, il faut prendre LD-NOR au moins 4 fois par jour.

Prenez LD-NOR avec de l'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée. Prenez LD-NOR au moins 4 fois par jour.

Prenez LD-NOR avec de l'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée.

Prenez LD-NOR avec de l'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée.

Prenez LD-NOR avec de l'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée.

Prenez LD-NOR avec de l'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée.

Prenez LD-NOR avec de l'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut causer des effets indésirables. Ces effets indésirables surviennent pas systématiquement chez tous les patients.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé et contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé et contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement important des tissus sous la peau (urticaire), provoquant d'importantes difficultés à respirer.

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau (psoriasis), qui peut se décliner particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds.

- Faiblesse musculaire, sensibilité douloureuse, douleur ou rupture de la peau ou de la muqueuse associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant entraîner une urgence (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des cellules musculaires entraîne une libération de myoglobine dans le sang, ce qui peut entraîner une coloration rouge-brun des urines et des urines, et peut entraîner une faiblesse importante des muscles, surtout ceux situés dans les jambes, causée par une atteinte des muscles. Ces symptômes disparaissent généralement après l'arrêt de l'atorvastatine, et peuvent engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématoques peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible.

- Syndrome lupique (incluant éruption cutanée, troubles articulaires et effets sur les cellules sanguines).

Autres effets indésirables éventuels de LD-NOR

Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez, réactions allergiques,

- augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang,

- maux de tête, nausées, constipation, flatulence, indigestion, diarrhée,

- douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos, résultats d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie,

Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- anorexie (perte d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie),

- cauchemars, insomnie, sensations vertigineuses, engourdissement ou picotements dans les doigts et les orteils, diminution de la sensibilité à la douleur ou au toucher, modification du goût, perte de mémoire,

- vision floue, bouffonneries d'oreilles et/ou de tête, vomissements, éruption, douleur abdominale haute et basse, pancréatite (inflammation du pancréas provoquant des maux d'estomac),

- hépatite (inflammation du foie),

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné
de 4.

maladie de Behcet, l'hy

une maladie des articula

* Si vous avez des probl

à l'ECG, qui est un enreg

électrolytique dans le sa

ans le sang), si vous a

affaibli (insuffisance car

itez une femme ou une

anomalies au niveau de l

Pour le traitement de ce

autre antibiotique en as

après 3 jours de traiteme

pendant la prise de SEPC

Prévenez immédiatement

prenez SEPCEN®. Votre

* Réaction allergique se

première dose, il existe

manifeste par les sy

évanouissements, ou ve

arrêtez de prendre SEPC

* Effets indésirables gr

antibactériens de type m

indésirables très rares (

années), invalidants ou p

les muscles et les art

sensations anomalies

engourdissement ou une

de la vue, du goût, de l'od

intense et de troubles sév

Si vous présentez l'un de c

votre médecin avant de po

tre traitement en envisa

* Une douleur et un gonf

tendons peuvent survenir

(ans), si vous avez eu un

traitement par des corti

premières 48 heures du

Dès les premiers signes e

du poignet, du coude, de

et mettez le membre atte

rupture d'un tendon.

* Si vous ressentez une q

qui peuvent être des i

immédiatement au service

avec des corticostéroïde

* Si vous ressentez sou

lit, ou si vous remarque

nouvelle apparition de p

vous devez en informer u

* Si vous souffrez d'épile

accident vasculaire céré

produire. Si tel était voul

* Dans de rares cas, d

sensation de brûlure, de

survenir, en particulier au

de prendre SEPCEN® et

un état potentiellement i

* Des réactions psychia

souffrez de dépression

SEPCEN®. Si cela se pro

* Les antibiotiques de la

sucré dans le sang au-de

sucré dans le sang en de

hypoglycémique) dans le

est important à prendre

sucré dans le sang doit é

* Vous pouvez souffrir de

plusieurs semaines aprè

de ces diarrhées, ou si

immédiatement de pren

médicaments visant à blo

* Si vous avez des trou

immédiatement un opht

* Votre peau devient pa

SEPCEN®. Evitez de vou

ceux utilisés dans les cab

* Si vous devez subir un

laboratoire d'analyses qu

* Si vous avez des pr

éventuellement être adap

* SEPCEN® peut provo

de l'appétit, ictere (jauni

arrez de prendre SEPC

* SEPCEN® peut entraî

4.

5. Comment conserver SEPCEN® ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

* Ne prenez jamais SEPCEN® :

* Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

* Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

* Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

* Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

* Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

* Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

* Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

* Si vous souffrez de myasténie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

* Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

* Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

* Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

* Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné

de 4.

maladie de Behcet, l'hy

une maladie des articula

* Si vous avez des probl

es né(e) avec ou avez

à l'ECG, qui est un enre

électrolytique dans le sa

ans le sang), si vous a

affaibli (insuffisance car

ites une femme ou une

anomalies au niveau de l

Pour le traitement de ce

autre antibiotique en as

après 3 jours de traiteme

pendant la prise de SEPC

Prévenez immédiatement

prenez SEPCEN®. Votre

* Réaction allergique se

première dose, il existe

manifeste par les sy

évanouissements, ou ve

arrêtez de prendre SEPC

* Effets indésirables gr

antibactériens de type m

indésirables très rares (

années), invalidants ou p

les muscles et les art

sensations anomalies

engourdissement ou une

de la vue, du goût, de l'od

intense et de troubles sév

Si vous présentez l'un de c

votre médecin avant de po

tre traitement en envisa

* Une douleur et un gonfl

tendons peuvent survenir

(ans), si vous avez eu un

traitement par des corti

premières 48 heures du

Dès les premiers signes e

du poignet, du coude, de

et mettez le membre atte

rupture d'un tendon.

* Si vous ressentez une q

qui peuvent être des i

immédiatement au service

avec des corticostéroïde

* Si vous ressentez sou

lit, ou si vous remarque

nouvelle apparition de p

vous devez en informer u

* Si vous souffrez d'épile

accident vasculaire céré

produire. Si tel était voul

* Dans de rares cas, d

sensation de brûlure, de

survenir, en particulier au

de prendre SEPCEN® et

un état potentiellement i

* Des réactions psychia

souffrez de dépression

SEPCEN®. Si cela se pro

* Les antibiotiques de la

sucré dans le sang au-de

sucré dans le sang en de

hypoglycémique) dans le

est important à prendre

sucré dans le sang doit é

* Vous pouvez souffrir de

plusieurs semaines aprè

de ces diarrhées, ou si

immédiatement de pren

médicaments visant à blo

* Si vous avez des trou

immédiatement un opht

* Votre peau devient pa

SEPCEN®. Evitez de vou

ceux utilisés dans les cab

* Si vous devez subir un

laboratoire d'analyses qu

* Si vous avez des pr

éventuellement être adap

* SEPCEN® peut provo

de l'appétit, ictere (jauni

arrez de prendre SEPC

* SEPCEN® peut entraîn

4.

5. Comment conserver SEPCEN® ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

* Ne prenez jamais SEPCEN® :

* Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

* Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

* Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

* Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

* Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

* Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

* Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

* Si vous souffrez de myasténie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

* Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

* Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

* Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

* Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné
de 4.

maladie de Behcet, l'hy
une maladie des articula
• Si vous avez des probl
à l'ECG, qui est un enreg
électrolytique dans le sa
dans le sang), si vous a
affaibli (insuffisance card
itez une femme ou une
anomalies au niveau de l
Pour le traitement de ce
autre antibiotique en as
après 3 jours de traiteme

Pendant la prise de SEPCEN®

Prévenez immédiatement
prenez SEPCEN®. Votre

• Réaction allergique se
première dose, il existe
manifeste par les syn
évanouissements, ou ve
arrêtez de prendre SEPCEN®

• Effets indésirables gr
antibactériens de type m
indésirables très rares (1
années), invalidants ou p
les muscles et les artic
sensations anomalies t
engourdissement ou une c
de la vue, du goût, de l'od
intense et de troubles sév
Si vous présentez l'un de c
votre médecin avant de po
otre traitement en envisag

• Une douleur et un gonfl
tendons peuvent survenir
ans), si vous avez eu un
traitement par des cortic
premières 48 heures du

Dès les premiers signes d
du poignet, du coude, de
et mettez le membre atte
rupture d'un tendon.

• Si vous ressentez une d
qui peuvent être des s
immédiatement au service
avec des corticostéroïdes.

• Si vous ressentez sou
lit, ou si vous remarque
nouvelle apparition de p
vous devez en informer u

• Si vous souffrez d'épileps
accident vasculaire céré
produire. Si tel était votre

• Dans de rares cas, d
sensation de brûlure, de
survenir, en particulier au
de prendre SEPCEN® et
un état potentiellement i

• Des réactions psychia
souffrez de dépression e
SEPCEN®. Si cela se pr

• Les antibiotiques de la
sucré dans le sang au-d
sucré dans le sang en de
hypoglycémique) dans le
est important à prendre

sucré dans le sang doit é

• Vous pouvez souffrir de
plusieurs semaines après
de ces diarrhées, ou si
immédiatement de pren

• Si vous avez des trou
immédiatement un ophtal

• Votre peau devient pa
SEPCEN®. Evitez de vou
ceux utilisés dans les cab

• Si vous devez subir un
laboratoire d'analyses qu

• Si vous avez des pro
éventuellement être adap

• SEPCEN® peut provoq

arrez de prendre SEPCEN®

• SEPCEN® peut entraîn

4.
5. Comment conserver SEPCEN® ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

- Ne prenez jamais SEPCEN® :

• Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

• Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

• Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

• Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

• Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

• Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

• Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

• Si vous souffrez de myasténie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

• Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

• Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

• Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné
de 4.

maladie de Behcet, l'hy

une maladie des articula

* Si vous avez des problèmes né(e) avec ou avez e à l'ECG, qui est un enregistrement électrique dans le sang dans le sang), si vous avez une affaiblissement cardiaque. * Si vous êtes une femme ou une homme, avec des anomalies au niveau de la peau. Pour le traitement de ces maladies, il faut prendre un autre antibiotique en association avec SEPCEN® après 3 jours de traitement.

Pendant la prise de SEPCEN®

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez SEPCEN®. Votre

* Réaction allergique : si vous n'avez pas eu de réaction allergique à la première dose, il existe une réaction allergique manifeste par les symptômes suivants : évanouissements, ou vomissements, ou diarrhées, ou

* Effets indésirables graves : les effets indésirables graves sont les effets indésirables très rares (années), invalidants ou mortels. Les effets indésirables graves peuvent être : les muscles et les articulations, engourdissement ou une perte de la vue, du goût, de l'odorat, de la force et de troubles sévères.

Si vous présentez l'un de ces symptômes, contactez votre médecin avant de prendre SEPCEN®. Si vous présentez l'un de ces symptômes, contactez votre médecin avant de prendre SEPCEN®.

* Une douleur et un gonflement dans les tendons peuvent survenir (par exemple, au bout de 48 heures).

Dès les premiers signes d'une douleur dans le poignet, du coude, de l'épaule ou de la hanche, arrêtez de prendre SEPCEN®.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos qui pourraient être des symptômes d'atteinte de la moelle épinière, contactez immédiatement au service avec des corticostéroïdes.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos, ou si vous remarquez une nouvelle apparition de douleurs dans le dos, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Dans de rares cas, il peut y avoir une sensation de brûlure, de douleur ou de gonflement dans le membre atteint.

* Des réactions psychiatriques peuvent se produire. Si tel était votre cas, contactez votre médecin.

* Dans de rares cas, il peut y avoir une sensation de brûlure, de douleur ou de gonflement dans le membre atteint.

* Des réactions psychiatriques peuvent se produire. Si tel était votre cas, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

* Si vous souffrez d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, ou si vous avez une maladie cardiaque, contactez votre médecin.

4.
5. Comment conserver SEPCEN® ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

- Ne prenez jamais SEPCEN® :

• Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

• Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

• Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

• Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

• Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

• Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

• Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

• Si vous souffrez de myasténie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

• Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

• Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

• Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné

de 4.

maladie de Behcet, l'hy

une maladie des articula

* Si vous avez des probl

es né(e) avec ou avez

à l'ECG, qui est un enre

électrolytique dans le sa

ans le sang), si vous a

affaibli (insuffisance car

ites une femme ou une

anomalies au niveau de l

Pour le traitement de ce

autre antibiotique en as

après 3 jours de traiteme

pendant la prise de SEPC

Prévenez immédiatement

prenez SEPCEN®. Votre

* Réaction allergique se

première dose, il existe

manifeste par les sy

évanouissements, ou ve

arrêtez de prendre SEPC

* Effets indésirables gr

antibactériens de type m

indésirables très rares (

années), invalidants ou p

les muscles et les art

sensations anomalies

engourdissement ou une

de la vue, du goût, de l'od

intense et de troubles sév

Si vous présentez l'un de c

votre médecin avant de po

tre traitement en envisa

* Une douleur et un gonfle

tendons peuvent survenir

(ans), si vous avez eu un

traitement par des corti

premières 48 heures du

Dès les premiers signes e

du poignet, du coude, de

et mettez le membre atte

rupture d'un tendon.

* Si vous ressentez une q

qui peuvent être des i

immédiatement au service

avec des corticostéroïde

* Si vous ressentez sou

lit, ou si vous remarque

nouvelle apparition de p

vous devez en informer u

* Si vous souffrez d'épile

accident vasculaire céré

produire. Si tel était voul

* Dans de rares cas, d

sensation de brûlure, de

survenir, en particulier au

de prendre SEPCEN® et

un état potentiellement i

* Des réactions psychia

souffrez de dépression

SEPCEN®. Si cela se pro

* Les antibiotiques de la

sucré dans le sang au-de

sucré dans le sang en de

hypoglycémique) dans le

est important à prendre

sucré dans le sang doit é

* Vous pouvez souffrir de

plusieurs semaines aprè

de ces diarrhées, ou si

immédiatement de pren

médicaments visant à blo

* Si vous avez des trou

immédiatement un opht

* Votre peau devient pa

SEPCEN®. Evitez de vou

ceux utilisés dans les cab

* Si vous devez subir un

laboratoire d'analyses qu

* Si vous avez des pr

éventuellement être adap

* SEPCEN® peut provo

de l'appétit, ictere (jauni

arrez de prendre SEPC

* SEPCEN® peut entraîn

4.

5. Comment conserver SEPCEN® ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

* Ne prenez jamais SEPCEN® :

* Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

* Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

* Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

* Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

* Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

* Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

* Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

* Si vous souffrez de myasténie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

* Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

* Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

* Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

* Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné

de 4.

maladie de Behcet, l'hy

une maladie des articula

* Si vous avez des probl

es né(e) avec ou avez

à l'ECG, qui est un enreg

électrolytique dans le sa

ans le sang), si vous a

affaibli (insuffisance car

ites une femme ou une

anomalies au niveau de l

Pour le traitement de ce

autre antibiotique en as

après 3 jours de traiteme

pendant la prise de SEPC

Prévenez immédiatement

prenez SEPCEN®. Votre

* Réaction allergique se

première dose, il existe

manifeste par les sy

évanouissements, ou ve

arrêtez de prendre SEPC

* Effets indésirables gr

antibactériens de type m

indésirables très rares (

années), invalidants ou p

les muscles et les artic

sensations anomalies

engourdissement ou une

de la vue, du goût, de l'od

intense et de troubles sév

Si vous présentez l'un de c

votre médecin avant de po

tre traitement en envisag

* Une douleur et un gonfl

tendons peuvent survenir

(ans), si vous avez eu un

traitement par des corti

premières 48 heures du

Dès les premiers signes e

du poignet, du coude, de

et mettez le membre atte

rupture d'un tendon.

* Si vous ressentez une q

qui peuvent être des i

immédiatement au service

avec des corticostéroïde

* Si vous ressentez sou

lit, ou si vous remarque

nouvelle apparition de p

vous devez en informer u

* Si vous souffrez d'épile

accident vasculaire céré

produire. Si tel était voul

* Dans de rares cas, d

sensation de brûlure, de

survenir, en particulier au

de prendre SEPCEN® et

un état potentiellement i

* Des réactions psychia

souffrez de dépression

SEPCEN®. Si cela se pr

* Les antibiotiques de la

sucré dans le sang au-de

sucré dans le sang en de

hypoglycémique) dans le

est important à prendre

sucré dans le sang doit é

* Vous pouvez souffrir de

plusieurs semaines aprè

de ces diarrhées, ou si

immédiatement de pren

médicaments visant à blo

* Si vous avez des trou

immédiatement un opht

* Votre peau devient pa

SEPCEN®. Evitez de vou

ceux utilisés dans les cab

* Si vous devez subir un

laboratoire d'analyses qu

* Si vous avez des pro

éventuellement être adap

* SEPCEN® peut provo

de l'appétit, ictere (jauni

arrez de prendre SEPC

* SEPCEN® peut entraî

4.

5. Comment conserver SEPCEN® ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

* Ne prenez jamais SEPCEN® :

* Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

* Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

* Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

* Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

* Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

* Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

* Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

* Si vous souffrez de myasténie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

* Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

* Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

* Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

* Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné

de 4.

maladie de Behcet, l'hy

une maladie des articula

* Si vous avez des probl

es né(e) avec ou avez

à l'ECG, qui est un enreg

électrolytique dans le sa

ans le sang), si vous a

affaibli (insuffisance car

ites une femme ou une

anomalies au niveau de l

Pour le traitement de ce

autre antibiotique en as

après 3 jours de traiteme

pendant la prise de SEPC

Prévenez immédiatement

prenez SEPCEN®. Votre

* Réaction allergique se

première dose, il existe

manifeste par les sy

évanouissements, ou ve

arrêtez de prendre SEPC

* Effets indésirables gr

antibactériens de type m

indésirables très rares (

années), invalidants ou p

les muscles et les art

sensations anomalies

engourdissement ou une

de la vue, du goût, de l'od

intense et de troubles sév

Si vous présentez l'un de c

votre médecin avant de po

tre traitement en envisa

* Une douleur et un gonfl

tendons peuvent survenir

(ans), si vous avez eu un

traitement par des corti

premières 48 heures du

Dès les premiers signes e

du poignet, du coude, de

et mettez le membre atte

rupture d'un tendon.

* Si vous ressentez une q

qui peuvent être des i

immédiatement au service

avec des corticostéroïde

* Si vous ressentez sou

lit, ou si vous remarque

nouvelle apparition de p

vous devez en informer u

* Si vous souffrez d'épile

accident vasculaire céré

produire. Si tel était voul

* Dans de rares cas, d

sensation de brûlure, de

survenir, en particulier au

de prendre SEPCEN® et

un état potentiellement i

* Des réactions psychia

souffrez de dépression

SEPCEN®. Si cela se pr

* Les antibiotiques de la

sucré dans le sang au-de

sucré dans le sang en de

hypoglycémique) dans le

est important à prendre

sucré dans le sang doit é

* Vous pouvez souffrir de

plusieurs semaines aprè

de ces diarrhées, ou si

immédiatement de pren

médicaments visant à blo

* Si vous avez des trou

immédiatement un opht

* Votre peau devient pa

SEPCEN®. Evitez de vou

ceux utilisés dans les cab

* Si vous devez subir un

laboratoire d'analyses qu

* Si vous avez des pro

éventuellement être adap

* SEPCEN® peut provo

de l'appétit, ictere (jauni

arrez de prendre SEPC

* SEPCEN® peut entraîn

4.

5. Comment conserver SEPCEN® ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

* Ne prenez jamais SEPCEN® :

* Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

* Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

* Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

* Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

* Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

* Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

* Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

* Si vous souffrez de myasténie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

* Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

* Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

* Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

* Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés

D.C.I : Ciprofloxacin

LOT : 05622001
PER : 02/2025
PFV : 51.43 D

medicament.

mations à votre médecin

quelqu'un d'autre, même

désirable non mentionné
de 4.

maladie de Behcet, l'hy

une maladie des articula

* Si vous avez des problèmes né(e) avec ou avez à l'ECG, qui est un enregistrement électrolytique dans le sang dans le sang), si vous avez une affaiblissement (insuffisance cardiaque), êtes une femme ou une personne âgée, ou avez des anomalies au niveau de la peau. Pour le traitement de ces maladies, il faut prendre un autre antibiotique en association avec SEPCEN® après 3 jours de traitement.

Pendant la prise de SEPCEN®

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez SEPCEN®. Votre

* Réaction allergique : si vous n'avez pas eu de réaction allergique à la première dose, il existe une réaction allergique manifeste par les symptômes suivants : évanouissements, ou vomissements, ou diarrhées, ou arrêtez de prendre SEPCEN®.

* Effets indésirables graves : certains effets indésirables peuvent être très rares (années), invalidants ou mortels. Ils peuvent concerner les muscles et les articulations, entraînant un engourdissement ou une perte de la force, de la vue, du goût, de l'odorat, de la sensibilité et de troubles sévères. Si vous présentez l'un de ces symptômes, contactez votre médecin avant de prendre SEPCEN®.

* Une douleur et un gonflement des tendons peuvent survenir (dans les premières semaines), si vous avez eu un traitement par des corticoïdes pendant les 48 dernières heures.

Dès les premiers signes d'engourdissement, de douleur ou de gonflement, contactez votre médecin et mettez le membre atteint au repos.

* Si vous ressentez une douleur dans le bras ou le poignet, du coude, de l'épaule ou de la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

* Si vous ressentez une douleur dans le dos ou la hanche, contactez votre médecin.

4.
5. Comment conserver SEPCEN® ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin.

La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

- Ne prenez jamais SEPCEN® :

• Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

• Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

• Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

• Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

• Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

• Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

• Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

• Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

• Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

• Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

• Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

Notice : Information de l'utilisateur

NovoMix® 30 FlexPen®

100 U/ml,

Suspension injectable en stylo pré-rempli

30 % d'insuline asparte soluble et 70 % d'insuline asparte cristallisée avec la protamine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gard 1 NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
- Si vo 2 Suspension injectable
otre 270-2 5 styls pré-remplis de 3ml
votre PPV : 559 DH
- Ce m 3
donn 4
même 5
vôtre 6
- Si un c 7
devient sérieux, parlez-en
à votre 8...médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.
Ceci inclut tout effet indésirable non mentionné au niveau
de cette notice.



6 118001 121298

ain de la relire.
tre médecin,

rescrit. Ne le
ur être nocif,
ques aux

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NovoMix® 30 et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Avant d'utiliser NovoMix® 30
3. Comment utiliser NovoMix® 30?
4. Les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver NovoMix® 30?
6. Autres informations

1. Qu'est-ce que NovoMix® 30 et dans quel cas est-il utilisé ?

NovoMix® 30 est une insuline moderne (anologue de l'insuline) avec une action rapide et une action intermédiaire, dans un rapport de 30/70. Les insulines modernes sont des versions améliorées de l'insuline humaine.

NovoMix® 30 est utilisé pour traiter les patients diabétiques nécessitant l'insuline. Le diabète est une maladie au cours de



Faites attention avec NovoMix® 30

- Si vous avez des problèmes de reins, de foie, de glandes surrénales, d'hypophyse ou de thyroïde.
- Si vous faites plus d'efforts physiques que d'habitude ou si vous voulez modifier votre régime alimentaire habituel, car ceci peut modifier votre taux de sucre dans le sang.
- Si vous êtes malade, continuez à prendre votre insuline et consultez votre médecin.
- Si vous partez en voyage à l'étranger: les décalages horaires entre pays peuvent modifier vos besoins en insuline et les horaires de vos injections. Veuillez consulter votre médecin si vous planifiez un tel voyage.

Autres médicaments

Certains médicaments influent sur votre taux de sucre dans le sang, ce qui veut dire que votre dose d'insuline peut changer. Informez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament en plus du NovoMix®, en incluant les médicaments obtenus sans prescription.

Les principaux médicaments susceptibles de modifier votre traitement à l'insuline sont indiqués ci-dessous.

Votre taux de sucre dans le sang peut diminuer (hypoglycémie) si vous prenez :

- Autres médicaments pour le traitement du diabète
- Inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (utilisés pour traiter la dépression)
- Bêtabloquants (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle)
- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (utilisés pour traiter certaines maladies cardiaques ou l'hypertension artérielle)
- Salicylés (utilisés pour soulager la douleur et faire diminuer la fièvre)
- Stéroïdes anabolisants (tels que la testostérone)
- Sulfamides (utilisés pour traiter les infections)