

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0020930

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9290 Société : RAM SN

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : SANIR MOHAMED Date de naissance : 25/05/1960

Adresse : DERB CHALIF 251 N° 10 CASA

Tél. : 0660039208 Total des frais engagés : 1135,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :


Dr. BOUTALEB Med. Kamal
Omnipraticien
Médecin du Travail - Expert Médical
Angle Bd. Bir Anzarane et Rue Ibnou Chahid
Face M'dina Bus Madrif - CABALANCA

Date de consultation :

21 JUIN 2023

Nom et prénom du malade :

Dr SANIR MOHAMED

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Age : 63A

PT 25/05 + MTA

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA-BLANCA

Le : 21/06/2023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/06/23	C		200	Dr. KAMAL AL OMAR - Expert Médical - Résident en Radiologie - CARALANGA - 28/05/23 12:12:12

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. KAMAL AL OMAR - Expert Médical - Résident en Radiologie - CARALANGA - 28/05/23 12:12:12	21/06/23	035,60

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
Dr. KAMAL AL OMAR - Expert Médical - Résident en Radiologie - CARALANGA - 28/05/23 12:12:12			

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Med Kamal BOUTALEB

OMNIPRACTICIEN

Expert auprès des Tribunaux

Diplômé en Médecine du travail

Agree pour établir les certificats du permis de conduire

face dépôt des bus (Tac) - Maârif - Casablanca

Tél.: 05 22 23 85 26 / 05 26 12 12 42

CASABLANCA

الدكتور محمد كمال بوطالب

الطب العام

خير لدى المحاكم

إختصاصي في طب الشغل

معتمد لإنجاز شهادة رخص السياقة

زاوية شارع بيرأنزران و زنقة ابن شهيد

أمام حافلات النقل (طاك) - المعاريف - الطابق 2

الهاتف : 05 22 23 85 26 / 05 26 12 12 42

الدار البيضاء

Casablanca, le :

21 JUIN 2023

Dr SANIR Nekh

96,80

Y Atingue Y

Dr. BOUTALEB Med. Kamal
Omnipraticien
Médecin du Travail - Expert Médical
Angle Bd. Bir Anzarane et Rue Ibnou Chahid
Face M'dina Bus Maârif - CASABLANCA
Tél.: 05 22 23 85 26 / 05 26 12 12 42

Y Convenu A 60 / m

2 41 m

6x 139,80

035,60

Dr. BOUTALEB Med. Kamal
Omnipraticien
Médecin du Travail - Expert Médical
Angle Bd. Bir Anzarane et Rue Ibnou Chahid
Face M'dina Bus Maârif - CASABLANCA
Tél.: 05 22 23 85 26 / 05 26 12 12 42

PHARMACIE GIBALI
Mme. EL KAMOUN - Pharmacie
Dr. CHAIBI - Pharmacie
Bébi, Pneumologie, Andrologie



Co-Zenovan® 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Comprimés Pelliculés
DCI: Valsartan/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes équivalents, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un de ces effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que Co-Zenovan®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

3. Comment prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

5. Comment conserver Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CO-ZENOVAR® COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique:

Co-Zenovan® comprimé pelliculé, contient deux substances actives appelées valsartan et hydrochlorothiazide. Ces deux substances aident à contrôler la pression artérielle élevée (hypertension).

Le valsartan appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques thiazide. L'hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Indications thérapeutiques:

Co-Zenovan® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.

L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cœur, des yeux, des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition des pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Contre-indications:

Ne prenez jamais Co-Zenovan®, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans Co-Zenovan®.

Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Co-Zenovan® en début de grossesse), voir rubrique Grossesse et allaitement).

Si vous avez une maladie de la thyroïde sévère.

Si vous avez des difficultés pour uriner.

Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).

Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale, sans que ce soit un traitement.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque de goutte.

Si vous souffrez de diabète et d'insuffisance rénale et que vous êtes traité avec un antihypertenseur appelé aliskiren.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Précautions d'emploi / mises en garde spéciales

Si vous prenez des médicaments contenant de la potassium, des suppléments potassiques, des substituts de la potassium ou du potassium d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.

Si votre taux sanguin de potassium est faible, vous présentez des dérangements et des symptômes sévères.

Si vous prenez de fortes doses de diurétiques.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou avez eu une attaque cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut également vérifier votre fonction renale.

Si vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.

Si vous avez reçu récemment une transplantation rénale, si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de Co-Zenovan® est déconseillée si vous souffrez de l'une de ces maladies.

Si vous avez une maladie du foie ou des reins.

Si vous avez déjà présenté un gonflement, essentiellement du visage et de la gorge en prenant d'autres médicaments.

Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de prendre Co-Zenovan® et contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin pour prendre le Co-Zenovan®.

Si vous présentez une fièvre, une douleur dans les articulations, qui peuvent être des signes de la maladie de la maladie (LED), une maladie auto-immune.

Si vous êtes diabétique, si vous avez des taux sanguins élevés.

Si vous présentez des réactions allergiques aux médicaments antihypertenseurs.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous avez quelques symptômes de la maladie de la maladie (LED), une maladie auto-immune.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la maladie (LED), une maladie auto-immune.

L'hydrochlorothiazide contenu dans ce médicament peut induire une réaction positive des tests pratiqués lors du contrôle antidiabétique.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:
Avant de conduire un véhicule, d'utiliser des outils ou des machines ou d'effectuer toute autre activité nécessitant de la concentration, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à Co-Zenovan®. Comme avec beaucoup d'autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, Co-Zenovan® peut, dans de rares cas, entraîner des sensations vertigineuses et affecter la capacité à se concentrer.

3. COMMENT PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Prenez toujours Co-Zenovan® comme votre médecin vous l'a indiqué afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. Beaucoup de personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien.

Votre médecin vous dira combien de comprimés de Co-Zenovan® vous devez prendre. En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus élevée ou plus faible.

La dose habituelle de Co-Zenovan® est un comprimé par jour. Vous ne devez pas modifier la dose ou arrêter de prendre les comprimés sans l'avis de votre médecin. Ce médicament doit être pris à la même heure chaque jour, en général le matin. Si vous avez oublié une dose, vous pouvez prendre Co-Zenovan® avec ou sans aliments.

Allez le comprimé avec un verre d'eau.

Si vous avez pris plus de Co-Zenovan®, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû:

Si vous avez des sensations vertigineuses sévères et/ou des évanouissements, allongez-vous et consultez immédiatement votre médecin. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre Co-Zenovan, comprimé pelliculé:

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous moment de votre prochaine prise est proche.

N'oubliez pas de prendre une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé:

L'arrêt de votre traitement par Co-Zenovan® peut entraîner une aggravation de votre hypertension. N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Description des effets indésirables:

Comme tous les médicaments Co-Zenovan®, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains effets indésirables peuvent être graves et nécessitent une prise en charge médicale immédiate:

Vous devez immédiatement contacter votre médecin en cas de symptômes d'angioédème, tels que:

Difficulté à avaler.

Urticaire et difficultés à respirer.

Malaise sévère de la peau qui induit éruption, rougeur de la peau, formation de vésicules (abcès) sur les lèvres, les yeux ou dans la bouche, desquamation de la peau (la peau qui pèle), fièvre, nécrose épidermique toxique.

Baisse de la vision ou douleur dans les yeux dus à une pression oculaire élevée (signes possibles de glaucome aigu à l'angle interne).

Mal de gorge, infections plus fréquentes (agranulocytose).

Ces effets indésirables sont très rares ou leur fréquence est indéterminée.

Les autres effets indésirables incluent:

Peu fréquent:

Toux.

pression artérielle basse.

Bouffées de chaleur.

Déshydratation (avec les symptômes suivants: soif, bouche et langue sèches, uriner peu fréquemment, urines sombres, peau sèche).

Douleurs musculaires.

Fatigue.

Sensations de picotements ou d'engourdissement.

Bruits (par exemple sifflements, bourdonnements) dans les oreilles.

Très rare

Sensations vertigineuses.

Diarrhées.

Douleurs articulaires.

Éruptions indéterminées.

Difficultés respiratoires.

Diminution importante du débit urinaire.

Taux faible de sodium dans le sang (accompagné parfois de nausées, de fatigue, de confusion, de malaise et de convulsions).

Taux faible de potassium dans le sang (accompagné parfois de faiblesse musculaire, de spasmes musculaires et d'anomalies du rythme cardiaque).

Taux faible de globules blancs dans le sang (avec des symptômes tels que fièvre, infections cutanées, mal de gorge ou aphtes dans la bouche dus à des infections, faiblesse).

Augmentation du taux de bilirubine dans le sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner un jaunissement de la peau et des yeux).

139,80

Co-Zenovan® 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Comprimés Pelliculés
DCI: Valsartan/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes équivalents, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un de ces effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que Co-Zenovan®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

3. Comment prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

5. Comment conserver Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CO-ZENOVAR® COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique:

Co-Zenovan® comprimé pelliculé, contient deux substances actives appelées valsartan et hydrochlorothiazide. Ces deux substances aident à contrôler la pression artérielle élevée (hypertension).

Le valsartan appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques thiazide. L'hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Indications thérapeutiques:

Co-Zenovan® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.

L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cœur, des yeux, des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition des pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Contre-indications:

Ne prenez jamais Co-Zenovan®, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans Co-Zenovan®.

Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Co-Zenovan® en début de grossesse), voir rubrique Grossesse et allaitement).

Si vous avez une maladie de la thyroïde sévère.

Si vous avez des difficultés pour uriner.

Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).

Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale, sans que ce soit un traitement.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque de goutte.

Si vous souffrez de diabète et d'insuffisance rénale et que vous êtes traité avec un antihypertenseur appelé aliskiren.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Précautions d'emploi / mises en garde spéciales

Si vous prenez des médicaments contenant de la potassium, des suppléments potassiques, des substituts de la potassium ou du potassium d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.

Si votre taux sanguin de potassium est faible, vous présentez des dérangements et des symptômes sévères.

Si vous prenez de fortes doses de diurétiques.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou avez eu une attaque cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut également vérifier votre fonction renale.

Si vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.

Si vous avez reçu récemment une transplantation rénale, si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de Co-Zenovan® est déconseillée si vous souffrez de l'une de ces maladies.

Si vous avez une maladie du foie ou des reins, si vous avez déjà présenté un gonflement, essentiellement du visage et de la gorge en prenant d'autres médicaments.

Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de prendre Co-Zenovan® et contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin pour prendre le Co-Zenovan®.

Si vous présentez une fièvre, une douleur dans les articulations, qui peuvent être des signes de la maladie auto-immune (LED), une maladie auto-immune.

Si vous êtes diabétique, si vous avez des taux sanguins élevés de sucre dans le sang.

Si vous présentez des réactions allergiques aux médicaments antihypertenseurs.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête, ces symptômes peuvent être des symptômes de la maladie de la pression dans votre œil et peuvent survenir quelques heures à une semaine après l'initiation.

En l'absence de traitement, cela peut conduire à la cécité.

L'hydrochlorothiazide contenu dans ce médicament peut induire une réaction positive des tests pratiqués lors du contrôle antidiabétique.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

Avant de conduire un véhicule, d'utiliser des outils ou des machines ou d'effectuer toute autre activité nécessitant de la concentration, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à Co-Zenovan®. Comme avec beaucoup d'autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, Co-Zenovan® peut, dans de rares cas, entraîner des sensations vertigineuses et affecter la capacité à se concentrer.

3. COMMENT PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Prenez toujours Co-Zenovan® comme votre médecin vous l'a indiqué afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. Beaucoup de personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien.

Votre médecin vous dira combien de comprimés de Co-Zenovan® vous devez prendre. En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus élevée ou plus faible.

La dose habituelle de Co-Zenovan® est un comprimé par jour. Vous ne devez pas modifier la dose ou arrêter de prendre les comprimés sans l'avis de votre médecin. Ce médicament doit être pris à la même heure chaque jour, en général le matin. Si vous avez oublié une dose, consultez votre pharmacien, vous pouvez prendre Co-Zenovan® avec ou sans aliments.

Allez le comprimé avec un verre d'eau.

Si vous avez pris plus de Co-Zenovan®, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû:

Si vous avez des sensations vertigineuses sévères et/ou des évanouissements, allongez-vous et consultez immédiatement votre médecin. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre Co-Zenovan, comprimé pelliculé:

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous moment de votre prochaine prise est proche.

N'oubliez pas de prendre une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé:

L'arrêt de votre traitement par Co-Zenovan® peut entraîner une aggravation de votre hypertension. N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Description des effets indésirables:

Comme tous les médicaments Co-Zenovan®, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains effets indésirables peuvent être graves et nécessitent une prise en charge médicale immédiate:

Vous devez immédiatement contacter votre médecin en cas de symptômes d'angioédème, tels que:

Difficulté à avaler.

Urticaire et difficultés à respirer.

Malaise sévère de la peau qui induit éruption, rougeur de la peau, formation de vésicules (abcoucles) sur les lèvres, les yeux ou dans la bouche, desquamation de la peau (la peau qui pèle), fièvre, nécrose épidermique toxique.

Baisse de la vision ou douleur dans les yeux dus à une pression oculaire élevée (signes possibles de glaucome aigu à l'angle interne).

Mal de gorge, infections plus fréquentes (agranulocytose). Ces effets indésirables sont très rares ou leur fréquence est indéterminée.

Les autres effets indésirables incluent:

Peu fréquent:

Toux.

pression artérielle basse.

Bouffées de chaleur.

Déshydratation (avec les symptômes suivants: soif, bouche et langue sèches, uriner peu fréquemment, urines sombres, peau sèche).

Douleurs musculaires.

Fatigue.

Sensations de picotements ou d'engourdissement.

Bruits (par exemple sifflements, bourdonnements) dans les oreilles.

Très rare

Sensations vertigineuses.

Diarrhées.

Douleurs articulaires.

Éruptions indéterminées.

Difficultés respiratoires.

Diminution importante du débit urinaire.

Taux faible de sodium dans le sang (accompagné parfois de nausées, de fatigue, de confusion, de malaise et de convulsions).

Taux faible de potassium dans le sang (accompagné parfois de faiblesse musculaire, de spasmes musculaires et d'anomalies du rythme cardiaque).

Taux faible de globules blancs dans le sang (avec des symptômes tels que fièvre, infections cutanées, mal de gorge ou aphtes dans la bouche dus à des infections, faiblesse).

Augmentation du taux de bilirubine dans le sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner un jaunissement de la peau et des yeux).

139,80

Co-Zenovan® 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Comprimés Pelliculés
DCI: Valsartan/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes équivalents, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un de ces effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que Co-Zenovan®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

3. Comment prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

5. Comment conserver Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CO-ZENOVAR® COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique:

Co-Zenovan® comprimé pelliculé, contient deux substances actives appelées valsartan et hydrochlorothiazide. Ces deux substances aident à contrôler la pression artérielle élevée (hypertension).

Le valsartan appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques thiazide. L'hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Indications thérapeutiques:

Co-Zenovan® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.

L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cœur, des yeux, des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition des pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Contre-indications:

Ne prenez jamais Co-Zenovan®, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans Co-Zenovan®.

Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Co-Zenovan® en début de grossesse), voir rubrique Grossesse et allaitement).

Si vous avez une maladie de la thyroïde sévère.

Si vous avez des difficultés pour uriner.

Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).

Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale, sans que ce soit un traitement.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque de goutte.

Si vous souffrez de diabète et d'insuffisance rénale et que vous êtes traité avec un antihypertenseur appelé aliskiren.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Précautions d'emploi / mises en garde spéciales

Si vous prenez des médicaments contenant de la potassium, des suppléments potassiques, des substituts de la potassium ou du potassium d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.

Si votre taux sanguin de potassium est faible, vous présentez des dérangements et des symptômes sévères.

Si vous prenez de fortes doses de diurétiques.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou avez eu une attaque cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut également vérifier votre fonction renale.

Si vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.

Si vous avez reçu récemment une transplantation rénale, si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de Co-Zenovan® est déconseillée si vous souffrez de l'une de ces maladies.

Si vous avez une maladie du foie ou des reins.

Si vous avez déjà présenté un gonflement, essentiellement du visage et de la gorge en prenant d'autres médicaments.

Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de prendre Co-Zenovan® et contactez immédiatement votre désteller ou pharmacien pour prendre le Co-Zenovan®.

Si vous présentez une inflammation des tissus conjonctifs articulaires, qui peuvent être des signes de la maladie de la maladie (LED), une maladie auto-immune.

Si vous êtes diabétique, si vous avez des taux sanguins élevés de sucre dans le sang.

Si vous présentez des réactions allergiques aux médicaments antihypertenseurs.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une

Co-Zenovan® 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Comprimés Pelliculés
DCI: Valsartan/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes équivalents, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un de ces effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que Co-Zenovan®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

3. Comment prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

5. Comment conserver Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CO-ZENOVAR® COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique:

Co-Zenovan® comprimé pelliculé, contient deux substances actives appelées valsartan et hydrochlorothiazide. Ces deux substances aident à contrôler la pression artérielle élevée (hypertension).

Le valsartan appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques thiazide. L'hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Indications thérapeutiques:

Co-Zenovan® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.

L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cœur, des yeux, des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition des pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Contre-indications:

Ne prenez jamais Co-Zenovan®, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans Co-Zenovan®.

Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Co-Zenovan® en début de grossesse), voir rubrique Grossesse et allaitement).

Si vous avez une maladie de la thyroïde sévère.

Si vous avez des difficultés pour uriner.

Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).

Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale, sans que ce soit un traitement.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque de goutte.

Si vous souffrez de diabète et d'insuffisance rénale et que vous êtes traité avec un antihypertenseur appelé aliskiren.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Précautions d'emploi / mises en garde spéciales

Si vous prenez des médicaments contenant de la potassium, des suppléments potassiques, des substituts de la potassium ou du potassium d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.

Si votre taux sanguin de potassium est faible, vous présentez des dérangements et des symptômes sévères.

Si vous prenez de fortes doses de diurétiques.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou avez eu une attaque cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut également vérifier votre fonction renale.

Si vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.

Si vous avez reçu récemment une transplantation rénale, si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de Co-Zenovan® est déconseillée si vous souffrez de l'une de ces maladies.

Si vous avez une maladie du foie ou des reins.

Si vous avez déjà présenté un gonflement, essentiellement du visage et de la gorge en prenant d'autres médicaments.

Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de prendre Co-Zenovan® et contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin pour prendre le Co-Zenovan®.

Si vous présentez une inflammation des tissus conjonctifs articulaires, qui peuvent être des signes de la maladie de la maladie (LED), une maladie auto-immune.

Si vous êtes diabétique, si vous avez des taux sanguins élevés de sucre dans le sang.

Si vous présentez des réactions allergiques aux médicaments antihypertenseurs.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une

Co-Zenovan® 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Comprimés Pelliculés
DCI: Valsartan/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes équivalents, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un de ces effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que Co-Zenovan®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

3. Comment prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

5. Comment conserver Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CO-ZENOVAR® COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique:

Co-Zenovan® comprimé pelliculé, contient deux substances actives appelées valsartan et hydrochlorothiazide. Ces deux substances aident à contrôler la pression artérielle élevée (hypertension).

Le valsartan appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques thiazide. L'hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Indications thérapeutiques:

Co-Zenovan® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.

L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cœur, des yeux, des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition des pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Contre-indications:

Ne prenez jamais Co-Zenovan®, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans Co-Zenovan®.

Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Co-Zenovan® en début de grossesse), voir rubrique Grossesse et allaitement).

Si vous avez une maladie de la thyroïde sévère.

Si vous avez des difficultés pour uriner.

Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).

Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale, sans que ce soit un traitement.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque de goutte.

Si vous souffrez de diabète et d'insuffisance rénale et que vous êtes traité avec un antihypertenseur appelé aliskiren.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Précautions d'emploi / mises en garde spéciales

Si vous prenez des médicaments contenant de la potassium, des suppléments potassiques, des substituts de la potassium ou du potassium d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.

Si votre taux sanguin de potassium est faible, vous présentez des dérangements et des symptômes sévères. Si vous prenez de fortes doses de diurétiques.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou avez eu une attaque cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut également vérifier votre fonction renale.

Si vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.

Si vous avez reçu récemment une transplantation rénale, si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de Co-Zenovan® est déconseillée si vous souffrez de l'une de ces maladies.

Si vous avez une maladie du foie ou des reins.

Si vous avez déjà présenté un gonflement, essentiellement du visage et de la gorge en prenant d'autres médicaments.

Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de prendre Co-Zenovan® et contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin pour prendre le Co-Zenovan®.

Si vous présentez une fièvre, une douleur dans les articulations, qui peuvent être des signes de la maladie de la maladie (LED), une maladie auto-immune.

Si vous êtes diabétique, si vous avez des taux sanguins élevés de sucre dans le sang.

Si vous présentez des réactions allergiques aux médicaments antihypertenseurs.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thyroïde.

Si vous avez des symptômes de la maladie de la thy

Co-Zenovan® 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Comprimés Pelliculés
DCI: Valsartan/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes équivalents, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un de ces effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que Co-Zenovan®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

3. Comment prendre Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

5. Comment conserver Co-Zenovan®, comprimé pelliculé?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CO-ZENOVAR® COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique:

Co-Zenovan® comprimé pelliculé, contient deux substances actives appelées valsartan et hydrochlorothiazide. Ces deux substances aident à contrôler la pression artérielle élevée (hypertension).

Le valsartan appartient à la famille des antagonistes de l'angiotensine II qui aident à contrôler l'hypertension artérielle. L'angiotensine II est une substance présente dans l'organisme qui stimule la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II. Ceci entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques thiazide. L'hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Indications thérapeutiques:

Co-Zenovan® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par une des substances administrée seule.

L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cœur, des yeux, des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition des pathologies.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ZENOVAR®, COMPRIME PELLICULE?

Contre-indications:

Ne prenez jamais Co-Zenovan®, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

Si vous êtes allergique (hypersensible) au valsartan, à l'hydrochlorothiazide, aux dérivés des sulfamides (des substances apparentées chimiquement à l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans Co-Zenovan®.

Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Co-Zenovan® en début de grossesse), voir rubrique Grossesse et allaitement).

Si vous avez une maladie de la thyroïde sévère.

Si vous avez des difficultés pour uriner.

Si vous êtes sous dialyse (rein artificiel).

Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est inférieur à la normale ou si votre taux sanguin de calcium est supérieur à la normale, sans que cela ne soit dû à un traitement.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque de goutte.

Si vous souffrez de diabète et d'insuffisance rénale et que vous êtes traité avec un antihypertenseur appelé aliskiren.

Si l'une de ces situations s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Précautions d'emploi / mises en garde spéciales

Si vous prenez des médicaments contenant de la potassium, des suppléments potassiques, des substituts de la potassium ou du potassium d'autres médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang tels que l'héparine. Votre médecin pourra avoir besoin de vérifier régulièrement la quantité de potassium dans votre sang.

Si votre taux sanguin de potassium est faible, vous présentez des dérangements et des symptômes sévères.

Si vous prenez de fortes doses de diurétiques.

Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou avez eu une attaque cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut également vérifier votre fonction renale.

Si vous présentez une sténose (rétrécissement) des artères du rein.

Si vous avez reçu récemment une transplantation rénale.

Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrenales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de Co-Zenovan® est déconseillée si vous souffrez de ce trouble.

Si vous avez une maladie du foie ou des reins.

Si vous avez déjà présenté un gonflement, essentiellement du visage et de la gorge en prenant d'autres médicaments.

Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de prendre Co-Zenovan® et contactez immédiatement votre médecin ou pharmacien pour prendre le Co-Zenovan®.

Si vous présentez une fièvre, une douleur dans les articulations, qui peuvent être des signes de la maladie auto-immune (LED), une maladie auto-immune.

Si vous êtes diabétique, si vous avez des taux sanguins élevés de sucre dans le sang.

Si vous présentez des réactions allergiques aux médicaments antihypertenseurs.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

Si vous ressentez une baisse de la vision ou un mal de tête.

AXIMY

AXIMYCINE® 24 comprimés dispersibles

PV 96DH80

LOT 290054
EXP 09/2024

amoxicilline

INFORMATION DU MÉDICAMENT

- AXIMYCINE® 3 g comprimés dispersibles, boîte
- AXIMYCINE® 500 mg comprimés dispersibles,
- AXIMYCINE® 250 mg/5 ml poudre pour suspensions
- AXIMYCINE® 500 mg/5 ml poudre pour suspensions

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que AXIMYCINE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AXIMYCINE® ?
3. Comment prendre AXIMYCINE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AXIMYCINE® ?
6. Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE AXIMYCINE® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

pénicillines à large spectre - code ATC : J01CA04
AXIMYCINE® est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

- Indications thérapeutiques

AXIMYCINE® est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps. AXIMYCINE® peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AXIMYCINE® ?

- Ne prenez jamais AXIMYCINE® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée et/ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AXIMYCINE® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE®.
- En cas de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartame dans la poudre pour suspension buvable.

- Faites attention avec AXIMYCINE® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE® si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- n'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE®.

Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
- un dosage d'estriol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AXIMYCINE®. En effet, AXIMYCINE® peut influer sur les résultats de ces tests.

- Enfants + adolescents =

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

- Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AXIMYCINE®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

- Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines
AXIMYCINE® peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

- Excipients à effets notoires

poudre pour suspension buvable à 500 mg/5 ml et 250 mg/5 ml : Aspartam
L'aspartam (E951) est source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétoneurie ».

3 - COMMENT PRENDRE AXIMYCINE® ?

- Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement

VEUVEZ À TOUJOURS PRENDRE CE MÉDICAMENT EN SUivant EXACTEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE MÉDÉCIN OU PHARMACIEN. VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE MÉDÉCIN OU PHARMACIEN EN CAS DE DOUBTE.

RÉPARTISSEZ LES PRISES DE MANIÈRE RÉGULIÈRE AU COURS DE LA JOURNÉE ; ELLES DOIVENT ÊTRE ESPACÉES D'AU MOINS 4 HEURES.

Poudre pour suspension buvable :

- Agitez bien le flacon avant chaque utilisation.
- Utilisez la cuillère-mesure fournie avec le flacon.

Comprimés dispersibles :

• Faire disoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avalez immédiatement le mélange.

Posologie habituelle :

Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

• Votre médecin vous indiquera la quantité d'AXIMYCINE® que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.

• La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.

• La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour

Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

LA SUSPENSION N'EST HABITUELLEMENT PAS PRÉSCRITÉE AUX ADULTES ET AUX ENFANTS PESANT PLUS DE 40 KG. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDÉCIN OU PHARMACIEN.

LA POSOLOGIE HABITUELLE D'AXIMYCINE® EST DE 250 MG à 500 MG TROIS FOIS PAR JOUR OU 750 MG à 1 g TROIS FOIS LES 12H, SELON LA SÉVÉRITÉ ET LE TYPE D'INFECTION.

• INFECTIONS SÉVÈRES : 750 mg à 1 g trois fois par jour.

• INFECTION DES VOIES URINAIRES : 3 g deux fois par jour pendant un jour.

• MALADIE DE LYME (INFECTION TRANSMISE PAR DES PARASITES APPELÉS Tiques) : ÉRYTHème MIGRANT ISOLÉ (PHASE PRÉCOCE - ERUPTION CUTANÉE CIRCULAIRE ROUGE OU ROSE) : 4 g par jour, MANIFESTATIONS SYSTÉMIQUES (PHASE TARDIVE - AVEC DES SYMPTÔMES PLUS GRAVES OU QUAND LA MALADIE EST ÉTENDUE À TOUT LE CORPS) : JUSQU'À 6 g par jour.

• ULCÈRE DE L'ESTOMAC : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 JOURS AVEC D'AUTRES ANTIBIOTIQUES ET MÉDICAMENTS DESTINÉS À TRAITER LES ULCÈRES DE L'ESTOMAC.

• POUR PRÉVENIR LES INFECTIONS CARDIAQUES EN CAS DE CHIRURGIE. LA POSOLOGIE VARIE SELON LE TYPE DE CHIRURGIE. D'AUTRES MÉDICAMENTS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE ADMINISTRÉS SIMULTANÉMENT. VOTRE MÉDÉCIN, PHARMACIEN OU INFIRMIER/ÈRE POURRA VOUZ DONNER PLUS DE DÉTAILS.

• LA DOSE MAXIMALE RECOMMANDÉE EST DE 6 g par jour

Problèmes rénaux

SI VOUS SOUFREZ DE PROBLÈMES RÉNAUX, LA POSOLOGIE POURRA ÊTRE DIMINUÉE PAR RAPPORT À LA POSOLOGIE HABITUELLE.

Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?

• VOUS DEVEZ CONTINUER DE PRENDRE AXIMYCINE® AUSSI LONGTEMPS QUE VOTRE MÉDÉCIN VOUS L'PRECISIT, MÊME SI VOUS VOUS SENTEZ MIEUX. TOUTES LES DOSES SONT IMPORTANTES POUR COMBATTRE L'INFECTION. SI CERTAINES BACTÉRIES DEVAIENT SURVIVRE, ELLES POURRAIENT ÊTRE À L'ORIGINE D'UNE RÉAPPARITION DE L'INFECTION.

• UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FINI VOTRE TRAITEMENT, SI VOS SYMPTÔMES PERSISTENT, CONSULTEZ DE NOUVEAU LE MÉDÉCIN.

• DES MYCOSES (INFECTIONS À LEVURES APPARAISSANT SUR LES ZONES HUMIDES DU CORPS) PEUVENT CAUSER DES DOULEURS, DES DÉMANGEAISONS ET DES PARTES HUMIDES. AXIMYCINE® EST UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE. INFORMEZ-EN VOTRE MÉDÉCIN.

SI VOUS PRENEZ AXIMYCINE® PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, VOUS DEVEZ FAIRE DES ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOUS ASSURER QU'LE SANG FONCTIONNEMENT NORMALEMENT.

• SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES RÉNAUX, VOUS DEVEZ FAIRE DES ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOUS ASSURER QU'LE SANG FONCTIONNEMENT NORMALEMENT.