

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0046903

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **04 94**

Société : **MUPRAS**

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **BRIHOUN MINA**

Jeune EL MADI

Date de naissance : **20-12-48**

Adresse : **33 Rue AZaibak**

169117


Tél. : **06 74 36 86 36**

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : **20/07/2023**

Nom et prénom du malade : **BRIHOUN MINA**

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : **20/07/2023**

Signature de l'adhérent(e) :

MUPRAS

20/07/2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Relèvement des Actes
20.07.2023	C		250,00	Docteur Nabil NABIL NABIL CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE TRAUMATOLOGUE 511 BD AL ODDS RES AI ODDS California RDC Apt 1 Casablanca Tel 0522 52 52 10 INPE 091037200 Gsm 06 61 30 8 30

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Docteur Nabil NABIL NABIL Rue Annanis 52 Casablanca Tél 0522 52 52 10	20/07/23	4368,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Docteur Nabil NABIL NABIL CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE TRAUMATOLOGUE 511 BD AL ODDS RES AI ODDS California RDC Apt 1 Casablanca Tel 0522 52 52 10 INPE 091037200 Gsm 06 61 30 8 30	20.07.2023	Rx Genou Gauche FIP	200,00

AUXILIAIRES MEDICAUX







Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

20/07/2023

Casablanca, le

Mme BRIHOUM MINA

7480x3
SEPCEN COMPRIME 500 MG BOITE DE 10

1 le matin, 1 le soir après le repas pendant 15 jours

1480x30
SOX GELULE 200 MG BOITE DE 20

1 le matin, 1 le soir après le repas pendant 10 jours

1480
EFDOL COMPRIME

1 le matin, 1 le soir après le repas pendant 10 jours

5880
PRAZOL GELULE 20 MG BOITE DE 14

1 le matin avant le repas pendant 10 jours

1480
PROCHAIN RDV LE :

AE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

500 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg
imprimés pelliculés

D.C.I.: Ciprofloxacin

Veuillez lire

- Gardez ce
- Si vous av

DU VOTRE pha

- Ce médicament en cas de si
- Si l'un des dans cette r

- Que contient le document ?
 - 1. Qu'est-ce que le document ?
 - 2. Quelles sont les personnes concernées ?
 - 3. Comment le document a-t-il été produit ?
 - 4. Quels sont les éléments de l'information ?
 - 5. Comment l'information a-t-elle été organisée ?
 - 6. Informatif ou argumentatif ?

1. QU'EST-

Classe ph
SEPCEN®
La ciproflic
bactéries !
bactéries.
Chez l'ad
SEPCEN®

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

chez l'enfant et l'adolescent.

SEPCENO® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
 - Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
 - Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

- **Ne prenez jamais SEPCEN® :**
 - Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).
 - Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 - Prise d'autres médicaments).

- **Mise en garde et précaution d'emploi :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin qui alors n'a pas le droit de vous donner de telles médicaments.

Adresssez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

- Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
 - Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
 - Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que **SEPCEN®** ;
 - Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie ;
 - Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;
 - Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie ;
 - Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;
 - Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;
 - Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

maladie de Behçet, une maladie des artères. Si vous avez des problèmes né(e) avec ou sans l'ECG, qui est un électrolytique dans le sang), si vous êtes faibl (insuffisance cardiaque), ou une femme ou

halies au niveau
le traitement de
s antibiotique en
s 3 jours de traite

dant la prise de S...
renez immédiatement lez **SEPCEN**... V...
réaction allergique. La...
nière dose, il ex...
tifiez par les...
nourrissements, ou...
itez de prendre Si...
ffets indésirables...
ibactériens de typ...
es indésirables très rare...
ées), invalidants et...
muscles et les a...
sions anormales...
jourd'hui ou...
la vue, du goût, de...
sance et de troubles...
vous présentez l'u...
re médecin ayant...
re traitement en en...
tre douleur et en...
tre douleur et en...

— Je douleur et un g
endons peuvent surv
en), si vous avez eu
rairement par des co
premiers 48 heures
s les premiers sign
u poignet, du coude,
t mettez le membre

- ture d'un tendon. Si vous ressentez une douleur qui peut être douloureuse immédiatement au sein ou avec des corticoïsténoïdes. Si vous ressentez une douleur, ou si vous remarquez une nouvelle apparition de douleur, vous devez en informer votre médecin. Si vous souffrez d'épisodes d'accident vasculaire cérébral, produire. Si tel était votre cas. Dans de rares cas, la sensation de brûlure, peut survenir, en particulier lorsque vous prenez SEPCEN®. Il est potentiellement mortel. Des réactions psychotiques, y compris l'outrage de dépression, peuvent survenir avec SEPCEN®. Si cela se produit, arrêtez de prendre SEPCEN®. Les antibiotiques peuvent faire croître dans le sang un type de bactéries (pseudogangrénique) qui peut être mortel. Il est important à prendre SEPCEN® dans le sang doit être évitée. Vous pouvez souffrir de diarrhées plusieurs semaines après l'arrêt de SEPCEN®. Ces diarrhées, ou d'autres symptômes, peuvent immédiatement de prendre d'autres médicaments visant à les empêcher. Si vous avez des troubles digestifs immédiatement un ophtalmologiste. Votre peau devient rouge avec SEPCEN®. Evitez de prendre SEPCEN® avec les médicaments utilisés dans les yeux. Si vous devez subir une opération d'analyses de sang, arrêtez de prendre SEPCEN®. Si vous avez des symptômes d'entêtement, arrêtez de prendre SEPCEN®. SEPCEN® peut provoquer une perte d'appétit, ictere (jaune), et peut entraîner l'arrêt de prendre SEPCEN®. SEPCEN® peut entraîner une perte de

ME : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

500 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg
imprimés pelliculés

D.C.I.: Ciprofloxacin

Veuillez lire :

- Gardez ce
- Si vous av

DU VOTRE PHA

- Ce médicament en cas de si
- Si l'un des

dans cette

- Que contient le document ?
 - 1. Qu'est-ce que le document ?
 - 2. Quelles sont les personnes concernées ?
 - 3. Comment le document a-t-il été produit ?
 - 4. Quels sont les éléments de l'information ?
 - 5. Comment l'information a-t-elle été organisée ?
 - 6. Informatif ou argumentatif ?

1. QU'EST-

Classe ph
SEPCEN®
La ciprof
bactéries
bactéries.
Chez l'ad
SEPCEN®

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

chez l'enfant et l'adolescent. SERCENIC® est utilisé chez l'enfant

SEPCENO® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
 - Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
 - Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

- **Ne prenez jamais SEPCEN® :**
 - Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).
 - Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 - Prise d'autres médicaments).

• *Mise en garde et précaution d'emploi :*

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin qui alors n'a pas le droit de vous donner de telles médicaments.

Adresssez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

- Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
 - Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
 - Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que **SEPCEN®** ;
 - Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie ;
 - Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;
 - Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie ;
 - Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;
 - Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;
 - Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

maladie de Behçet, une maladie des articulations. Si vous avez des problèmes né(e) avec ou sans l'ECG, qui est un électrolytique dans le sang (dans le sang), si vous êtes faibl (insuffisance cardiaque), si vous êtes une femme ou naines au niveau

le traitement de l'antibiotique en 3 jours de traite-

dant la prise de S... renz: immédiate-
tez SEPCEN®. Vo-
laction allergique
trière dose, il ex-
presse par les
nourrissons,
itez de prendre S...
ffets indésirables
ibactériens de type
sirables très rare-
ées), invalidant
muscles et les a-
sations anormale-
gourdissement ou
la vue, du goût, de
anse et de troubles
vous présentez l'u-
re médicin avant
re traitement en en-
tre douleur et un

Une douleur et un gonflement peuvent survindre, si vous avez eu gratuitement par des coups les premières 48 heures après les premiers signes, du poignet, du coude, et mettez le membre

ME : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

500 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg
imprimés pelliculés

D.C.I.: Ciprofloxacin

Veuillez lire :

- Gardez ce
- Si vous av

OU votre pha

- Ce médici
- en cas de si
- Si l'un des
- dans cette

- Que contient le document ?
 1. Qu'est-ce que le document ?
 2. Quelles sont les personnes concernées ?
 3. Comment le document a-t-il été élaboré ?
 4. Quels sont les résultats ?
 5. Comment le document a-t-il été diffusé ?
 6. Informatif, réglementaire, réglementaire et réglementaire

1. QU'EST-

Classe ph
SEPCEN®
La ciprof
bactéries
bactéries.
Chez l'ad
SEPCEN®

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

chez l'enfant et l'adolescent.

SEPCENO® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
 - Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
 - Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

- **Ne prenez jamais SEPCEN® :**
 - Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).
 - Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 - Prise d'autres médicaments).

• *Mise en garde et précaution d'emploi :*

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin qui alors n'a

Adresssez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

- Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
 - Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
 - Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que **SEPCEN®** ;
 - Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie ;
 - Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;
 - Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie ;
 - Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;
 - Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;
 - Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

maladie de Behçet, une maladie des articulations. Si vous avez des problèmes né(e) avec ou sans l'ECG, qui est un électrolytique dans le sang (le sang), si vous êtes faibl (insuffisance cardiaque), une femme ou naines au repos.

le traitement de l'antibiotique en 3 jours de traite-

dant la prise de S... renz: immédiate-
tez SEPCEN®. Vo-
laction allergique
trière dose, il ex-
presse par les
nourrissons,
itez de prendre S...
ffets indésirables
ibactériens de type
ésirables très rare-
ées), invalidant
muscles et les a-
sations anormales
journissement ou
la vue, du goût, de
anse et de troubles
vous présentez l'u-
re médicin avant
re traitement en en-
tre douleur et un

Une douleur et un gonflement peuvent survindre, si vous avez eu gratuitement par des coups les premières 48 heures après les premiers signes, du poignet, du coude, et mettez le membre

ISOX® 100 mg et 200 mg

Gélules
Célecoxib

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

antes pour
z avoir be
interroger
ne faire
t, même
fet indé
t tout et
s effets

gélule e
re avant le

ISOX® 200 mg

Célecoxib
20 gélules

PROMOPHARM S.A.



6 118000 242444

100 mg et 200 mg, gélule ?

- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5. Comment conserver isox 100 mg et 200 mg, gélule ?
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que isox 100 mg et 200 mg, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?

Irox appartient à la classe des médicaments appelée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et plus spécifiquement au sous-groupe des cyclo-oxygénases-2 (COX-2) inhibiteurs. Votre corps produit des prostaglandines qui peuvent causer une douleur et une inflammation: Dans le cas de maladies telles que l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde, votre corps en produit plus. Isox agit en diminuant la production de prostaglandines et ainsi diminue la douleur et l'inflammation.

• Isox est utilisé chez l'adulte pour soulager les signes et symptômes de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.

Vous devez vous attendre à ce que le médicament commence à agir dans les heures qui suivent la première prise, mais il se peut qu'il faille quelques jours de traitement pour obtenir un effet complet.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre isox 100 mg et 200 mg, gélule ?

Irox vous a été prescrit par votre médecin. Les informations suivantes vous aideront à l'utiliser de façon optimale. Si vous avez d'autres questions, veuillez demander à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne prenez jamais isox 100 mg et 200 mg, gélule :

Informez votre médecin si vous êtes concerné par l'un des cas suivants car ceux-ci ne permettent pas d'utiliser Isox :

- Si vous êtes allergique au célecoxib ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés à la rubrique « Contenu de l'emballage et autres informations ».
- Antécédents d'allergie à la classe de médicaments appelée « sulfamides » (certains antibiotiques utilisés dans le traitement d'infections en font partie).
- Présence d'un ulcère ou d'une hémorragie au niveau de votre estomac ou de vos intestins.
- Antécédents d'asthme, de polypes dans le nez, de congestion nasale grave ou d'une réaction allergique avec éruption cutanée accompagnée de démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou du cou, des difficultés à respirer ou des râles, déclenchées par la prise d'acide acétylsalicylique ou d'un autre anti-inflammatoire utilisé contre la douleur (AINS).
- Grossesse. Si vous êtes susceptible d'être enceinte pendant votre traitement, vous devez discuter de mesures de contraception avec votre médecin.
- Allaitement.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Maladie inflammatoire des intestins telle qu'une rectocolite hémorragique ou une

maladie de Crohn.

- Insuffisance cardiaque, maladie ischémique du cœur avérée ou pathologie cérébrovasculaire, tels qu'un diagnostic de crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique transitoire (diminution temporaire du flux sanguin dans le cerveau).
- Poliurie ou une obstruction des vasaissaux

problèmes de circulation sanguine (maladie atherosclérosique), intervention chirurgicale des artères de vos

• pharmacien avant de prendre Isox, gélule, iorragile au niveau de votre estomac ou de vos intestins, qui (y compris à faible dose pour protéger vos artéfacts),

• pour diminuer la coagulation sanguine (par exemple warfarine ou les nouveaux anticoagulants)

• appelés corticostéroïdes (tels que la prednisolone), se fait en même temps que celle d'autres AINS, en

de l'acide acétylsalicylique, tels que l'ibuprofène ou le diclofénac. L'administration concomitante de ces médicaments doit être évitée.

• Tabagisme, diabète, hypertension ou cholestérol élevé; votre médecin pourra être amené à suivre de façon régulière.

• Rétention hydrique (cheveux et pieds gonflés), Déshydratation, par exemple suite à une maladie, des diarrhées ou la prise d'antidiététiques (utilisés dans le traitement des œdèmes).

• Antécédents de réaction allergique ou de réaction cutanée grave à des médicaments.

• Sensation de malaise suite à une infection ou lors d'une suspicion d'infection, masquer une fièvre ou d'autres signes d'infection ou d'inflammation.

• Âge supérieur à 65 ans ; votre médecin sera amené à vous surveiller de façon régulière.

• La consommation d'alcool et d'AINS peut augmenter le risque de problèmes intestinaux.

Comme avec les autres AINS (par exemple ibuprofène et diclofénac), ce médicament peut provoquer une augmentation de la tension artérielle ; c'est pourquoi votre médecin doit être amené à contrôler votre tension artérielle régulièrement.

Quelques cas de réactions hépatiques graves ont été rapportés avec le célecoxib, telles qu'une inflammation hépatique grave, une lésion hépatique, une insuffisance hépatique (certaines d'issue fatale ou nécessitant une greffe du foie). Dans les cas où le délai de survenue était rapporté, la plupart des réactions hépatiques sont apparues dans le mois suivant le début du traitement.

La prise de Isox rend plus difficile une grossesse. Vous devez informer votre pharmacien si vous souhaitez être enceinte ou si vous avez des problèmes pour être enceinte (grossesse, allaitement et fertilité).

Autres médicaments et Isox 100 mg et 200 mg, gélule

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou prendre tout autre médicament.

• Du dextrométhorphone (médicament antitussif),

• Des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), des antagonistes de l'angiotensine II, des bêta-bloquants et des diurétiques (utilisés pour traiter l'hypertension et l'insuffisance cardiaque),

• Du fluconazole ou de la rifampicine (médicament traitant les infections fongiques),

• De la warfarine ou d'autres médicaments de type warfarine (= antagréagine), qui diminuent la formation de caillots sanguins), dont les nouveaux médicaments l'apixaban,

• Du lithium (médicament utilisé dans le traitement de certains types de dépressions),

• D'autres médicaments utilisés pour traiter la dépression, les troubles du sommeil, l'hypertension artérielle ou un rythme cardiaque irrégulier,

• Des neuroleptiques (utilisés dans le traitement de certains troubles mentaux),

• Du méthotrexate (utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de

EFDOL® Caféiné

Paracétamol - Caféine

LOT : 399
PER : 04/26
PPV : 14,80 DH

الصيدلي نووفارما

Expiry Date : 04/26

Product of France

- A

Quantity : 20 comprimés

EFDOL® CAFÉINÉ 500 mg/50 mg

20 comprimés



6 118000 140252

- L'action du paracétamol est potentiée par la caféine.

INDICATIONS

• Traitement symptomatique des affections douloureuses :

- Céphalées, migraines.
- Douleurs rhumatismales : Arthralgies, sciatalgies, lumbagos.
- Douleurs musculo-tendineuses : Myalgies, crampes, torticolis, tendinites, tenosynovites.
- En traumatologie : Fractures, entorses, luxations, douleurs après traitement orthopédique.
- Névralgies : Faciales, dentaires, intercostales.
- Douleurs dentaires et de la sphère ORL.
- Dysménorrhées.

• Traitement d'appoint des affections fébriles :

- Etats grippaux.
- Fièvre, rhume.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer :

- En cas d'accidents allergiques antérieurs au paracétamol.
- En cas d'insuffisance hépatocellulaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter l'administration prolongée.

Les prises doivent être espacées de 4 heures au minimum. En cas d'insuffisance rénale sévère (la clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/mn), l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.

EFFETS INDESIRABLES

- Paracétamol : les réactions exceptionnelles d'allergie au paracétamol se manifestent par de simples rashes cutanés avec érythèmes ou urticaires nécessitant l'arrêt du traitement. Une thrombopénie peut être exceptionnellement constatée.
- Caféine : Possibilité d'excitation, d'insomnie et de palpitations.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

- Chez l'adulte : 1 à 6 comprimés par jour à répartir en 3 ou 4 prises.
- Chez l'enfant de 12 à 15 ans : 1 comprimé 1 à 3 fois par jour.



Laboratoires Novopharma

Prazol® 20 mg

oméprazole

Prazol® 20 mg

Oméprazole

14 gélules



6 118000 040644

de cette notice avant de prendre ce médicament.
avoir besoin de la relire.
vous avez un doute, demandez plus d'informations
en.
lement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un
identiques, cela pourrait lui être nocif.
it grave ou si vous remarquez un effet indésirable
lez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUANTITATIVE

20 mg

ie

PPV : 52DH80
PER : 12/24
LOT : L2469-2



S :

omac

• le
• les b
(ulcère gastrique).

• les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

• les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

• le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (réurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

• les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

• Maladie ulcéruse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

• Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

• Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :



Dr. Nabil HATTOUA

Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique - Diplômé d'Arthroscopie
(Strasbourg)

الدكتور نبيل هطومه

إخلاصي في علاج وجراحة أمراض العظام والمفاصل
جراحة المفاصل بالمنظار
(سترايسبرغ)

20/07/2023

Casablanca, le

Mme BRIHOUM MINA

COMPTE RENDU RADIOLOGIQUE

R X GENOU GAUCHE FACE ET PROFIL :

- CONTROLE RADIOLOGIQUE D UNE FRACTURE DE LA ROTULE GAUCHE
- MATERIEL DE SYNTHESE EN PLACE
- MINERALISATION OSSEUSE NORMALE

Docteur Nabil HATTOUA
CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE
TRAUMATOLOGUE
511 BD Al Qods RDC Apt 1 Casablanca
California Tél 0522 52 52 10 GSM 06 61 30 08 32
INPE 091037200

Dr. Nabil HATTOUA

Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique - Diplômé d'Arthroscopie
(Strasbourg)

الدكتور نبيل هطوفة

إخصاصي في علاج و جراحة أمراض العظام و المفاصل
جراحة المفاصل بالمنظار
(ستراسبورغ)

20/07/2023

Casablanca, le

FACTURE

Mme BRIHOUM MINA

<u>Actes</u>	<u>Code</u>	<u>Montant</u>
CONSULTATION	Cs	250
EXAMEN RADIOLOGIQUE	Z15	200

Total : 450 Dhs

Docteur Nabil HATTOUA
CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE
TRAUMATOLOGUE
511 BD Al Qods Res Al Qods
Californie RDC Apt 1 Casablanca
Tél 0522 52 52 10 GSM 06 39 36 17 79
INPE 091037200

INPE : 091037200
ICE : 001954589000014

IF : 15216167
TP : 302 / 2015

511 شارع القدس، حي حداائق القدس كاليفورنيا، الطابق السفلي، شقة رقم 1 (قابلة رونو داسيا) الدار البيضاء
511, Boulevard Al Qods, Résidence Jardins Al Qods Californie, RDC, Appartement N°1(en face Renault Dacia)
Casablanca - Tél. : 0522 52 52 10 - GSM : 06 39 36 17 79 - E-mail : n.hattouma@gmail.com