

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8327 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

EL KIHEL FOUNA

Date de naissance :

20/11/1968

Adresse :


MOHAMMED EL HAMIDI

Tél. 0661397285 Total des frais engagés :

Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 13/07/2023

Nom et prénom du malade : Dr. Maha ELKADIRI Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

MAOURASIT Neurol

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : Psych

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 24 JUIL 2023

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Relèvement des Actes
13/07/2020	12/20	13	300,-	 Dr. Maho EL KAFSHEH           Psychiatre           3 Avenue A. Ziane El Ghoul           10000           Mohammedia           0533 302120

## EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Rue de l'Orangerie, 246 Bis C.R. El Mansouria Ben Slimane Tel./Fax : +213 30 30 18 RC Mahdia/Media 5704 Pateau N° 3994 1500 ICE : 00416675000029	13/10/2023	453,30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

#### VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. Maha ELKADIRI**  
**Psychiatre – psychothérapeute**  
Spécialiste en :  
Psychiatrie de l'adulte  
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  
Addictologie  
Thérapie cognitivo-comportementale



الدكتورة مها القادري  
**طبيبة نفسانية**  
إختصاصية في:  
الطب النفسي للأطفال  
الطب النفسي للأطفال والراهقين  
معالجة الإدمان  
العلاج السلوكي المعرفي

Mohammed le ..... 13/07/2023.

MOUNA S T K. Elouam

83, fox 9

①

Deroxat 20 mg.

SV

2

Anxiol 6mg; 1le au bras (Cabit)

②

753, 30

in de

03 m/s

**Dr. Maha ELKADIRI!**  
Psychiatre - Psychothérapeute  
Rés. Rawiya, Immeuble A, 3ème Etg, Appart. 15  
Bd Abderrahman Serghini - Mohammedia  
Tél: 05 23 30 21 20



Résidence Rawiya, Immeuble A, 3<sup>ème</sup> étage  
Appt15, Bd Abderrahman Serghini  
Mohammedia

إقامة راوية، عمارة (أ) الطابق 3  
الشقة 15، سارع عبد الرحمن السرغيني  
المحمدية

Tél : 05 23 30 21 20 - Email : dr.elkadirimaha@gmail.com

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons ou médicaments peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner la survenue de nausées et de vomissements.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode: 6 118001 140237

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, vomissements, diarrhée et/ou douleurs abdominales.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode:   
6 118001 140237

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, vomissements, diarrhée et/ou douleurs abdominales.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode: 6 118001 140237

110

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, de vomissements, de diarrhée et de crampes.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode:   
6 118001 140237

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, de vomissements, de diarrhée et de crampes.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode: 6 118001 140237

110

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, de vomissements, de diarrhée et de crampes.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode:   
6 118001 140237

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, de vomissements, de diarrhée et de crampes.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode:   
6 118001 140237

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, vomissements, diarrhée et de faire perdre l'efficacité de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 61886  
Barcode:   
6 118001 140237

**Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent**, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Des patients traités par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique ou syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable lire ci-dessous la rubrique 4.

Les médicaments comme DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable (appelés ISRS) pourraient causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

**Autres médicaments et DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène))
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**
- le tramadol, la buprénorphine et la pthéidine, des médicaments **contre la douleur**
- la buprénorphine combinée à la naloxone, un médicament utilisé dans la **dépendance aux opioïdes**
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine
- un **complément alimentaire** appelé tryptophane
- mivacurium et suxaméthonium (utilisés en anesthésie)
- des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphénazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines **affectations psychiatriques**
- le fentanyl, utilisé en **anesthésie** ou pour traiter les **douleurs chroniques**
- l'association fosampénavir et ritonavir, utilisée pour le traitement de l'**infection à VIH**
- le millepertuis (une plante médicinale pour le traitement de la **dépression**)
- le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la carbamazépine utilisés pour traiter l'**épilepsie**
- l'atomoxétine, qui est utilisée dans les **troubles de l'attention avec hyperactivité**
- la procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la **maladie de Parkinson** ou d'autres tremblements
- la warfarine ou d'autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés pour **fluidifier le sang**
- la propafénone, la flécaïnide, médicaments utilisés dans les **troubles du rythme cardiaque** (arythmie)
- le métropolol, un bêta-bloquant pour traiter l'**hypertension** et d'autres **problèmes cardiaques**
- la pravastatine, utilisée pour traiter un **taux de cholestérol élevé**
- la rifampicine, utilisée pour traiter la **tuberculose** et la **lèpre**
- le linézolide, un **antibiotique**
- le tamoxifène, utilisé pour le **traitement du cancer du sein**.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou nourriez de prendre tout autre médicament.**

**Ne prenez pas DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments, des boissons contenant de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine pendant votre traitement par DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.** Ces aliments, boissons et boissons peuvent augmenter les symptômes ou les effets secondaires de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable. Cela peut entraîner le risque de nausées, vomissements, diarrhée et de faire perdre l'efficacité de DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 83,70 DH  
ID: 631886  
  
6 118001 140237