

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALQ :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

N° M21- 0010927

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 03418 Société : Royal Air Maroc  
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : Bennani Jamal N° 8999  
 Date de naissance : 13/07/1960  
 Adresse : 558, C.C.S., Ville Verte - Boukhaj - Ag  
 Tél. : 0661069808 Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Dr Bennani Jamal Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection psychiatrique


En cas d'accident préciser les causes et circonstances : / pds

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/07/23	1451,40

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>H</b>  25533412 21433552  00000000 00000000  <b>D</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>G</b>  00000000 00000000  35533411 11433553  <b>B</b> </div> </div> <p><b>[Création, remont, adjonction]</b>  Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Khadija DEROU

Psychiatre - Psychothérapeute

Thérapie cognitivo - comportementale

Addictologie

Gérontopsychiatrie

Gestion de stress



المختصة في معالجة الإدمان

طبيبة اختصاصية في الأمراض النفسية

العلاج السلوكي المعرفي

علاج الإدمان

الطب النفسي للمسنين

تدبير الأزمات

Date : 10/07/2023

## ORDONNANCE

M. Bennani Jamal

56.60 x 7

1) Stilnox 1/2 k soir

110.60 x 5

2) Serenam 100 1/2 k soir

110.60 x 3

3) Polyzar 100 1/2 k soir

16 soir à l'entretien

Traitement de 03 Ans

إقامة ستي 77 زنقة فرحات حشاد لطابق 1 شقة 18 - حي مرس السلطان - الدار البيضاء

Résidence City 77, rue Farhat hachad, 1er étage APP 18 Quartier mers sultan - Casablanca

Tél: 0522 22 10 67 - 0662 02 92 60 - Email: dr.derouikhadija@gmail.com



© le Niais et l'ennemi  
du bien s.

157,40

157,40

157,40

110,60

PPV

LOT

PER

110,60

PPV

LOT

PER

110,60

PPV

LOT

PER

110,60

PPV

LOT

PER



- Pour diminuer ces risques, il est conseillé en une seule prise immédiatement au motif rubrique 3, « COMMENT PRENDRE STILNOX pelliculé sécable ? »), de se mettre dans les conditions favorables pour une durée de sommeil initiale.



118000 061465

heures et ne pas prendre une autre dose de Réactions contraires à l'effet recherché, sont comportements inhabituels pendant le som-

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation,

croissée, supprime ou irritable, tension, modifications de la conscience, voire des comportements potentiellement dangereux (avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement libéré). Le lendemain matin, vous pouvez ne pas vous souvenir d'actes durant la nuit.

présenter l'une des situations ci-dessus, arrêtez immédiatement le traitement avec STILNOX 10 mg, comprimé et contactez votre médecin ou votre pharmacien. Les troubles du sommeil peuvent vous exposer, vous ou vos proches, à un risque grave de blessure.

Ne prendre d'autres médicaments qui rendent l'absorption de l'INNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable possible. Le survenue de ces comportements du

apparentes doivent être utilisés en raison du risque de somnolence, qui peuvent favoriser les chutes, graves dans cette population.

patiques sévères imprimée pelliculé scabable si vous sévère car cela peut entraîner un du cerveau (encéphalopathie).

peut à lui seul résoudre les  
convient de demander conseil à  
des conduites pouvant favoriser le

te un suivi médical renforcé  
onique du foie, d'alcoolisme et  
trouble, physique ou

En cas de persistance ou d'aggravation de l'insomnie après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou aggravation du risque suicidaire.

Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

provoquer des réac

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule scabée avec les traitements suivants, cela peut augmenter la somnolence, les difficultés à coordonner certains mouvements le lendemain de la prise et une diminution de la capacité à conduire un véhicule et utiliser une machine :

- médicament utilisé pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement (antipsychotiques),

- médicament utilisé pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques),
- médicament utilisé pour calmer ou réduire l'anxiété,
- médicament utilisé dans la dépression,
- traitement des douleurs modérées à sévères (analgésiques narcotiques),
- antiepileptiques,
- anesthésiques,
- médicaments utilisés pour traiter les rhinites allergiques ou toute autre allergie et pouvant vous faire dormir (antihistaminiques sédatifs).

Si vous prenez du STILNIX 10 mg, comprimé pellicule sécable en association avec des antidépresseurs comme le bupropion, la fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine, vous pouvez voir, entendre ou sentir des choses qui n'existent pas (hallucination). Il est déconseillé de prendre du STILNIX 10 mg, comprimé pellicule sécable avec la fluvoxamine, la ciprofloxacine et/ou le miltérfine.

L'utilisation concomitante du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule scélable et d'opioïdes (analgésiques puissants, médicaments de substitution et certains médicaments contre la toux) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut mettre votre vie en danger. Pour cette raison, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que lorsque d'autres traitements ne sont pas possibles.

Toutefois, si votre médecin vous prescrit STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable en même temps que des opioïdes, la posologie et la durée du traitement concomitant doivent être



- vous prenez une dose supérieure à la t
- vous prenez du zolpidem alors que voi
- médicament sédatif ou qui augmente la
- mg, comprimé pelliculé sécable dans le 9
- boissons alcoolisées ou des médicaments
- des substances illicites.

Pour diminuer ces risques, il est conseillé en une seule prise immédiatement au motif rubrique 3. « COMMENT PRENDRE STILNOX pellicule sécable ? »), de se mettre dans les conditions pour une durée de sommeil initia-

comportements inhabituels pendant le sommeil

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation,

nerveuse, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de conscience, voire des comportements potentiellement dangereux, agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).

TILNIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable peut provoquer du somnambulisme ou d'autres comportements inhabituels en permanence (comme conduire, manger, passer un appel téléphonique) sans être complètement conscient de ce qu'il fait. Évitez d'avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement conscient de ce qu'il fait. Le lendemain matin, vous pouvez ne pas vous souvenir d'avoir fait ces choses pendant la nuit.

présenter l'une des situations ci-dessus, arrêtez immédiatement le traitement avec STILNOX 10 mg, comprimé et contactez votre médecin ou votre pharmacien. Les troubles du sommeil peuvent vous exposer, vous ou vos proches, à un risque grave de blessure.

ne prendre d'autres médicaments qui rendent l'absorption de l'INNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable peut être perturbée. La surveillance de ces comportements du

apparentes doivent être utilisés en raison du risque de somnolence qui peuvent favoriser les chutes, graves dans cette population.

patiques sévères imprimée pelliculé scétable si vous sévère car cela peut entraîner un du cerveau (encéphalopathie).

peut à lui seul résoudre les  
convient de demander conseil à  
des conduites pouvant favoriser le

te un suivi médical renforcé  
onique du foie, d'alcoolisme et  
trouble, physique ou

psychiatrique.

En cas de persistance ou d'aggravation de l'insomnie après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou aggravation du risque suicidaire.

Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

Autres médicaments et STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Si vous prenez du STILNOX 10 mg, complétez pellicule scabie avec les traitements suivants, cela peut augmenter la somnolence, les difficultés à coordonner certains mouvements le lendemain de la prise et une diminution de la capacité à conduire un véhicule et utiliser une machine :

- médicament utilisé pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement (antipsychotiques),
- médicament utilisé pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques)

- médicamente utilisé pour calmer ou réduire l'anxiété.

- médicament utilisé dans la dépression,

- traitement des douleurs modérées à sévères (analgésiques narcotiques).

- antiepileptiques.

- anesthésiques.

- médicaments utilisés pour traiter les rhinites allergiques ou toute autre allergie et pouvant vous faire dormir

(antihistaminiques sédatifs). Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable en association avec des antidépresseurs comme le bupropion, la fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine, vous pouvez voir, entendre ou sentir des choses qui n'existent pas (hallucinations). Il est déconseillé de prendre du STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable avec la fluvoxamine, la ciprofloxacine et/ou le citalopram.

L'utilisation concomitante du STILNIX 10 mg, comprimé pellicule scélable et d'opioïdes (analgésiques puissants, médicaments de substitution et certains médicaments contre la toux) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut mettre votre vie en danger. Pour cette raison, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que lorsque d'autres traitements ne sont pas possibles.

Toutefois, si votre médecin vous prescrit STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable en même temps que des opioïdes, la posologie et la durée du traitement concomitant doivent être





- vous prenez une dose supérieure à la t
- vous prenez du zolpidem alors que vo

médicament sédatif ou qui augmente la  
mg, comprimé pelliculé sécable dans le s  
boissons alcoolisées ou des médicaments  
des substances illicites.

Pour diminuer ces risques, il est conseillé en une seule prise immédiatement au motif rubrique 3, « COMMENT PRENDRE STILNOX pelliculé sécable ? »), de se mettre dans les conditions favorables pour une durée de sommeil initiale.

heures et ne pas prendre une autre dose de Réactions contraires à l'effet recherché, sont comportements inhabituels pendant le son-

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation,

nerveuse, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de conscience, voire des comportements potentiellement dangereux, agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).

TILNIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable peut provoquer du somnambulisme ou d'autres comportements inhabituels en permanence (comme conduire, manger, passer un appel téléphonique) sans être complètement conscient de ce qu'il fait. Évitez d'avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement conscient de ce qu'il fait. Le lendemain matin, vous pouvez ne pas vous souvenir de ce que vous avez fait la nuit précédente.

présenter l'une des situations ci-dessus, arrêtez immédiatement le traitement avec STILNOX 10 mg, comprimé et contactez votre médecin ou votre pharmacien. Les troubles du sommeil peuvent vous exposer, vous ou vos proches, à un risque grave de blessure.

ne prendre d'autres médicaments qui rendent

apparentes doivent être utilisés en raison du risque de somnolence, qui peuvent favoriser les chutes, graves dans cette population.

patiques sévères  
nprimé pelliculé scétable si vous  
sévère car cela peut entraîner un  
du cerveau (encéphalopathie).

peut à lui seul résoudre les  
convient de demander conseil à  
des conduites pouvant favoriser le

te un suivi médical renforcé  
onique du foie, d'alcoolisme et  
trouble, physique ou

psychiatrique.

En cas de persistance ou d'aggravation de l'insomnie après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou aggravation du risque suicidaire.

Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

Autres médicaments et STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule scabée avec les traitements suivants, cela peut augmenter la somnolence, les difficultés à coordonner certains mouvements le lendemain de la prise et une diminution de la capacité à conduire un véhicule et utiliser une machine :

- médicament utilisé pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement (antipsychotiques),
- médicament utilisé pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques)

- médicament utilisé pour calmer ou réduire l'anxiété.

- médicament utilisé dans la dépression,

- traitement des douleurs modérées à sévères (analgésiques narcotiques).

- antiepileptiques.

- anesthésiques.

- médicaments utilisés pour traiter les rhinites allergiques ou toute autre allergie et pouvant vous faire dormir

(antihistaminiques sédatifs). Si vous prenez du STILUX 10 mg, comprimé pelliculé sécable en association avec des antidépresseurs comme le bupropion, la fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine, vous pouvez voir, tout ou partie des choses qui n'existent pas (hallucinations). Il est déconseillé de prendre du STILUX 10 mg, comprimé pelliculé sécable avec la fluvoxamine, la ciprofloxacine et/ou le paracétamol.

L'utilisation concomitante du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule scélable et d'opioïdes (analgésiques puissants, médicaments de substitution et certains médicaments contre la toux) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut mettre votre vie en danger. Pour cette raison, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que lorsque d'autres traitements ne sont pas possibles.

Toutefois, si votre médecin vous prescrit STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable en même temps que des opioïdes, la posologie et la durée du traitement concomitant doivent être



- vous prenez une dose supérieure à la t
- vous prenez du zolpidem alors que voi
- médicament sédatif ou qui augmente la
- mg, comprimé pelliculé sécable dans le s
- boissons alcoolisées ou des médicaments
- des substances illicites.

Pour diminuer ces risques, il est conseillé en une seule prise immédiatement au motif rubrique 3, « COMMENT PRENDRE STILNOX pelliculé sécable ? »), de se mettre dans les conditions favorables pour une durée de sommeil initiale.

heures et ne pas prendre une autre dose de Réactions contraires à l'effet recherché, sont comportements inhabituels pendant le som-

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation,

nerveuse, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de conscience, voire des comportements potentiellement dangereux, agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).

TILNIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable peut provoquer du somnambulisme ou d'autres comportements inhabituels en permanence (comme conduire, manger, passer un appel téléphonique) sans être complètement conscient de ce qu'il fait. Évitez d'avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement conscient de ce qu'il fait. Le lendemain matin, vous pouvez ne pas vous souvenir de ce qu'il a fait pendant la nuit.

présenter l'une des situations ci-dessus, arrêtez immédiatement le traitement avec STILNOX 10 mg, comprimé et contactez votre médecin ou votre pharmacien. Les troubles du sommeil peuvent vous exposer, vous ou vos proches, à un risque grave de blessure.

ne prendre d'autres médicaments qui rendent

apparentes doivent être utilisés en raison du risque de somnolence, qui peuvent favoriser les chutes, graves dans cette population.

préimprimé pelliculé scéable si vous  
sévère car cela peut entraîner un  
du cerveau (encéphalopathie).

peut à lui seul résoudre les  
convient de demander conseil à  
des conduites pouvant favoriser le

te un suivi médical renforcé  
onique du foie, d'alcoolisme et  
trouble, physique ou

psychiatrique.

En cas de persistance ou d'aggravation de l'insomnie après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou aggravation du risque suicidaire.

Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

Autres médicaments et STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre tout autre médicament. Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule scabée avec les traitements suivants, cela peut augmenter la somnolence, les difficultés à coordonner certains mouvements le lendemain de la prise et une diminution de la capacité à conduire un véhicule et utiliser une machine :

- médicament utilisé pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement (antipsychotiques),
- médicament utilisé pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques)

- médicament utilisé pour calmer ou réduire l'anxiété.

- médicament utilisé dans la dépression,

- traitement des douleurs modérées à sévères (analgésiques narcotiques).

- antiepileptiques.

- anesthésiques.

- médicaments utilisés pour traiter les rhinites allergiques ou toute autre allergie et pouvant vous faire dormir

(antihistaminiques sédatifs). Si vous prenez du STILUXO 10 mg, comprimé pelliculé sécable en association avec des antidépresseurs comme le bupropion, la fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine, vous pouvez voir, éventuellement, des choses qui n'existent pas (hallucination). Il est conseillé de prendre du STILUXO 10 mg, comprimé pelliculé sécable avec la fluvoxamine, la ciprofloxacine et/ou le pivampicétil.

L'utilisation concomitante du STILNIX 10 mg, comprimé pellicule sciable et d'opioïdes (analgésiques puissants, médicaments de substitution et certains médicaments contre la toux) augmente le risque de comorbidité, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut mettre votre vie en danger. Pour cette raison, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que lorsque d'autres traitements ne sont pas possibles.

Toutefois, si votre médecin vous prescrit STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable en même temps que des opioïdes, la posologie et la durée du traitement concomitant doivent être





- Pour diminuer ces risques, il est conseillé en une seule prise immédiatement au motif rubrique 3, « COMMENT PRENDRE STILNOX pelliculé sécable ? »), de se mettre dans les conditions favorables pour une durée de sommeil initiale.



118000 061465

heures et ne pas prendre une autre dose de Réactions contraires à l'effet recherché, sont comportements inhabituels pendant le som-

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation,

croissée, supprime ou irrite la tension, modifications de la respiration, voire des comportements potentiellement dangereux (avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement libéré. Le lendemain matin, vous pouvez ne pas vous souvenir d'actes durant la nuit.

présenter l'une des situations ci-dessus, arrêtez immédiatement le traitement avec STILNOX 10 mg, comprimé et contactez votre médecin ou votre pharmacien. Les troubles du sommeil peuvent vous exposer, vous ou vos proches, à un risque grave de blessure.

Ne prendre d'autres médicaments qui rendent l'effet de l'INNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable peut survenir de ces comportements du

apparentes doivent être utilisés en raison du risque de somnolence qui peuvent favoriser les chutes, graves dans cette population.

matiques sévères imprimé pelliculé scabable si vous sévère car cela peut entraîner un du cerveau (encéphalopathie).

peut à lui seul résoudre les  
convient de demander conseil à  
les conduites pouvant favoriser le

te un suivi médical renforcé  
onique du foie, d'alcoolisme et  
trouble, physique ou

En cas de persistance ou d'aggravation de l'insomnie après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou aggravation du risque suicidaire.

Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

provoquer des réac

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre tout autre médicament. Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule scabée avec les traitements suivants, cela peut augmenter la somnolence, les difficultés à coordonner certains mouvements le lendemain de la prise et une diminution de la capacité à conduire un véhicule et utiliser une machine :

- médicament utilisé pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement (antipsychotiques),

- médicament utilisé pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques),
- médicament utilisé pour calmer ou réduire l'anxiété,
- médicament utilisé dans la dépression,
- traitement des douleurs modérées à sévères (analgésiques narcotiques),
- antiepileptiques,
- anesthésiques,
- médicaments utilisés pour traiter les rhinites allergiques ou toute autre allergie et pouvant vous faire dormir (antihistaminiques sédatifs).

Si vous prenez du STILNIX 10 mg, comprimé pellicule sécable en association avec des antidépresseurs comme le bupropion, la fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine, vous pouvez voir, entendre ou sentir des choses qui n'existent pas (hallucinations). Il est déconseillé de prendre du STILNIX 10 mg, comprimé pellicule sécable avec la fluvoxamine, la ciprofloxacine et/ou le miltérfenitine.

L'utilisation concomitante du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule scélable et d'opioïdes (analgésiques puissants, médicaments de substitution et certains médicaments contre la toux) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut mettre votre vie en danger. Pour cette raison, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que lorsque d'autres traitements ne sont pas possibles.

Toutefois, si votre médecin vous prescrit STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable en même temps que des opioïdes, la posologie et la durée du traitement concomitant doivent être



0

STILNOX 10MG  
CP PEL SEC B20

P.P.V. : 56DH60



118000 061465

nt

- vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée ;
- vous prenez du zolpidem alors que vous prenez un autre médicament qui agit sur le système nerveux central, comme un médicament sédatif ou qui augmente la sécrétion de l'alcool ;
- vous prenez du zolpidem avec de l'alcool, des boissons alcoolisées ou des médicaments des substances illicites.

Pour diminuer ces risques, il est conseillé en une seule prise immédiatement au moment du coucher de prendre une seule capsule de STILNOX (10 mg, comprimé pellicule sécable 7/9), de se mettre dans les conditions les plus favorables pour une durée de sommeil irréversible et ne pas prendre une autre dose de zolpidem avant d'avoir dormi suffisamment.

**Reactions contraires à l'effet recherché, sous réserve de l'absence de contre-indication :**

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de la conscience, voire des comportements potentiellement dangereux (agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).  
STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer du somnambulisme ou d'autres comportements inhabituels en prenant (comme conduire, manger, passer un appel téléphonique, avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement réveillé. Le lendemain matin, vous pouvez ne pas vous souvenir de ces actes durant la nuit.

Prévenez l'usage de ce médicament dans les situations ci-dessus, en évitant le traitement avec STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable et contactez votre médecin ou votre pharmacien en cas de troubles du sommeil peuvent vous exposer, vous ou vos proches, à un risque grave de blessure.

STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer des effets indésirables, à un risque grave de blessure.

STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer des effets indésirables, à un risque grave de blessure.

STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer des effets indésirables, à un risque grave de blessure.

STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer des effets indésirables, à un risque grave de blessure.

STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer des effets indésirables, à un risque grave de blessure.

STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer des effets indésirables, à un risque grave de blessure.

psychiatrique.

En cas de persistance ou d'aggravation de l'insomnie après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou aggravation du risque suicidaire.

Certains études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou si peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

**Autres médicaments et STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable avec les traitements suivants, cela peut augmenter la somnolence, les difficultés à coordonner certains mouvements le lendemain de la prise et une diminution de la capacité à conduire un véhicule et utiliser une machine :

- médicament utilisé pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement (antipsychotiques),
- médicament utilisé pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques),
- médicament utilisé pour calmer ou réduire l'anxiété,
- médicament utilisé dans la dépression,
- traitement des douleurs modérées à sévères (analgésiques narcotiques),
- antiepileptiques,
- anesthésiques,
- médicaments utilisés pour traiter les rhinites allergiques ou toute autre allergie et pouvant vous faire dormir (antihistaminiques sédatifs).

Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable en association avec des antidépresseurs comme le bupropion, la fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine, vous pouvez voir, entendre ou sentir des choses qui n'existent pas (hallucinations). Il est déconseillé de prendre du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable avec la fluvoxamine, la ciprofloxacine et/ou le milnacipran.

L'utilisation concomitante du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable et d'opioïdes (analgésiques puissants, médicaments de substitution et certains médicaments contre la toux) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut mettre votre vie en danger. Pour cette raison, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que lorsque d'autres traitements ne sont pas possibles.

Toutefois, si votre médecin vous prescrit STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable en même temps que des opioïdes, la posologie et la durée du traitement concomitant doivent être





0

STILNOX 10mg  
CP PEL SEC B20

P.P.V. : 56DH60



118000 061465

nt

• vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée ;  
• vous prenez du zolpidem alors que vous prenez un médicament sédatif ou qui augmente la sédation ;  
• vous prenez du zolpidem avec des boissons alcoolisées ou des médicaments des substances illicites.  
Pour diminuer ces risques, il est conseillé en une seule prise immédiatement au moment du coucher de prendre une dose de STILNOX (10 mg, comprimé pellicule sécable 7 n), de se mettre dans les conditions les plus favorables pour une durée de sommeil ininterrompue et ne pas prendre une autre dose de zolpidem avant d'être complètement réveillé.  
**Reactions contraires à l'effet recherché, sous réserve de l'absence de contre-indications.**  
Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de la personnalité, voire des comportements potentiellement dangereux (agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).

**STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable peut provoquer du somnolence, voire des comportements inhabituels en conduisant un véhicule (comme conduire, manger, passer un appel téléphonique, avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement réveillé. Le lendemain matin, vous pouvez ne pas vous souvenir de ces actes durant la nuit.**  
Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez l'une des situations ci-dessus, car elles peuvent compromettre le traitement avec STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable et contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez des troubles du sommeil peuvent vous exposer, vous ou vos proches, à un risque grave de blessure.

Si vous prenez d'autres médicaments qui rendent le sommeil plus difficile, il est conseillé de prendre d'abord STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable, puis d'autres médicaments. Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable. Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable.

Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable. Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable.

Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable. Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable.

Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable. Si vous présentez des troubles du sommeil, il est conseillé de prendre d'abord d'autres médicaments, puis STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable.

psychiatrique.

En cas de persistance ou d'aggravation de l'insomnie après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il pourrait aggraver la dépression. Evoluer pour son propre compte avec persistance ou majoration du risque suicidaire.

Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou si peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

**Autres médicaments et STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable avec les traitements suivants, cela peut augmenter la somnolence, les difficultés à coordonner certains mouvements le lendemain de la prise et une diminution de la capacité à conduire un véhicule et utiliser une machine :

- médicament utilisé pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement (antipsychotiques),
- médicament utilisé pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques),
- médicament utilisé pour calmer ou réduire l'anxiété,
- médicament utilisé dans la dépression,
- traitement des douleurs modérées à sévères (analgésiques narcotiques),
- antiepileptiques,
- anesthésiques,
- médicaments utilisés pour traiter les rhinites allergiques ou toute autre allergie et pouvant vous faire dormir (antihistaminiques sédatifs).

Si vous prenez du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable en association avec des antidépresseurs comme le bupropion, la fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine, vous pouvez voir, entendre ou sentir des choses qui n'existent pas (hallucinations). Il est déconseillé de prendre du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable avec la fluvoxamine, la ciprofloxacine et/ou le milnacipran.

L'utilisation concomitante du STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable et d'opioïdes (analgésiques puissants, médicaments de substitution et certains médicaments contre la toux) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut mettre votre vie en danger. Pour cette raison, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que lorsque d'autres traitements ne sont pas possibles.

Toutefois, si votre médecin vous prescrit STILNOX 10 mg, comprimé pellicule sécable en même temps que des opioïdes, la posologie et la durée du traitement concomitant doivent être