

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8790 Société : RAO

Actif Pensionné(e) Autre : Retraité

Nom & Prénom : YOUSSEF ELAYI Abderrahman

Date de naissance : 01-01-1948

Adresse : HAY RAJAEI Rue 01 n°18 Casab

0667470773 Tél. : 05 29 96 02 01 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Rachid SAIR

MEDECIN

73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage
(en dessus BMCE) Bournazel - Casablanca
Tél : 05 22 72 42 42

Date de consultation : 21 Juil 2023

Nom et prénom du malade : YOUSSEF ELAYI Abderrahman Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : ORTHOPÉDIQUE + PARALYSE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casab Le 24/07/2024

Signature de l'adhérent(e) :

Cyber



ACCUEIL A

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21 Juil 2023	ECG	2	200 Dh	Dr. Rachid SAIR MEDECIN 73, Av. Colonel Aïcha El Alim 1er étage (en dessus BMO) Bournazel - Casablanca Téléphone: 72-89-42-00
24 Juil 2023		2	500 Dh	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
SOCIETE PHARMACEUTIQUE 24546	2020-07-23	99,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
00283 PHARMACEUTIQUE AQUATIQUE Hay... Bourne...	02.07.23	8110	131,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 B 11433553		Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS		VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION		

Dr . Rachid SAIR
MEDECIN



الدكتور رشيد ساير
طبيب

- Diplôme universitaire de Diabetologie
- université Montpellier France
- Diplôme en soins avancés en cardiologie
- université de montréal-Canada
- Licencié du Conseil Médical du Canada (LCMC)
- Echographie -ECG

- دبلوم جامعي في أمراض السكري
- جامعة مونبولي - فرنسا
- دبلومرعاية صحية متقدمة لأمراض القلب
- جامعة مونتريال - كندا
- إرتفاع الضغط الدموي - أمراض القلب والشرايين
- طبيب مجاز من طرف المجلس الطبي الكندي
- الفحص بالصدى - التخطيط الكهربائي للقلب

casablanca le : 21 Juil 2023 الدار البيضاء في :

Novembre - Dernier

86,400
Dolal 290
0 - 1 - 000
0 Coldi 2
2 esp 2
99,800

PHARMACIE AL JAWDA
AAOUATIF Kamal
Hay Raja 1, Rue 6 N°1 Bournazel
Casablanca Tel: 0522 72 70 55

Dr. Rachid SAIR
MEDECIN
73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage
(en dessus BMCE) Bournazel - Casablanca
Tél : 05 40 13 12 91 / 05 22 72 42 42

COLCHICINE OPACALCIUM 1mg, comprimé sécable, boite de 20

(Colchicine cristallisée)

MISE EN GARDE SPECIALES

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
3. Comment prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Colchicine Opocalcium 1 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIGOUTTEUX, Anti-inflammatoire. code ATC : M04AC01

Ce médicament est préconisé dans :

- Le traitement et la prévention des crises de goutte,
- La maladie périodique,
- La maladie de Behcet,
- Autres accès aigus microcristallins.
- Traitement de la péricardite aiguë idiopathique en association aux traitements anti-inflammatoires classiques au cours d'un premier épisode de péricardite ou d'une récidive.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie rénale grave (défaillance du fonctionnement du rein),
- Si vous avez une maladie grave du foie (défaillance du fonctionnement du foie),
- Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine).
- Si vous êtes enceinte (dans l'indication péricardite).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir rubrique «Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable») est contre-indiquée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez

Ce médicament ne doit pas être pris en même temps que

de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine).

Si vous prenez l'un de ces médicaments, vous ne devez

votre médecin ou votre pharmacien.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable avec

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

En cas de péricardite survenant au cours de la grossesse, la colchicine

Dans les autres indications, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,

grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable contient du lactose et du saccharose

avec les AINS.

Planifiez une

conseil avec

arlez-en à

DOLICOX®

60 mg

90 mg

120 mg

Comprimé pelliculé

Etoricoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

60mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib..... 60 mg

90mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib..... 90 mg

120mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib..... 120 mg

Excipient à effet notoire : Lactose monohydrate.

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

DOLICOX® 60 mg 90mg et 120mg, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

La classe pharmacothérapeutique : anti-inflammatoires anti-humatoiaux, non stéroïdiens, coixis.

Indications thérapeutiques :

DOLICOX® 60mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints d'arthrose.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire.

DOLICOX® 120 mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de goutte.

Posologie :

Tous les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, ne doivent être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Ne pas dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

Arthrose

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Patients avec problèmes hépatiques.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

Douleur aiguë

L'etoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

En cas d'insuffisance hépatique légère (maladie du foie), vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg **un jour sur deux**, ou de 30 mg par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

Le ou les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours **ou au dehors des repas**.

Durée du traitement

Ne prenez jamais DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Allergie (hypersensibilité) à l'etoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg.
- Allergie aux anti-inflammatoires non inhibiteurs sélectifs de la COX-2.
- Ulcère de l'estomac évolué ou saign.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Grossesse et allaitement ou pré- allaitement.
- Enfants et adolescents de moins de

- Maladie inflammatoire de l'intestin, telle que colite,

- Diagnostic de maladie cardiaque à type d'angine de poitrine, antécédents de crise d'artères périphériques, ou toute sorte d'accident ischémique transitoire. L'etoricoxib pourrait entraîner une maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, si utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques.

- Hypertension artérielle non contrôlée par votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que votre

Si vous pensez que l'un des ces points vous concerne, veuillez consulter votre pharmacien ou votre médecin.

Effets indésirables :

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne sont pas tous connus.

Si vous présentez un de ces symptômes, voici ce que faire :

60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé

- Apparition ou aggravation d'un essoufflement, de

cheveilles,

- Coloration jaune de la peau et des yeux (jaunisse),

troubles hépatiques,

- Douleur d'estomac importante qui permane,

- Réaction allergique pouvant inclure des pro-

ou de vésicules, ou gonflement du visage, de

entraîner une difficulté à respirer.

La fréquence des effets indésirables possibles suivante :

Très fréquents (survenant chez plus de 1 patient sur 10)

Fréquents (survenant chez 1 à 10 patients sur 100)

Rares (survenant chez 1 à 10 patients sur 100)

Très rares (survenant chez moins de 1 patient sur 100)

Les effets indésirables suivants peuvent survenir avec 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé.

Très fréquents : Douleur à l'estomac.

Fréquents :

- Alvéolite, Gonflement des jambes et/ou des

- Étouffissemens, maux de tête; Palpitations,

pression artérielle; Sifflements ou difficultés respi-

brûlures d'estomac, diarrhée, indigestion,

inflammation de l'œsophage, ulcérations

sanguins évaluant le fonctionnement du foie,

pseudo-grippal.

Peu fréquents :

- Gastro-entérite, infection des voies respiratoires

nombre de globules rouges, diminution du

plaquettes, hypersensibilité, augmentation

anxiété, dépression, diminution du discernement

n'existent pas, altération du goût, insomnie,

somnolence, vision trouble, irritation et rougeur

anomalie du rythme cardiaque, fréquence

sensation d'oppression, de pression ou de po-

de chaleur, accident vasculaire cérébral,

artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins,

ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac, inflammation

grave et/ou jusqu'à l'hémorragie, syndrome

gonflement du visage, éruption cutanée

crampes/ spasme musculaire, douleur musculo-

osseuse, modification des examens sanguins ou

troubles rénaux graves, douleur thoracique.

Peu fréquents pour DOLICOX® 120mg :

- voies respiratoires hautes, Ulcérations de la b-

Rares

- Angio-oedème (réaction allergique sévère q-

Confusion, agitation; Problèmes hépatiques;

insuffisance hépatique, jaunissement de la pe-

Diminution du taux de sodium dans le sang,

Très rares pour DOLICOX® 120mg, (surven-

Reactions allergiques (qui peuvent être soffissantes

ou graves) Sifflements respiratoires ou

inflammation de la poitrine ou l'estomac ou ulcère

jusqu'à l'hémorragie, troubles hépatiques, trou-

bles de la peau, confusion, voix, respiration

difficile, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin, ma-

la bouche, ulc

Dr . Rachid SAIR
MEDECIN



الدكتور رشيد ساير

طبيب


- Diplôme universitaire de Diabetologie
- université Montpellier France
- Diplôme en soins avancés en cardiologie
- université de montréal-Canada
- Licencié du Conseil Médical du Canada (LCMC)
- Echographie -ECG

- دبلوم جامعي في أمراض السكري
- جامعة مونبولي - فرنسا
- دبلوم رعاية صحية متقدمة لأمراض القلب
- جامعة مونتريال - كندا
- إرتفاع الضغط الدموي - أمراض القلب والشرايين
- طبيب مجاز من طرف المجلس الطبي الكندي
- الفحص بالصدى - التنحيط الكهربائي للقلب

24 Juil 2023

casablanca le : الدار البيضاء في :

نوارس بورنازيل



PHARMACIE AL JAWDA
 AQUATIF Kamal
 Hay Raja 1, Rue 6 N°1 Bournazel
 Casablanca : Tél: 0522 72 70 63

73, شارع العقيد العلام - الطريق الأول (فوق بنك BMCE) - بورنازيل - البيضاء - الهاتف : 05 40 13 12 91 / 05 22 72 42 42
 73, AV Colonel Akid Allam 1 étage(En dessus BMCE) - Bournazel - Casablanca - Tél: 05 40 13 12 91 / 05 22 72 42 42



Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Forme orale : prendre la dose suivante.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- réactions cutanées,
- douleurs lombaires,
- hypokaliémie (*quantité insuffisante de potassium dans le sang*),
- quelques rares cas de modifications du bilan sanguin : leucopénie (*quantité insuffisante de globules blancs*), thrombopénie (*taux anormalement bas de plaquettes*),
- élévation discrète de l'uricémie pouvant causer exceptionnellement une crise de goutte,
- élévation de la glycémie (*quantité de sucre dans le sang*)
- déshydratation, élévation de l'urée sanguine, hyponatrémie (*quantité basse de sodium dans le sang*), hypovolémie (volume total bas de sang contenu dans le corps), accompagnée d'hypotension orthostatique (*chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges*),
- en cas d'insuffisance hépatique, possibilité de survenue d'encéphalopathie hépatique (*affection neurologique observée au cours de maladies sévères du foie*),
- possibilités des troubles digestifs,
- exceptionnellement, atteinte de l'audition lors de l'administration conjointe d'antibiotiques du groupe des aminosides,
- liés à la forme injectable : possibilité de baisses transitoires de l'acuité auditive lors de l'administration de doses très élevées de ce produit notamment lorsque la vitesse d'injection recommandée n'a pas été respectée.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et genant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Précautions particulières de conservation

Les comprimés doivent être conservés à l'abri de la lumière.

Conserver les ampoules dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Janvier 2007.

1.02.06/16 (210x145) mm

LOT : 22E017
PER : 10/2006
LASILIX 40MG
20CP SEC
P.P.V : 34DH60



sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1 - Aïn Sf
20250 Casablanca



Furosemide

Lisez attentivement

Elle contient
Si vous avez
votre médecin
Ce médicament
d'autre, n'en
Gardez ce

IDENTIFIQUEZ

Composition

LASILIX 40

Furosemide

Excipients

LASILIX 20

Furosemide

Excipients

Formes physiques

LASILIX 40

LASILIX 20

ampoule

DANS QUELLE

Voie orale

Ce médicament

- des céder

- des céder

potassium

- de l'hyp

Voie injectée

Cette forme

- urgences

- poussées

- rétention

- radiologiq

- peut être

ATTENTION

Dans quelles

Ce médicament

Dr . Rachid SAIR
MEDECIN



الدكتور رشيد ساير
طبيب

- Diplôme universitaire de Diabetologie
- université Montpellier France
- Diplôme en soins avancés en cardiologie
- université de montréal-Canada
- Licencié du Conseil Médical du Canada (LCMC)
- Echographie -ECG

- دبلوم جامعي في أمراض السكري
- جامعة مونبولي - فرنسا
- دبلوم رعاية صحية متقدمة لأمراض القلب
- جامعة مونتريال - كندا
- إرتفاع الضغط الدموي - أمراض القلب والشرايين
- طبيب مجاز من طرف المجلس الطبي الكندي
- الفحص بالصدى - التخطيط الكهربائي للقلب

casablanca le : 21 Juil 2023 الدار البيضاء في :

Laboratoire Assalam Médigène:
 220723-004



NOUR-ELAIN
 Abderrahman




INPE 097158695

Facture

N° Facture : 2023-02388

Patient : Mr NOUR-ELAIN Abderrahman

Prélèvement du : 22/07/2023

Analyses	Valeur en B	Montant
HEMOGRAMME : NFS + PLQ	80	88,00
ACIDE URIQUE	30	33,00
	Total B	110
	APB	1,0
	Total	131,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Cent trente-et-un dirhams***

LABORATOIRE ASSALAM-MEDIGENES
D'ANALYSES MEDICALES
Y. IDRISI K. - PHYSIOLOGISTE
Résidence ANNAKHLA - Imm A5 - 1er Et. N° 3
Bd Akid El Allam - Quartier Bournazel
C A S A B I A N C A
Tél. : 05.22.56.51.02 - Fax : 05.22.56.51.03



يوسف إدريسي قيطوني

Youssef IDRISI KAÏTOUNI
Pharmacien Biologiste
Diplômé de l'Université de Lille



Casablanca le 22/07/2023

Compte rendu d'analyses

Dossier N° : 220723-004 Pvt du: 22/07/2023 8:49

Nom : Mr NOUR-ELAIN Abderrahman

Demandé par Dr : SAIR RACHID



Page : 1/1

ANALYSES D'HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME : NFS + PLQ

(Technique : Cytométrie en flux/Sysmex XN-550)

			Valeurs Usuelles	Antériorité
Globules rouges	:	4,46 10 ⁶ /mm ³	(4,2 - 5,7)	5,23 (13/03/14)
Hémoglobine	:	13,30 g/dl	(14 - 17)	15,2 (13/03/14)
Hématocrite	:	38 %	(40 - 52)	44 (13/03/14)
VGM	:	84 fL	(80 - 95)	84 (13/03/14)
TGMH	:	30 pg	(27 - 33)	29,1 (13/03/14)
CCMH	:	36 g/dl	(32 - 36)	35 (13/03/14)
Globules blancs	:	5 110 /mm ³	(4000 - 10000)	6400 (13/03/14)
Formule sanguine	:			
Neutrophiles	:	42 % 2146,20 /mm ³	(2000 - 7500)	2944 (13/03/14)
Eosinophiles	:	4 % 204,40 /mm ³	(Inférieur à 400)	128 (13/03/14)
Basophiles	:	0 % 0,00 /mm ³	(Inférieur à 150)	0 (13/03/14)
Lymphocytes	:	43 % 2197,30 /mm ³	(1500 - 4000)	
Monocytes	:	11 % 562,10 /mm ³	(40 - 800)	640 (13/03/14)
Plaquettes	:	197 000 /mm ³	(150000 - 400000)	217000 (13/03/14)

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

ACIDE URIQUE

(Technique : Enzymatique-URICASE-PEROXYDASE/Hitachi 911)

		Valeurs Usuelles
	51,00 mg/l 303,45 µmol/l	(35 - 72) (208 - 428)

Antériorité
54,00 (13/03/14)

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bon rétablissement

Le Biologiste
LABORATOIRE ASSALAM MEDIGENES
D'ANALYSES MEDICALES
Y. IDRISI K. - BIOLOGISTE
Résidence ANNAKHLA - Imm. A5 - 1er ét - N° 3
Bd Akid El Allam - Quartier Bournazel
C A S A B L A N C A
Tél. : 05.22.56.51.02 - Fax : 05.22.56.51.03

شارع العقيد العلام - إقامة النخلة 5، الطابق الأول رقم 3. حي البورنازيل. الدار البيضاء

Bd Akid El Allam - Résidence Annakhla Imm. A5, 1er Etage N°3 - Quartier Bournazel - Casablanca
Tél : 05 22 56 51 02 / 05 22 37 02 03 - Fax : 05 22 56 51 03 - 06 89 10 33 48 - E-mail : labomedigenes@gmail.com
IF : 42138380 - PAT 32759422 - ICE : 001685010000058 - CNSS : 6405618