

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-796927

170708

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)
Matricole : 01407 Société : RAY

Actif Pensionné(e) Autre : EL KETTANI Sidi Hamed

Nom & Prénom : EL KETTANI Sidi Hamed

Date de naissance : 19 04 1950

Adresse : 38 RUE MIMOUZI APP 23 HAY ANZAHA

Tél. : 061 220 767 Total des frais engagés : 3500,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin : Dr. SADIK Fouzia Médecin

Cachet du médecin : INPE : 091122440
04, Rue Mimouzi, Hay Erraha
Tél: 05 22 36 58 21 Casablanca

Date de consultation : 20 07 2023

Nom et prénom du malade : M^e EL KETTANI Sidi Hamed

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Colique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 04/08/2023 Le : 04/08/2023

Signature de l'adhérent(e) : 

INPE-291122440

BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/07/2023	NC1	01	200,00	INF : 0921122440 Dr. SADIK Fouzia Médecin 104, Rue Mmeouza Erraha Tunisie Signature de Fouzia
02 AOUT 2023	AC1	01	Gratuit	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture : sablanca 104, Rue Amouzat Tél: 05 22 35 52
02/03/2003	03/03/2003	349,20
	23	

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Radiologue et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
HOPITAL PRIVE INTERNATIONAL DECASABLANCA (HPIC) Service Radiologie	31-07 2023	RKT radiologique	3000 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	02 08 2023					

BEIJING DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				Coefficient des travaux <input type="text"/>
				Montants des soins <input type="text"/>
				Début d'exécution <input type="text"/>
				Fin d'exécution <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000	21433552 00000000	Coefficient des travaux <input type="text"/>
D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	Montants des soins <input type="text"/>
B				Date du devis <input type="text"/>
				Date de l'exécution <input type="text"/>
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur SADIK Fouzia

Médecine Générale

Echographie Générale

104, Rue Mimosas (ex Rue des Ecoles)

1^{er} Etage - Beauséjour

Casablanca - Tél. : 05.22.36.58.91

الدكتورة صديق فوزي

الطب العام

الفحص بالصدى

104، زنقة ميموزا (زنقة المدارس سابقاً)

الطابق الأول - بوسيجور

الدار البيضاء - الهاتف : 05.22.36.58.91

Casablanca, le : 02 AOUT 2023 الدار البيضاء، في :

Mr. EL KETTANI SIDI HAMID.

99,50 - Depurativa S.V Bip (0,13)

2 ccc 3fis / i avant

21,00 x 3 - Librax (11 x 0,3m) reves-

1 gr le soir / i

66,80 - Volbarene Somp (0,13)

1 cp / i apés repas -

79,50 - Carbosorb Transit

1 gr 2 fts / i apés repas -

40,40 - Eucarbon 1 gr 2 fts / i apés repas -

349,20 - Tetospasmol (0,13)

1 gr 2 fts / i apés repas -

Dr. SADIK Fouzia
Médecin
104, Rue Mimosa Hay Errahba
Casablanca - Tél. : 05.22.36.58.91

LOT : M23004
EXP : DEC 2026
PPV : 66,80 DH

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Alvéroline citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH
Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 100293

كاربُصرُب®

ترانزِت

30 قرص
عن طريق الفم



الشكل و التقديم :

قرص، علبة تحتوي على 30 قرصا.

المكونات :

فحم نباتي منشط، زيوت أساسية للبسباس و النعناع الفلوفي، ألياف غذائية، مستخلص الراوند و مسحوق الواكامي(طحالب بحرية).

الخصائص :

كاربُصرُب ترانزِت® مكون من الفحم النباتي المنشط و مستخلصات طبيعية فعالة أخرى كالزيوت الأساسية للبسباس و النعناع الفلوفي و مستخلص الراوند و التي تعمل بطريقة متكاملة للقضاء على الغازات و تسهيل المرور المعوي مع الحفاظ على توازن البكتيريا المفيدة للأمعاء.

دوعي الاستعمال :

ينصح بإستعمال كاربُصرُب ترانزِت® في حالة :
- الإنفاس المصحوب بالإمساك.

نصائح الاستعمال :

قرص(1) إلى قرصين (2) مرتين في اليوم، ينصح بتناوله بعد الوجبات.

احتياطات الاستعمال :

- يستعمل كمكمل لنظام غذائي متنوع.
- احترام الكمية الممنصوح بها.
- يوضع بعيدا عن متناول الأطفال الصغار.
- يحفظ في مكان بارد و جاف.

مكمل غذائي لمس، بدءاً.

CARBOSORB®
Transit

LOT: 230349
PER: 04/2026
PPC: 79,500DH



Solution buvable
Voie orale

Dépurattiva®

À base d'actifs naturels

FORME ET PRÉSENTATION :

Solution buvable, flacon de 200 ml

Lot:
À consommer
avant le:
PPC: 99,50 DH

07/2026
220532



es extrait sec, Ortie (Urtica dioica) feuilles extract sec, cassis
ardon marie (Silybum marianum) fruit extract sec, nicotina-
us concentré de pomme, jus concentré de prune, eau
nservateur : sorbate de potassium.

Actifs naturels végétaux) augmente la sécrétion et
nt ainsi la digestion.

emandé en cas de Troubles de la digestion d'origine
e, digestion difficile.

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl-3-benzyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétatoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démöxépam, desméthyldiazepam. Le démöxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières

Patients âgés et faibles : Commencer par une dose réduite et augmenter progressivement la posologie jusqu'à la dose optimale.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge, en utilisant des doses entières ou écrasées, avec

LOT 23052 PER 03/2026
PPV 21.00 DH

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl-3-benzyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétatoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démöxépam, desméthyldiazepam. Le démöxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières

Patients âgés et faibles : Commencer par une dose réduite et augmenter progressivement la posologie jusqu'à la dose optimale.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge, en utilisant des doses entières ou écrasées, avec

LOT 23052 PER 03/2026
PPV 21.00 DH

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl-3-benzyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétatoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démöxépam, desméthyldiazepam. Le démöxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières

Patients âgés et faibles : Commencer par une dose réduite et augmenter progressivement la posologie jusqu'à la dose optimale.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge, en utilisant des doses entières ou écrasées, avec

LOT 23052 PER 03/2026
PPV 21.00 DH

Docteur SADIK Fouzia

Médecine Générale

Echographie Générale

104, Rue Mimosas (ex Rue des Ecoles)

1^{er} Etage - Beauséjour

Casablanca - Tél. : 05.22.36.58.91

الدكتورة صديق فوزية

الطب العام

الفحص بالصدى

104، زنقة ميموزا (زنقة المدارس سابقا).

الطابق الأول - بوسigor

الدار البيضاء - الهاتف : 05.22.36.58.91

Casablanca, le : 29/10/23 : الدار البيضاء، في

M² EL KETTANI SIDI HAOUA

- Boîte - IRO -

RC = Colique, Hépatique

Dr. SADIK Fouzia
Médecin
104, Rue Mimouza Hay Erraha
Casablanca
Tél: 05 22 36 58 91

FACTURE


N° : 23017595 Du : 31/07/2023

Patient : SIDI HAMID ELKETTANI

Prise en charge : PAYANT Admission : 31/07/2023

N° Dossier : 23016509 Sortie : 31/07/2023

Désignations des prestations	Nombre	Lettre clé	Prix unitaire	Prix total
RADIOLOGIE	1	IRM ABDOMINALE	2 500.00	2 500.00
			Sous-Total	2 500.00
PHARMACIE	1	PH	500.00	500.00
			Sous-Total	500.00
			Total clinique	3 000.00
Arrêtée la présente ticke modérateur à la somme de :			Total brut :	3 000.00
Trois mille dirhams			Remise :	0.00
			Total net :	3 000.00





المستشفى الخاص الدولي للدار البيضاء

HÔPITAL PRIVÉ INTERNATIONAL DE CASABLANCA

HPIC

Groupe CIM Santé - Casablanca

CLINIQUE MULTIDISCIPLINAIRE

مختبر متعدد الاختصاصات

Casablanca, le :

Casablanca , le 31/07/2023

Nom et prénom: ELKETTANI SIDI HAMID

N Dossier:23016509

Examen réalisé : BILI-IRM

Technique :

T1, T2, saturation de la graisse, diffusion multi b, séquence de BILI IRM en coupes épaisses et en 3D
Séquences angio-dynamiques multiphasées après injection de Gadolinium.

Résultats :

- La vésicule biliaire ne semble pas montrer d'image lacunaire notable en son sein sur toutes les séquences réalisées y compris celle du BILI IRM et aussi sur les séquences de diffusion, les séquences angio-dynamiques ne montrent pas de zone réhaussement d'allure pathologique, la paroi vésiculaire reste régulière.
- Le canal cystique est bien identifié convergeant à la jonction tiers supérieur tiers moyen du cholédoque
- Toujours sur les séquences de diffusion il n'est pas perçu d'image en hypersignal hépatique ni vésiculaire, les deux kystes rénaux à gauche sont retrouvés également sans hypersignal de diffusion finement cloisonnés pour le kyste de la lèvre antéro-supérieure du rein de 30 mm de grand axe sans réhaussement significatif après injection classé en Bosniak 2 A sans caractère évolutif par rapport aux explorations précédentes.
- L'étude des voies biliaires ne montre pas de dilatation tant en intra qu'en extra hépatique, le cholédoque est visualisé normalement sur la totalité de son trajet.
- Le pancréas est de taille et de réhaussement conservés sans anomalie des espaces péri pancréatiques et sans dilatation du canal de Wirsung.
- Le pédicule mésentérique est normal
- Pas d'adénopathie profonde ni de nodules péritonéaux.
- Le foie est de taille normale et homogène.
- La rate est normale.

HOPITAL PRIVE INTERNATIONAL
DE CASABLANCA (HPIC)
Service Radiologie



المستشفى الخاص الدولي للدار البيضاء

HÔPITAL PRIVÉ INTERNATIONAL DE CASABLANCA

Groupe CIM Santé - Casablanca

HPIC

CLINIQUE MULTIDISCIPLINAIRE

مختبر متعدد الاختصاصات

Casablanca, le :

AU TOTAL :

- Vésicule biliaire et voies biliaires sans anomalie, il n'est pas retrouvé d'image de polype vésiculaire décelable de façon évidente.
- Les parois de la vésicule sont régulières sans image lacunaire notable à son niveau et sans prise de contraste anormale.
- Foie homogène, pancréas normal .
- Contrôle échographique annuel souhaitable.

HÔPITAL PRIVE INTERNATIONAL
DE CASABLANCA (HPIC)
DR YOUSSEF BOUZIDI
Radiologie