

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| O Réclamation | : contact@mupras.com |
| O Prise en charge | : pec@mupras.com |
| O Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-011207

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 100068 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HSAÏN JAMAL

Date de naissance : 17/08/1961

Adresse : HAYTARIK HUE SSNAZ Benmoussem

Tél. : 06 22 32 15 23 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :


Dr. MOHAMMED JAMAL BENMOUSSA
Chirurgie Générale & Coeliochirurgie
Digestive - Gynécologique - DITI Cancerologie
Chabab C2A Bld Mohammedia 1000
2ème Etage Ain Seba - Casablanca - 052 75 53 56
E-mail: drbenzakouramda@gmail.com
INPE : 091030601

Date de consultation : 18/07/2013 Age :

Nom et prénom du malade : Néfiane abdellah Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____ Le : _____ / _____ / _____

Signature de l'adhérent(e) : DR BENZAKOUR AMDA



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/07/2023	CD		0	AMAL BENZAKEN Médecin & Co-therapie Hôpital Universitaire de Tunis - La Rabta amalbenzaken@gmail.com +216 722 15335

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	28/11/2023	308,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux <input type="text"/>
				Montants des soins <input type="text"/>
				Début d'exécution <input type="text"/>
				Fin d'exécution <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 B 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553		Coefficient des travaux <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				Montants des soins <input type="text"/>
				Date du devis <input type="text"/>
				Date de l'exécution <input type="text"/>



AKDITAL

Hôpital Privé Casablanca Ain Sebaa
المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع

Casablanca, le 28/07/23

HSAIN Jamal

MR⁰⁰
1. Aclav 1g 
✓ sachet x 21;

82.10
2. RE 20K 2w 
✓ g /

79.50
3. Carbopol 940 
✓ g x 21;

32.00
4. No. 87a 
✓ g x 21;

279, Bd. Chefchaouni Ain Sebaa - Casablanca
Tél. : 05 22 68 00 00 - Fax : 05 22 35 66 44
E-mail : direction@hpc.ma
Site web : www.hpc.ma

Dr. MOHAMMED AMAL BENZAKOURA
Chirurgie Générale & Cœliochirurgie
Digestive - Gynécologique-DU Cancerologie Digestive
Chabob C2A Bd. Mohammed V Casablanca - 102275
2ème Etage Ain Sebaa - Casablanca - 0522 75 55
E-mail: drbenzakouramal@gmail.com
Télé : 010 22 22 22 22



For 54 days

RV Cabinet 052275356

. 03.08.23 at 10²

. 10.08.23 at 16⁴



Comprimé
Voie orale

CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boîte de 30 comprimés

COMPOSITION (par comprimé) :

Charbon végétal, chondrus (*chondrus crispus*) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucre, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (*foeniculum vulgare*) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et huiles essentielles de fenouil qui agissent en synergie pour renforcer l'action du charbon végétal en éliminant les gaz intestinaux, et en luttant contre les spasmes, tout en procurant plus de confort intestinal.

UTILISATIONS :

CARBOSORB® est recommandé en cas de : Ballonnement intestinal, digestion difficile et Troubles Fonctionnels Intestinaux (TFI).

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec un verre d'eau avant les principaux repas.
- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Il est recommandé de prendre **CARBOSORB®** à distance des médicaments.
- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Lot: 230348
À consommer de préférence avant le: 04/2028
PPC: 79,50 DH

Fabriqué par Pharmalife Research-Italie

Importé et distribué par **MEDIPRO Pharma**.

Autorisation ministère de la santé n°: DA20181102004DMP/20UCA/MA v3



MEZOR® 20 mg et 40 mg

Boîtes de 7, 14 et 28 Gélules gastro-résistantes

Esméprazole (DCI) magnésium dihydronaté

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QUEST'EST-CE QUE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES. ELLES DANS QUELS CAS EST-EL UTILISÉ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons

- Code ATC : A02BC05.

MEZOR contient une substance appelée esoméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés "inhibiteurs de la pompe à protons". Il diminue la quantité acide produite par votre estomac.

indications thérapeutiques :

MEZOR est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

• MEZOR 20 mg:

Adultes :

- Reflux gastro-œsophagien :

• Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

• Traitement d'entrée et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

• Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

• En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodenal en cas d'infection par Helicobacter pylori.

• Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïden (AINS) doit être poursuivi :

- Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS ;

- Prévention des ulcères gastroduodenaux associés à la prise de laAINS, chez les patients à risque.

• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents à partir de l'âge de 12 ans :

• Reflux gastro-œsophagien (RGO)

• Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

• Traitement d'entrée et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

• Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

• En association à des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori.

• MEZOR 40 mg :

• Reflux gastro-œsophagien : Traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

• Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastroduodenal.

2. QU'EST-CE QU'IL FAUT CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-résistantes dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à proton (par exemple : pantoprazole, lisoprazole, rabeprazole, oméprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du neflénivar (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Ne prenez jamais MEZOR si vous êtes dans l'une des situations décrites ci-dessus. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre MEZOR.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-résistantes.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères,

- Si vous avez des problèmes rénaux sévères,

- Si vous avez été diagnostiquée ou vous savez que vous risquez de développer une carence en vitamine B12.

- Si vous devez faire un test sanguin spécifique (chromogranine A),

- Si vous avez déjà présenté une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à MEZOR ou qui a réduit l'acidité gastrique.

- Si vous avez une infection par le VIH, en particulier sur des zones exposées au sol, informez au plus vite votre médecin car il est possible que vous deviez arrêter votre traitement avec MEZOR. N'oubliez pas de l'informer également de tout autre effet indésirable tel qu'une douleur articulaire.

MEZOR peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, si vous êtes dans une des situations suivantes, avant de prendre MEZOR, ou pendant que vous le prenez, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

- Vous avez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

En cas de prescription de MEZOR « à la demande » en fonction des besoins, vous devez contacter votre médecin si les symptômes persistent ou se modifient.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que MEZOR, en particulier sur une période de plus d'un an, peut augmenter légèrement le risque de fracture de la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale. Informez votre médecin si vous avez de l'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Enfants et adolescents :
En l'absence de données, MEZOR n'est pas recommandé chez l'enfant de moins de 12 ans.

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez avec récemment pris ou pourrez prendre avec ce médicament.

Ceci s'applique également aux médicaments non fournis à la prescription.

MEZOR peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et reciprocement.

Ne prenez jamais MEZOR si vous prenez un médicament contenant du neflénivar (utilisé dans le traitement des infections par le VIH).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Alazatinavir (utilisé dans le traitement des infections par le VIH),

- Aspirine (utilisée pour la prévention des caillots sanguins),

- Digoxine (utilisée pour les problèmes cardiaques),

- Rofampicine (utilisée pour le traitement de la tuberculose),

- Melperon (Hypericum perforatum) (utilisé pour traiter la dépression),

- Kétonacizole, itraconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques),

- Prostacycline (utilisée dans le traitement de l'épilepsie),

- Thiaméphytox (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente),

- Chlorméthiazol, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression),

- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, du relâchement musculaire ou de l'épilepsie),

- Phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente) - douleur dans les jambes lorsque vous marchez qui est causée par un apport sanguin insuffisant),

- Cisapride (utilisé dans le traitement de l'ulcère gastroduodenal à forte dose dans le traitement du cancer) ; si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par ce médicament.

- Tacrolimus (utilisé en cas de greffe d'organe).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clavamycine avec MEZOR pour empêcher une autre infection à Helicobacter pylori, veillez à prendre ces antibiotiques avec autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de physiothérapie ou thérapies alternatives :

Sous objets.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien ayant de prendre ce médicament.

Votre médecin décidera si vous pouvez prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, pendant cette période.

On ignore si MEZOR passe dans le lait maternel. En conséquence, vous ne devez pas utiliser MEZOR lorsque vous allaitez.

Sportifs :

Sous objets.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

Effectuez une évaluation de votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines et à utiliser des machines. Toutefois, des effets indésirables tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement.

Si vous présentez ces effets indésirables, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, pélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase / isomaltase (maladies hépatiques rares).

Ce médicament contient du « propyl-p-hydroxybenzoate (E216) et propyl-p-hydroxybenzoate (E218) » qui peuvent provoquer une réaction allergique dans certains cas.

3. COMBIEN PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

- Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Posologie :

- Votre médecin vous indiquera le nombre de gélules à prendre par jour et le temps de traitement. Ceci dépendra de votre état de santé, de votre sexe.

- Les doses recommandées sont :

• Traitements de l'ulcère gastroduodenal : 20 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de la clairière (Zollinger-Ellison) : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

• Traitements de l'ulcère de l'estomac et de l'ulcère gastroduodenal : 40 mg par jour.

ACLAV®

Amoxicilline + Acide clavulanique

COMPOSITION ET PRESENTATIONS :

PRODUIT : COMPOSITION :	Aclav 1g/125mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 14 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav 500mg/62,5mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav Enfant 100mg/12,5mg/1ml Flacon de 60 ml	Aclav Nourrisson 100mg/12,5mg/1ml Flacon de 30 ml
Amoxicilline trihydratée : quantité correspondant à l'amoxicilline anhydre	1g	500 mg	6 g	3 g
Clavulanate de potassium : quantité correspondant à l'acide clavulanique	125 mg	62,5 mg	750 mg	375 mg
Excipients	q.s.p 1 sachet	q.s.p 1 sachet	q.s.p 10,30 g de poudre	q.s.p 5,15 g de poudre

PROPRIETES :

Antibiotiques antibactériens de la famille des bétalactamines, du groupe des aminopénicillines.
Aclav est une formulation associant l'amoxicilline et l'acide clavulanique puissant inhibiteur de bétalactamases.

INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes reconnus sensibles, notamment dans :

- Les otites moyennes aiguës, otites récidivantes.
- Les sinusites maxillaires aiguës et autres formes de sinusites.
- Les angines récidivantes, amygdales chroniques.
- Les surinfections de bronchites aiguës du patient à risque.
- Les exacerbations de bronchopneumopathies chroniques.
- Les pneumopathies aiguës du patient à risque.
- Les cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles.
- Les infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les chlamydiae.
- Les parodontites.
- Les infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites.
- Traitement de relais de la voie injectable.
- Infections respiratoires basses chez le nourrisson et l'enfant de moins de 5 ans.
- Infections urinaires chez le nourrisson.

CONTRE INDICATIONS :

-Absolues :

- Allergie aux antibiotiques du groupe des bétalactamines (pénicillines, céphalosporines).
- Mononucléose infectieuse.
- Antécédent d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline -acide clavulanique.
- Phénylcétonurie (en raison de la présence de l'aspartam)

-Relatives :

Le méthotrexate

POSOLOGIE :

Les Posologies sont exprimées en Amoxicilline

Adulte normorénal (poids ≥ 40 kg)

2 à 3g/jour en 2 à 3 prises selon la prescription médicale et l'infection concernée.

Adulte insuffisant rénal (poids ≥ 40 kg)

Clairance de la créatinine	Schéma posologique
Supérieur à 30 ml / min	pas d'adaptation né
Entre 10 et 30 ml / min	1 g /125 mg toute le
Inférieur à 10 ml / min	Pour les patients tra les conditions d'utili

LOT : 2285

PER : 02-25

P.P.V : 115DH00

Chez les patients âgés : pas d'adaptation posologique sauf si la cl
(même posologie chez l'insuffisant rénal)

A19033 Fxt 7

No-Spa® 40mg

Chlorhydrate de drotavérine

Comprimé

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

1. Qu'est-ce que No-Spa 40 mg comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?

No-Spa 40 mg comprimé est un antispasmodique. Il peut être utilisé dans les situations suivantes :

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine biliaire : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine urinaire : calcul urinaire (dans les reins ou les uretères), pyélonéphrite (inflammation du bassinet), cystite (inflammation de la vessie), ténèse vésical (tension douloureuse de la vessie avec sensation de brûlure et envie continue d'uriner).

Traitements d'appoint des troubles suivants :

- spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine digestive : ulcère gastrique (de l'estomac) ou ulcère duodénal (du duodénum), inflammation de la muqueuse gastrique, spasmes du sphincter (anneau musculaire) du cardia ou du pylore (orifice supérieur ou inférieur de l'estomac), inflammation de l'intestin grêle ou du gros intestin ;
- affections gynécologiques : règles douloureuses ou crampes menstruelles.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre No-Spa 40 mg comprimé ?

Ne prenez jamais No-Spa 40 mg comprimé

• si vous êtes allergique à la drotavérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique informations supplémentaires),

• si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

Faites attention avec No-Spa 40 mg comprimé :

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre No-Spa 40 mg comprimé.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une tension artérielle basse (hypotension).

Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'utilisation simultanée de la drotavérine et de la lévodopa entraîne une diminution de l'effet de la lévodopa, à savoir l'atténuation des symptômes de la maladie de Parkinson, ainsi qu'une accentuation de la rigidité des muscles squelettiques et des tremblements.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Les études effectuées chez l'animal gravide et celles réalisées chez la femme enceinte n'ont pas mis en évidence d'effet délétère pour le foetus ou pour la mère. Si vous êtes enceinte, votre médecin déterminera si l'utilisation de ce médicament est pertinente pour vous.

Allaitement

En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée durant l'allaitement.

Fertilité

Aucune donnée n'est disponible concernant un éventuel effet sur la fertilité chez l'homme.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'administration de No-Spa 40 mg comprimé aux posologies habituelles n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas d'apparition de vertiges suite à la prise d'un comprimé, les activités en environnement à risque, ainsi que la conduite de véhicules et l'utilisation de machines doivent être évitées.

No-Spa 40 mg

PER 10
N° 000322
CP 820
SANOFI

NO - SPA 40 MG

CP 820

P.P.V : 32DH00

6 118000 861342



Veillez à tou

exactement

... avec cette notice ou les indications de votre médecin ou de votre pharmacien.. Vérifiez auprès de