

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2950

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

WADEH M'HAMED

Date de naissance :

1966

Adresse :

Bonne Louna Rue 27 n°  
ne 26 Casablanca

Tél. :

06 92 65 12 69 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

04/05/2013

Nom et prénom du malade :

WADEH M'HAMED

Age : 56

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 04/05/2013

Signature de l'adhérent(e) :



DR. AMAL ZARHLOULE

OMNIPRATICIENNE  
DIU EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE  
LASERS MÉDICAUX À VISÉE ESTHÉTIQUE  
NUTRITION ET MICRO-NUTRITION, DIABÉTOLOGIE  
ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE



091267278

الدكتورة آمال زهالول

الطب العام

دبلوم جامعي في أمراض الجلد التدالخية  
اللبرر الطبي من أجل التجميل والتقويمات المواتية  
من أجل التجميل.

التغذية والتغذية الدقيقة

أمراض السكري و الفحص بالصدى

DR. AMAL ZARHLOULE Amal  
Diabetologue - Nutritionniste  
Micronutritionniste  
Tel : 05 22 82 46 33

Casablanca, le :

149,00 1) Androli Ahmed  
1) Simvlose op 200 mg  
1cp X 2 / 15 144,50 2) OREUZAPDOL mg  
1cp - 0 - 0 87,70 3) TRilumorel 35 mg  
1cp X 2 / 15 9,60 4) Clopore supodelle  
1cp X 2 / 15  
T. 390,80

PHARMACIE OSCAR  
Dr LAMOUNI Khadija  
Hay Andalous 3 Rue 13 N°121 - Casablanca  
Tel 0522 52 04 46 - CE 000499944000033



شارع موديبو كيتا، سidi maarouf 3، زنقة 13، رقم 3، الطابق الأول، الشقة 1 - الدار البيضاء  
Bd. Modibo keita, Sidi maarouf 3 - Rue 13 N°3, 1<sup>er</sup> étage, App.N°1, CASABLANCA  
Tél. : 05 22 82 46 33 البريد الإلكتروني : Email : amalzarh2002@gmail.com

DR. AMAL ZARHLOULE Amal  
Diabetologue - Nutritionniste  
Micronutritionniste  
Tel : 05 22 82 46 33

Indications, contre indications,  
posologie et mode d'emploi :  
voir notice.

Quinolox 200mg boîte de 20 comprimés



6 118000 090694

LABORATOIRES  
**PHARMA 5**  
5 Lot 09/2020

Yasmine LAHLOU FILALI  
Pharmacien Responsable

21, Rue des Asphodèles  
- Casablanca

# Quinolox®

ofloxacine 200 mg

Boîte de 20 comprimés

Voie orale



LOT : 3116

PER : 09-25

P.P.V : 149 DH 00

Antibiotique unique

Laboratoires Pharmaceutiques Pharma 5



# TRIMAREL® 35mg

Trimétazidine

60 comprimé pelliculé à libération modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour être nocif, même si vous ressentez des effets indésirables, il s'applique aussi.

## 1. QU'EST-CE QU'IL UTILISE ?

AUTRE MEDICAMENT  
Ce médicament est utilisé pour traiter l'angine de poitrine.

## 2. QUELLES SONT LES CONSEILS POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSOMMATION ?

Ne prenez jamais :

- Si vous êtes allergique aux médicaments mentionnés dans la notice.

- Si vous avez une maladie de Parkinson : maladie du cerveau affectant les mouvements (tremblement, raideur de la posture, mouvements lents, démarche déséquilibrée avec une tendance à traîner les pieds),
- Si vous avez des problèmes rénaux graves.

PPV : 87DH70  
PER : 01/26  
LOT : M339



## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TRIMAREL® 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée.

Ce médicament n'est pas un traitement curatif d'une crise d'angine de poitrine, ni un traitement initial de la crise d'angine de poitrine instable. Ce n'est pas un traitement de l'infarctus du myocarde.

En cas de survenue d'une crise d'angine de poitrine, prévenez votre médecin. Des examens pourront vous être demandés et le traitement sera éventuellement modifié.

Ce médicament peut induire ou aggraver des symptômes tels que tremblement, raideur de la posture, mouvements lents, démarche déséquilibrée avec une tendance à traîner les pieds, surtout chez les personnes âgées, qu'il convient de rechercher et de signaler à votre médecin, qui pourra réévaluer votre traitement.

Ce médicament est généralement déconseillé pendant l'allaitement.

Des chutes peuvent survenir à la suite d'une baisse de la tension artérielle ou d'un trouble de l'équilibre (voir description des effets indésirables).

## Enfants et adolescents

TRIMAREL® 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée ne doit pas être administré aux enfants âgés de moins de 18 ans.

Autres médicaments et TRIMAREL® 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TRIMAREL® 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée avec des aliments et boissons :

Sans objet.

## Grossesse et allaitement

Grossesse : Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

### Allaitement

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, TRIMAREL® 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, ne doit pas être utilisée pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut vous donner la sensation d'avoir la tête qui tourne et vous donner envie de dormir, ce qui peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### Excipient à effet notoire :


TRIMAREL® 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée contient du : Glycérol.



OLEDIZ® 20 mg, comprimés gastro-résistants, Boîte de 28

PPV: 144 DH 50

AMM N° 18620/05/21/TR/DMP/AX/02



مدة العلاج: ..... : ..... Durée du traitement:

Titulaire d'AMM/Distributeur:

Labo-Attoire Axess Pharma  
Lot N°67 Zone Industrielle Sahel Had Soualem,  
Maroc.

صاحب رخصة التسويق/الموزع: مختبر أكسيس فارما رقم  
67. المنطقة الصناعية السادس. حد السوالم المغرب

Fabriqué par Jubilant Generics Limited

يصنعن من طرف Jubilant Generics Limited  
Village Sikandarpur Bahainswal,  
Roorkee Dehradun Highway,  
Bhagwanpur, Roorkee.  
Distt. - Haridwar,  
Uttarakhand - 247 661, Inde

Lot:  
Exp.:

10/2023



3076

GTIN 08902805105046  
S.N. KSMRD58AFEOA  
PV121017B

**Composition :**  
Esomeprazole ..... 20 mg  
Sous forme d'ésomeprazole magnésium amorphe  
**Excipients** ..... q.s.p. 1 comprimé gastro-résistant.  
Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.  
**Mode et voie d'administration :**  
Lire attentivement la notice avant utilisation.  
**Conditions de conservation :**  
A conserver à une température inférieure à 30°C.

**التركيبة :**  
إيزوميپرازول ..... 20 ملг.  
على شكل إيزوميپرازول المقترن بماغنيسيوم أوف.  
السواغات ..... كمية كافية لقرص صائم لمحضنة المعدة  
سواغات ذات تأثيرات معروفة : ساکروز، لاتکوز.  
كيفية و طريقة الاستعمال :  
اقرأ النشرة الداخلية بدقة قبل الاستعمال.  
**شروط الحفظ :**  
يحفظ في درجة درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

Tenir Hors De La Vue Et De La Portée Des Enfants

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن ملأى وتناول الأطفال

**RESPECTER LES DOSES PRESCRIPTIONS**  
**يجب احترام الجرعات الموصوفة**

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE - TABLEAU C (liste II)  
(بموجب بدمج وصفة طبية. جدول س (الجدة))

**axess  
pharma**

DR. AMAL ZARHLOULE

OMNIPRATICIENNE  
DIU EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE  
LASERS MÉDICAUX À VISÉE ESTHÉTIQUE  
NUTRITION ET MICRO-NUTRITION, DIABÉTOLOGIE  
ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE



الدكتورة آمال زهالول

الطب العام

دبلوم جامعي في أمراض الجلد التدaxلية  
الليزر الطبي من أجل التجميل والتكنيات المعاصرة  
من أجل التجميل.  
القندية والتغذية الدقيقة  
أمراض السكري والفحص بالصدى

02/06/2023

Casablanca, le :

091267278

WADH Nour

1) Uptora 200 mcg

27,70 1cp/1

300

2) Cardiacasp 100 mcg

31,30 1cp/1 à midi 300

3) Zyprexa 200 mcg

85,00 1cp/1

NS

PHARMACIE OSCAR  
Dr LAMOUNI Khadija  
Hay Andalousia - Rue 7 N°121 - Casablanca  
Tél 0522 52 04 46 - I.C. 00049944000032

INPE09204638

LOT 225911

EXP 11 2024

PPV 85,00

390,00 0801

300

4) Galer 50 mcg

0 - 1cp - 1cp/1

NS

300

شارع موديبو كيتا، سيدى معروف 3، زنقة 13، رقم 3، الطابق الأول، الشقة 1 - الدار البيضاء  
Bd. Modibo keita, Sidi maarouf 3 - Rue 13 N°3, 1<sup>er</sup> étage, App.N°1, CASABLANCA  
Tél. : 05 22 82 46 33 البريد الإلكتروني : Email : amalzarh2002@gmail.com

سوطهما  
Titulaire de l'AMM/Fabricant  
Laboratoires SOTHEMA  
R.P. N° 1, 27182 Bourg - Maroc  
صاحب ترخيص المسوقة  
مقدمة

6) <sup>56,30</sup> Dure 25000 UT ds  
Idee / Sén

Dr. ZARHILLOUE Amal  
Diabetologue - Nutritionniste  
Micronutritionniste  
Tél: 05 52 82 46 33



→ Idee / Sén  
au milieu du corps du NC

Dr. ZARHILLOUE Amal  
Diabetologue Nutritionniste  
Micronutritionniste  
Tél: 05 52 82 46 33

T: 550,30

# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

## ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourraient leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### **Avertissements et précautions :**

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers l'apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En l'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez immédiatement votre médecin.

- Si vous souffrez de calculs rénaux, leur taille peut diminuer et ils pourront passer dans les voies urinaires.

### **Autres médicaments et ZYLORIC, comprimé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

- Aspirine
- Théophylline, utilisée pour des problèmes respiratoires
- Médicaments utilisés pour des convulsions (épilepsie), phénytoïne
- Vidarabine (anti-viral), utilisée pour traiter l'herpès ou la varicelle
- Didanosine, utilisée pour traiter une infection par le VIH
- Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline)
- Médicaments utilisés pour traiter les cancers
- Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosupresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)
- Médicaments utilisés pour traiter le diabète
- Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) ou des diurétiques (pour éliminer l'eau)
- Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine
- Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.

Veuillez avertir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

### **Liste des excipients à effet notoire: Lactose.**

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucre, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### **3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après les repas.

### **Posologie**

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour.

Vc  
ca  
Si  
me  
les  
se  
de  
Ut  
Le

LOT 222631  
EXP 08 2026  
PPV 31.30

### **Mode et voie de prise**

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

## 100 mg, comprimés gastro-résistants

### Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique. CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le risque est élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CARDIOASPIRINE 100 MG ?

Cardioaspirine 100 mg/30cpr  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

6 118001 090280



Les médicaments doivent être tenus hors de portée des enfants

Ne pas conserver au-dessus de 30°C et tenir à l'abri de l'humidité dans l'emballage original .

Veuillez consulter la notice d'emballage.

Chaque comprimé contient 50mg de vildagliptine .

Excipient à effet notoire: Lactose (voir la notice pour plus d'information)

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية

يحفظ اللواء داخل العلبة بعيدا عن الرطوبة

يجب فراغة النشرة قبل استعمال اللواء

يحتوي كل قرص على 50 ملغ من فنديغليپتين

سواء ذو تأثير معروف: لاكتوز

اقرأ النشرة للمزيد من المعلومات

#### RESPECTEZ LES DOSES PRESCRITES

Liste I –Uniquement sur ordonance

احترم الجرعات الموصوفة

لائحة 1 - يصرف فقط بموجب وصفة طبية



6118001031030

Galvus® 50 mg

Boite de 60 comprimés.

PPV : 390 DH



DR. AMAL ZARHLOULE

OMNIPRATICIENNE  
DIU EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE  
LASERS MÉDICAUX À VISÉE ESTHÉTIQUE  
NUTRITION ET MICRO-NUTRITION, DIABÉTOLOGIE  
ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE



الدكتورة أمال زهال

الطب العام

دبلوم جامعي في أمراض الجلد التداخلي  
اللبيز الطبي في مجال التجميل والتقنيات المعاصرة  
من أجل التجميل  
القندية والمتلازمة الدهنية  
أمراض المعدة المقصود بالصدى

Dr. Amal Zarhoul  
Diabetologie  
Micro-nutrition  
Tél. 0522 82 46 33

Casablanca, le :

091267278

WADH Rhoenel

1) H2Ac-0AT  
2) Clot-Ton WADH  
3) NRG a wft  
4) ame - ceest  
5) Dimeg say  
6) Act Dr - Drs Colen  
7) Acide mag  
8) Got - OLT



Dr. ZARHLOULE Amal  
Diabetologue - Nutritionniste  
Micro-nutritionniste  
Tél. : 05 22 82 46 33

شارع موديبو كيتا، سيدى معروف 3، زنقة 13، رقم 3، الطابق الأول، الشقة 1 - الدار البيضاء  
Bd. Modibo keita, Sidi maarouf 3 - Rue 13 N°3, 1<sup>er</sup> étage, App.N°1, CASABLANCA  
الهاتف : 05 22 82 46 33 Email : amalzarh2002@gmail.com

Dr. CHEKKOURY IDRISI Sofia

Pharmacienne Biologiste

- Lauréate de la Faculté de Pharmacie de Grenade (Espagne)
- Ex-interne au CHU d'Albacete (Espagne)
- Diplôme universitaire en Procréation médicalement assistée UMH Alicante (Espagne)

الدكتورة صوفيا الشقوري الإدريسي  
صيدلانية إيجيانية

- خريجة كلية الصيدلة بغرناطة (إسبانيا)
- داخلية سابقاً بالمستشفى الجامعي بأتسيطي (إسبانيا)
- دبلوم جامعي في المساعدة الطبية على الإنجاب بجامعة ألكانتا (إسبانيا)



Dossier N° : 010623-027 Pvt du: 01/06/2023 11:33

Nom : Mr WADIH Mhamed

Prescripteur Dr : ZARHLOULE AMAL

Page : 1 / 3

### Compte rendu d'analyses

#### HEMATOLOGIE

Automate : SYSMEX Xs1000i

Valeurs Usuelles

Antériorité

#### NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES

##### HEMATIES

Hémoglobine : 4,55 M/mm<sup>3</sup> ( 4,2 - 5,7 )

Hématocrite : 13,4 g/dL ( 14 - 17 )

VGM : 39,8 % ( 40 - 52 )

TCMH : 87 fL ( 80 - 100 )

CCMH : 29 pg ( 27 - 32 )

CCMH : 34 % ( 30 - 35 )

##### LEUCOCYTES

##### FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles : 58,4 % Soit 3060 /mm<sup>3</sup> ( 2000 - 7500 )

Lymphocytes : 30,2 % Soit 1582 /mm<sup>3</sup> ( 1500 - 4000 )

Monocytes : 9,9 % Soit 519 /mm<sup>3</sup> ( 200 - 800 )

Polynucléaires Eosinophiles : 0,4 % Soit 20,96 /mm<sup>3</sup> ( 100 - 400 )

Polynucléaires Basophiles : 1,1 % Soit 57,64 /mm<sup>3</sup> ( Inférieur à 150 )

##### PLAQUETTES

Plaquettes : 251 000 /mm<sup>3</sup> ( 150000 - 400000 )



Dr. S CHEKKOURY IDRISI  
Laboratoire BIOCEN  
522, Avenue 2 Mars - Casablanca  
Tél. : 05 22 28 41 60

Dr. CHEKKOURY IDRISI Sofia

Pharmacienne Biologiste

- Lauréate de la Faculté de Pharmacie de Grenade (Espagne)

- Ex-interne au CHU d'Albacete (Espagne)

- Diplôme universitaire en Procréation médicalement assistée UMH Alicante (Espagne)

الدكتورة صوفيا الشقوري الإدريسي

صيدلانية إنجيائية

- خريجة كلية الصيدلة بغرناطة (إسبانيا)

- داخلية سابقة بالمستشفى الجامعي بالسيطي (إسبانيا)

- دبلوم جامعي في المساعدة الطبية على الإنجاب بجامعة ألكانتي (إسبانيا)

Mr WADIH Mhamed

Dossier N° : 010623-027

Page : 3 / 3

### IONOGRAMME

#### Automate : Smart lyte

#### IONOGRAMME SANGUIN

			Valeurs Usuelles	Antériorité
Sodium	:	131,6	mEq/L mmol/L	( 135 - 145 ) ( 137 - 143 )
Potassium	:	4,36	mEq/l	( 3,5 - 4,9 )
Chlore	:	96,2	mmol/L mEq/L	( 100 - 110 ) ( 100 - 110 )
Réserve Alcaline	:	29,0	nmol/L mEq/L	( 22 - 30 ) ( 22 - 30 )
Calcium	:	95,0	mg/L mmol/L	( 90 - 105 ) ( 2,3 - 2,6 )
Protéines totales	:	72	g/L	( 55 - 77 )

### VITAMINES

#### Automate : VIDAS PC Biomérieux

#### 25-OH Vitamine D (D2 + D3)

:

13,10

ng/mL

Valeurs Usuelles

Antériorité

Interprétation :

Carence vitaminique D : < 10 ng/mL

Insuffisance vitaminique D : 10 - 30 ng/mL

Taux normal : 30 - 80 ng/mL

Possible intoxication vitaminique D : > 150 ng/mL

### PARASITOLOGIE

#### GOUTTE EPAISSE (PALUDISME)

:

Négative



Dr. SOFIA CHEKKOURY IDRISI  
Laboratoire BIOCEN



Nous vous remercions de votre confiance

Dr. CHEKKOURY IDRISI Sofia

Pharmacienne Biologiste

- Lauréate de la Faculté de Pharmacie de Grenade (Espagne)

- Ex-interne au CHU d'Albacete (Espagne)

- Diplôme universitaire en Procréation médicalement assistée UMH Alicante (Espagne)

الدكتورة صوفيا الشقوري الإدريسي

صيدلانية إيجيانية

- خريجة كلية الصيدلة بغرناطة (إسبانيا)

- داخلية سابقاً بالمستشفى الجامعي ببالسيط (إسبانيا)

- دبلوم جامعي في المساعدة الطبية على الإنجاب بجامعة ألكانتي (إسبانيا)

Mr WADIH Mhamed

Dossier N° : 010623-027

Page : 2 / 3

### BIOCHIMIE

#### Automate : Indiko Plus Thermoscientific

Valeurs Usuelles

Antériorité

**HÉMOGLOBINE GLYCOSYLIÉE** : 10,60 %

interprétation des résultats selon la standarisation du NGSP

- HbA1C entre 4 et 6 % : intervalle non diabétique normale.
- HbA1C inférieur à 6,5 % : excellent équilibre glycémique (DNID)
- HbA1C inférieur à 7 % : excellent équilibre glycémique (DID).
- HbA1C supérieur à 7 % : action corrective suggérée.

Glycémie à jeun	:	<b>2,89</b> 16,04	g/L mmol/L	( 0,7 - 1,1 ) ( 3,89 - 6,11 )
Urée	:	<b>0,57</b> 9,50	g/L mmol/L	( 0,18 - 0,5 ) ( 3 - 8,34 )
Créatinine	:	<b>13,50</b> 119	mg/L μmol/L	( 6 - 12 ) ( 53 - 106 )
Acide Urique	:	<b>86</b> 511,7	mg/L μmol/L	( 35 - 70 ) ( 208 - 416 )
ASAT ( Aspartate Aminotransférase )	:	<b>18</b>	UI/L	( 10 - 40 )
ALAT ( Alanine Aminotransférase )	:	<b>15</b>	UI/L	( 10 - 45 )
Calcium	:	<b>95,0</b> 2,4	mg/L mmol/L	( 90 - 105 ) ( 2,3 - 2,6 )
Triglycérides	:	<b>1,20</b> 1,37	g/l mmol/l	( 0,5 - 1,5 ) ( 0,57 - 1,7 )
Cholestérol Total	:	<b>2,66</b> 6,86	g/L mmol/L	( 1,55 - 2 ) ( 4 - 5,16 )
HDL-Cholestérol	:	<b>0,49</b> 1,26	g/L mmol/L	( 0,35 - 0,7 ) ( Supérieur à 0,9 )
LDL-Cholestérol	:	<b>1.93</b>	g/l	( Inférieur à 1,6 )



Dr. CHEKKOURY IDRISI  
BIOCENTER  
Casablanca



Dr. CHEKKOURY IDRISI  
BIOCENTER  
Casablanca

Dr. CHEKKOURY IDRISI  
Laboratoire BIOCENTER  
522, Avenue du 2 mars - Casablanca  
Tél : 05 22 28 41 60

# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BIOCENTRE CASABLANCA

Dr. CHEKKOURY IDRISI SOFIA

Adresse : 522, Avenue du 2 mars ( à côté de l'hôpital My El Hassan 'BOUAFI'  
Téléphone : 05 22 28 41 60 - E-mail : biocentrecasablanca@gmail.com

## Facture

N° facture 23-2850

Date de prélèvement 01/06/2023

Mr WADIH Mhamed

Code Acte	Designation Acte	Cotation
NFS	NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES	80
HBA1C	Hémoglobine glyquée	100
GLY	Glycémie à jeun	30
U	Urée	30
CREA	Créatinine	30
AU	Acide Urique	30
ASAT	ASAT ( Aspartate Aminotransférase )	50
ALAT	ALAT ( Alanine Aminotransférase )	50
CA	Calcium	30
TG	Triglycérides	60
CT	Cholestérol Total	30
HDL	HDL-Cholestérol	50
LDL	LDL-Cholestérol	50
IONOS	IONOGRAMME SANGUIN	190
VITD	25-OH Vitamine D (D2 + D3)	450
RPS	GOUTE EPASSE + FROTTIS MINCE	40

Total B	1300
Total en dirhams	1 767,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Mille sept cent soixante-sept dirhams\*\*\*

