

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-784208

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1268 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : NATLA MOHAMED 17/706
 Date de naissance : 01/01/1940
 Adresse : BL 02 05 NR 116 C D CASA
 Tél. : 0649 651683 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation : 24/07/2023
 Nom et prénom du malade : SOUKRATI HALIMA Age :
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Affection R. Longue Durée
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :
 Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/10/23		45	300000	INF : 1202/148615
01/03/23	Contrôle		gratuit	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	24-07-23	1060,00



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 B G			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. El Ouadih Meryem

Rhumatologue

Rhumatismes inflammatoires

Arthrose, tendons

Colonne vertébrale

Ostéoporose

Biothérapie

Échographie ostéoarticulaire

Médecine chinoise, Acupuncture

الدكتورة الواضح مريم

أخصائية في أمراض العظام والمفاصل

الرماتيزم، التهاب المفاصل

أمراض الغضروف الأوتار

أمراض العمود الفقري

هشاشة العظام

الأدوية البيولوجية

الفحص بالصدى للمفاصل والأوتار

الطب الصيني الوخز بالإبر



Casablanca, Le :

Nom et Prénom :

24/07/2023

SOUKRATI HALIMA

- Mydoflex cp

1 cp x 2 / j pendant 15 jours

- Lanzen 30 mg

1 gélule / j à jeun pendant 14 jours puis au besoin

- Lyrica 75 mg

1 gélule x 2 / j le soir pendant 01 mois

- Hydroxo 5000µg

1 injection / 03 jours en IM pendant 12 jours

- Reumadep

1 gélule x 2 / j pendant 1 mois

- Tetra Mag 300

1 capsule / j pendant 30 jours

• Cefix 200 mg

• D3 Novum 200 µg

vos prochains rendez-vous le

549. بلوك 5 شارع الدريس الحارثي، الطابق 1 قرب مخبزة نافال وقيسارية سباتة

549, Bloc 5, Bd Driss El Harti, 1er Etage - Ben Msik (à côté de Pâtisserie naval)

Casablanca - ☎ : 05 22 56 39 95 - ✉ cabinetdrelouadih@gmail.com

١٠٠ مغ علب من 20 برشامة ٢٠٠ مغ علب من 10 و 20 برشامة

سايكو تسويج



التهاب المفاصل الروماتويدي: الجرعة الموصى بها هي 200 مغ يوميا. يمكن زيادتها من قبل طبيبك إلى 400 مغ كحد أقصى إذا لزم الأمر.

الجرعة هي عادة:

برشامة واحدة 100 مغ مرتين في اليوم.

التهاب الفقار التصلبي: الجرعة الموصى بها هي 200 مغ يوميا. يمكن زيادتها من قبل طبيبك إلى 400 مغ كحد أقصى إذا لزم الأمر.

الجرعة هي عادة:

برشامة 200 مغ مرة واحدة في اليوم أو برشامة واحدة 100 مغ مرتين في اليوم. مشاكل الكلى أو الكبد: أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد لأنك قد تحتاج إلى جرعة أقل.

كبار السن وخاصة أولئك الذين يقل وزنهم عن 50 كغ: إذا كان عرك يتجاوز 65 عامًا وخاصة إذا كان وزنك يقل عن 50 كغ، فقد يحتاج طبيبك إلى متابعة عن كثب.

لا تتجاوز جرعة 400 مغ / يوم.

سيليفي® / برشامة هو دواء خاص بالبالغين فقط ويحظر استعماله للأطفال.

إذا كنت قد أخذت سيليفي®، برشامة أكثر مما ينبغي

لا تأخذ المزيد من البرشامات أكثر مما وصفه طبيبك. إذا أخذت المزيد من البرشامات، استشر طبيبك أو الصيدلي أو المستشفى على الفور وخذ الدواء معك إذا نسيبت أن تأخذ سيليفي®، برشامة

إذا نسيبت أن تأخذ برشامة، هذا حالما تتذكرها. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المفردة التي نسيبت أن تأخذها.

إذا توقفت عن تناول سيليفي®، برشامة

قد يؤدي التوقف المفاجئ عن العلاج بسيليفي إلى تفاقم الأعراض. لا تتوقف عن أخذ سيليفي ما لم يخبرك طبيبك بذلك. قد ينصحك الطبيب بتخفيض الجرعة لبضعة أيام قبل التوقف عن العلاج

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال مع جميع الأدوية، يمكن أن يسبب سيليفي®، برشامة آثارًا جانبية غير أنها لا تخص الجميع. إذا حدث أي من الآثار التالية، يجب إيقاف سيليفي® على الفور والاتصال بالطبيب الخاص بك:

⊗ رد فعل تحسسي مصحوب بطفح جلدي أو تورم في الوجه أو خرخرة أو صعوبة في التنفس.

⊗ مشاكل في القلب قد تتراقق مع الألم في الصدر.

⊗ ألم شديد في المعدة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء بما في ذلك تحول البراز للون الأسود أو وجود الدم فيه، أو القيء.

⊗ رد فعل جلدي مثل الطفح الجلدي أو ظهور فقاعات أو تقشير الجلد.

⊗ فشل الكبد الذي قد تشمل أعراضه الغثيان (الم في القلب) والإسهال واليرقان (اصفرار لون بشرتك أو بياض عينيك).

آثار جانبية أخرى

شائع جدًا: قد يؤثر على أكثر من شخص من كل 10 أشخاص ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك تفاقم ارتفاع ضغط الدم الحالي.

متكرر: قد يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 10 أشخاص: نوبة قلبية، احتباس السوائل مع تورم الكاحلين، التهابات المسالك البولية، ضيق التنفس، التهاب الجيوب الأنفية، نزلات البرد، التهاب الحلق، السعال، نزلة برد، أعراض تشبه الأنفلونزا، الدوار، صعوبة النوم، القيء، اضطراب المعدة، الإسهال، عسر الهضم، انتفاخ البطن، طفح جلدي، حكة، تصلب عضلي، صعوبة في القلب، صداع، غثيان (الم في القلب)، ألم في المفاصل، تفاقم الحساسية الطبيعية، والإصابات العزمية

من غير المؤلف: قد يصيب ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 100 شخص: السكتة الدماغية أو فشل القلب أو الخفقان أو شذوذاً قصص الدم في الكبد أو شذوذاً الكلى أو فقر الدم أو التقيؤ أو الاكتئاب أو التعب أو الغثاس أو الوخز، زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، انخفاض الرؤية أو عدم وضوح الرؤية، قى في الأذنين، ألم في الفم، صعوبة في السمع، الغثاس، تعفن، التهاب في المعدة، تفاقم التهاب المعدة أو الأمعاء، تشنجات الساق، طفح جلدي حكة، التهاب العين، صعوبة في التنفس، لون غير طبيعي للجلد (أزرق)، ألم في الصدر، تورم في الوجه.

نادر: يمكن أن يؤثر على ما يصل إلى شخص من كل 1000 شخص: تقرحات (نزف)، غثاس المريء أو الأمعاء أو تمزق الأمعاء أو البراز الداكن أو

يحتوي على معلومات

الحصول على مزيد

من المعلومات
- تم وصف هذا الدواء لكم. لا تعطوه لأشخاص آخرين، يمكن أن يكون ضاراً لهم حتى إذا كانت علامات مرضهم مماثلة لعلاماتكم
- إذا كانت إحدى الآثار الجانبية خطيرة، أو إذا لاحظتم أن هناك آثار جانبية غير متوقعة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

على ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هي سيليفي®، برشامة وفيما تُستخدم؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيليفي®، برشامة؟
3. كيفية تناول سيليفي®، برشامة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيفية تخزين سيليفي®، برشامة
6. معلومات تكميلية

1. ما هي سيليفي®، برشامة وفيما يُستخدم؟

الصف النسيدي العلاجي: مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مضاد للروماتيزم، كوكسيب،

(رمز: M01AH01 ATC)

يستخدم سيليفي® في البالغين لتخفيف علامات وأعراض الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار التصلبي

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيليفي®، برشامة؟

لا تأخذ أبداً سيليفي®، برشامة في الحالات التالية:

⊗ إذا كنت تعاني من حساسية للسيليكوكسيب أو أي من المكونات الأخرى،

المذكورة في القسم 6

⊗ تاريخ مرضي من الحساسية لفئة من الأدوية تسمى "السلفوناميدات" (تنتهي بعض المضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى لها)،

⊗ قرحة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء

⊗ تاريخ مرضي من الربو، والسلائل في الأنف، احتقان الأنف الحاد أو رد فعل تحسسي مع طفح جلدي مصحوب بحكة، تورم في الوجه والشفتين واللسان أو الرقبة، صعوبة في التنفس أو خرخرة ناتجة عن تناول حمض أسيتيل الساليسليك أو مضادات أخرى غير ستيرويدية لتأثيرات تستخدم للألم،

⊗ الحمل. إذا كان من المحتمل أن تصبحي حاملاً أثناء العلاج، فعليك مناقشة مسألة منع الحمل مع طبيبك.

⊗ الرضاعة الطبيعية

⊗ مرض حاد بالكبد،

⊗ مرض حاد بالكلى،

⊗ مرض التهاب الأمعاء مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون،

⊗ فشل القلب، وأمراض نقص تروية القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تضيق الشرايين، التهابات القلب، والسكتة الدماغية ونوبة نقص تروية عبارة (انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ)، والنزعة الصدرية أو انسداد الأوعية الدموية التي تؤدي لثروبي الموت،

⊗ إذا كنت تعاني من مشاكل الدورة الدموية أو عانيت سابقاً منها (مرض الشرايين الطرفية) أو أجرين جراحة سابقة لشرايين الساقين.

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ سيليفي®، برشامة في الحالات التالية:

⊗ تاريخ مرضي من قرحة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء (لا تأخذ سيليفي®، برشامة إذا كنت تعاني حالياً من قرحة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء)

⊗ استخدام حمض أسيتيل ساليسليك (بما في ذلك الجرعات المنخفضة لحماية القلب)

⊗ إذا كنت تأخذ العلاجات المضادة للصفيحات

⊗ استخدام الأدوية التي تحد من تخثر الدم (مثل الوارفارين / مضادات التخثر من نوع الوارفارين أو مضادات التخثر الفموية الجديدة مثل أبيكسبان)

⊗ استخدام أدوية الكورتيكوستيروئيد (مثل بريدنيزون)

⊗ استعمال سيليفي®، برشامة في نفس الوقت مع مضادات التخثر غير

hydroxo 5000

HYDROXOCOBALAMINE BASE

PPV 58DH50

EXP 04/2026
LOT 31001 1

FORMULAIRE

Hydroxocobalamine Base 0µg
pour une ampoule injectable de 2 ml.

L'Hydroxocobalamine, d'action intense et prolongée, permet d'obtenir imprégnation et stockage tissulaire.

D'autre part, l'emploi de doses massives s'est révélé actif dans le traitement de la plupart des syndromes algiques sévères.

INDICATIONS

Algies : névralgies faciales, algies radiculaires, algies cervico-brachiales, etc.

et d'une façon générale les syndromes algiques intenses.

POSOLOGIE

En moyenne : une ampoule par jour ou tous les deux jours.
Cette posologie peut être portée à deux ampoules par jour sur indication du médecin traitant.

PRÉSENTATION

Boîte de 4 ampoules de 2 ml.

Voie parentérale I.M. - I. V.



Laboratoires **LAPROPHAN S.A.** 21, Rue des Oudaya - Casablanca
Fabriqué au Maroc sous licence des laboratoires **Anphar Rolland**

F47234P230380

D3 نورم[®]

200 UI



على فيتامين D3 التي تساعد على إمتصاص
وتنشيط الجهاز المناعي.
D. فيتامين في حالة النقص في فيتامين D.

نصائح الإستعمال :

يؤخذ حسب توصية أخصائي في الصحة، يحرك جيدا قبل الإستعمال.
تفرغ القطرات مع سائل بارد (حليب، عصير فواكه...) تحتوي القارورة على حاسب للقطرات.
قطرة (1) واحدة = 200 UI

إحتياطات الإستعمال :

- يستعمل كمكمل لتغذية متنوعة.
- إحترام الكمية المنصوح بها.
- يوضع بعيدا عن متناول الأطفال.
- يحفظ بعيدا عن الرطوبة و الحرارة .
- مكمل غذائي ليس بدواء.

صنع من طرف فارمالاتيف ريسورتش إيطاليا .
مستورد وموزع في المغرب من طرف طيرافارم .
رخصة وزارة الصحة رقم : MAV3DMP/CA/18 20211711315

reumadep

INDICATIONS

REUMADEP® est un complément alimentaire à base d'extraits de plantes, proline, manganèse et vitamine D, de la santé des os. La boswellia, la griffe du diable, la griffe de chat, la grande camomille et le frêne contribuent au maintien de la fonction articulaire.

INGRÉDIENTS

Griffe du diable (*Harpagophytum procumbens* DC.) extrait sec de racines tit. à 2,5% d'Harpagoside

Griffe de chat (*Uncaria tomentosa* Willd. ex Schult. DC.) extrait sec d'écorce tit. à 3% d'alcaloïdes d'oxindole

Boswellia (*Boswellia serrata* Roxb.) extrait sec de gomme tit. à 65% d'Ac. Boswellique

Grande camomille (*Tanacetum parthenium* Schultitz-Bip.) extrait sec d'herbe avec fleurs tit. à 0,5% de Parthénolides

Frêne (*Fraxinus excelsior* L.) extrait sec de feuilles tit. à 2% d'Ac. Chlorogénique

Proline

Glucuronate de manganèse

Vitamine D

PROPRIÉTÉS

Griffe du diable et Grande camomille: elles sont connues par leur propriétés anti-inflammatoires et analgésiques en

inhibant la synthèse des prostaglandines. Elles sont utiles en agissant sur les troubles inflammatoires. La griffe du

diable a également une influence positive sur la raideur musculaire pour un confort articulaire.

Griffe de chat: les alcaloïdes contenus dans l'écorce possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Elle permet

de réduire la douleur d'origine inflammatoire.

Boswellie: les acides boswelliques qu'elle contient inhibent l'enzyme responsable de la synthèse des

leucotriènes (médiateurs de l'inflammation articulaire et de l'inflammation en général).

Elle permet de réduire la douleur et un gonflement au niveau des articulations et aide à rétablir leur fonction en

cas d'affections arthritiques.

Frêne: par son action diurétique, il facilite l'élimination du sodium, des chlorures et de l'acide urique. L'acide

chlorogénique qu'il contient exerce une action anti-inflammatoire en cas d'inflammations articulaires et

périarticulaires, tout comme au niveau des ligaments et du liquide synovial.



Produit par: **Erbozeta S.p.A.**

Strada delle Seriole 41/43
47894 Chiesanuova (RSM)
www.erbozeta.com • info@erbozeta.com

Importé au Maroc par: **LC-MED S.A.R.L.**

20 Lot. Saadi Par BVD Cherchaoui
3^{ème} étage, Q1 Bernoussi
30590 Casablanca (Maroc)

REUMADEP® Capsules
Contenu 16,35 g
LOT:
PER:
PPC: 149,50 DH

W044
01/2026

SANS GLUTEN, NATURELLEMENT SANS LACTOSE

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

EMBALLAGE

30 capsules

sur l'emballage.

Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources directes de chaleur. A consommer avant la date indiquée

CONSERVATION

alimentation variée et équilibrée.
mode de vie sain et surtout pas comme substituts d'une
aliments doivent être utilisés dans le cadre d'un
pas dépasser la dose recommandée. Les compléments
Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Ne

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aucun effet secondaire connu associé à l'utilisation du produit; éviter en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs composants du produit.

CONTRE-INDICATIONS

Il est conseillé de prendre 1 capsule par jour après repas.

MODE D'EMPLOI

articulaire.

Vitamine D: la carence en vitamine D est caractérisée par fatigue, réduction de la densité osseuse et douleur

Manganèse: le manque de manganèse comporte un durcissement des cartilages des articulations (surtout du dos et du genou).

des cartilages, des os, des tendons et des ligaments. Il est

la

es

reumadep

INDICATIONS

REUMADEP® est un complément alimentaire à base d'extraits de plantes, proline, manganèse et vitamine D, de la santé des os. La boswellia, la griffe du diable, la griffe de chat, la grande camomille et le frêne contribuent au maintien de la fonction articulaire.

INGRÉDIENTS

Griffe du diable (*Harpagophytum procumbens* DC.) extrait sec de racines tit. à 2,5% d'Harpagoside

Griffe de chat (*Uncaria tomentosa* Willd. ex Schult. DC.) extrait sec d'écorce tit. à 3% d'alcaloïdes d'oxindole

Boswellia (*Boswellia serrata* Roxb.) extrait sec de gomme tit. à 65% d'Ac. Boswellique

Grande camomille (*Tanacetum parthenium* Schultitz-Bip.) extrait sec d'herbe avec fleurs tit. à 0,5% de Parthénolides

Frêne (*Fraxinus excelsior* L.) extrait sec de feuilles tit. à 2% d'Ac. Chlorogénique

Proline

Glucuronate de manganèse

Vitamine D

PROPRIÉTÉS

Griffe du diable et Grande camomille: elles sont connues par leur propriétés anti-inflammatoires et analgésiques en inhibant la synthèse des prostaglandines. Elles sont utiles en agissant sur les troubles inflammatoires. La griffe du diable a également une influence positive sur la raideur musculaire pour un confort articulaire.

Griffe de chat: les alcaloïdes contenus dans l'écorce possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Elle permet de réduire la douleur d'origine inflammatoire.

Boswellie: les acides boswelliques qu'elle contient inhibent l'enzyme responsable de la synthèse des leucotriènes (médiateurs de l'inflammation articulaire et de l'inflammation en général).

Elle permet de réduire la douleur et un gonflement au niveau des articulations et aide à rétablir leur fonction en cas d'affections arthritiques.

Frêne: par son action diurétique, il facilite l'élimination du sodium, des chlorures et de l'acide urique. L'acide chlorogénique qu'il contient exerce une action anti-inflammatoire en cas d'inflammations articulaires et périarticulaires, tout comme au niveau des ligaments et du liquide synovial.



Produit par: **Erbozeta S.p.A.**

Strada delle Seriole 41/43
47894 Chiesanuova (RSM)
www.erbozeta.com • info@erbozeta.com

Importé au Maroc par: **LC-MED S.A.R.L.**

20 Lot. Saadi Par BVD Cherchaoui
3^{ème} étage, Q1 Bernoussi
30590 Casablanca (Maroc)

REUMADEP® Capsules
Contenu 16,35 g
LOT:
PER:
PPC: 149,50 DH

W044
01/2026

SANS GLUTEN, NATURELLEMENT SANS LACTOSE

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources directes de chaleur. A consommer avant la date indiquée sur l'emballage.

EMBALLAGE

30 capsules

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Ne pas dépasser la dose recommandée. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et surtout pas comme substituts d'une alimentation variée et équilibrée.

CONTRE-INDICATIONS

Aucun effet secondaire connu associé à l'utilisation du produit; éviter en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs composants du produit.

MODE D'EMPLOI

Il est conseillé de prendre 1 capsule par jour après repas.

Vitamine D: la carence en vitamine D est caractérisée par fatigue, réduction de la densité osseuse et douleur dos et du genou).

Manganèse: le manque de manganèse comporte un durcissement des cartilages des articulations (surtout du dos et des tendons et des ligaments. Il est essentiel pour préserver la fonction articulaire.

des cartilages, des os, des tendons et des ligaments. Il est

LANZEN® 15 r LANZEN® 30 Lansoprazole

Composition :

Chaque gélule à libération
Lansoprazole.....
Lansoprazole.....
(Sous forme de micro
Excipients q.s.p
Excipient à effet noté

Forme pharmaceutique

Gélules à libération pro

Indications Thérapeutiques :

- Traitement de l'ulcère duodénal
- Traitement de l'œsophagite par reflux
- Prévention de l'œsophagite par reflux
- Eradication de l'*Helicobacter pylori* par administration concomitante d'une antibiothérapie appropriée pour le traitement des ulcères associés à *Helicobacter pylori*
- Traitement de l'ulcère duodénal et de l'ulcère gastrique bénin, induits par les AINS chez des patients nécessitant un traitement continu par AINS.
- Prévention de l'ulcère duodénal et de l'ulcère gastrique induits par les AINS chez des patients à risque (cf Posologie/Mode d'administration) nécessitant un traitement continu par AINS.
- Reflux gastro-œsophagien symptomatique.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.

Contre-indications :

- Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.
- Le lansoprazole ne doit pas être administré avec de l'atazanavir.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Mises en garde :

En raison de la présence du saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'affections chroniques du foie et chez l'enfant.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de soumettre à une surveillance médicale régulière ; celle-ci peut comporter des examens de l'œsophage et/ou de l'estomac : fibroscopie.

Interactions médicamenteuses et autres interactions
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES
INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS
MEDICAMENTS. IL FAUT SIGNALER
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU
A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et Allaitement :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au cours de la grossesse et de l'allaitement.
D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU
COURS DE LA GROSSESSE OU DE
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN



007h

الف
جسولا

14

Effets indésirables :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS AU MOINS GENANTS.

Ont été rapportés :

- De rares cas de diarrhée, nausées, vomissement, douleurs abdominales, constipation,
- De rares cas de maux de tête et exceptionnellement des sensations de vertiges.
- De très rares cas de démangeaisons, éruption cutanée, urticaire,
- Des cas isolés d'élévation réversible des transaminases (enzymes du foie),
- Des cas isolés de diminution dans le sang du nombre de plaquettes ou de globules blancs.
- Ces manifestations, les plus souvent transitoires, sont d'intensité modérée et n'ont qu'exceptionnellement nécessité l'arrêt du traitement.
- De rares cas de gynécomasties (gonflement des seins chez l'homme) ont été signalés.
- D'exceptionnelles diminutions du taux de sodium dans le sang ont été signalées, en particulier chez le sujet âgé.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Surdosage :

En cas d'un surdosage suspecté, le patient doit être surveillé. Le lansoprazole n'est pas significativement éliminé par hémodialyse. Si nécessaire, un lavage gastrique, l'utilisation de charbon actif ainsi qu'un traitement symptomatique sont recommandés.

Conditions de conservation :

A conserver à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.

Conditions de délivrance :

Tableau A (Liste I).

Fabriqué par ZENITH Pharma

96, Zone Industrielle Tassila, Inezgane-Agadir-Maroc
Sous licence Ajanta Pharma Limited
Dr M. EL BOUHADI, Pharmacien Responsable



ERBOZETA
ENERGIA VERDE

Fabrique par:
Erbozeta S.p.A.

Strada delle Seriole, 41/43

47894 Chiesanuova (RSM)

www.erbozeta.com | info@erbozeta.com

Casablanca (Maroc)

Imm B, 4ème Etage N7

134 Angle Route Ouled Ziane & Rue Asswan,

LC-MED

Importé par:

C'est un minéral fondamental pour le corps:
• Il stimule les fonctions nerveuses et musculaires
puisqu'il normalise le pouls et favorise la
transmission régulière des impulsions nerveuses
avec pour conséquence un équilibre des fonctions
nervuses.
• Il contribue à maintenir l'équilibre eau-acide dans
le corps.
• Il joue un rôle fondamental dans le métabolisme
énergétique.
• Il participe au processus de développement des os.
• Il peut réduire la douleur liée au syndrome
préménstruel.
Le mélange de magnésium contenu dans cette
formule le rend facilement absorbable par le corps.

PROPRIÉTÉS Magnésium

Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 1,40 mg
équivalent en magnésium50,0 mg
sulfate, chlorure)90,91 mg
Magnésium marin (oxyde, hydroxyde, carbonate,
équivalent en magnésium50,0 mg
Carbonate de magnésium196,10 mg
équivalent en magnésium50,0 mg
Oxyde de magnésium257,05 mg
équivalent en magnésium155,0 mg
Citrate de magnésium294,12 mg
équivalent en magnésium45,0 mg

INGRÉDIENTS

TETRAMAG est un complément alimentaire à base
de magnésium. Le magnésium aide à réduire la
fatigue et contribue au maintien en bonne santé des
os et des dents. De plus, le magnésium contribue
au bon fonctionnement du système nerveux,
du métabolisme énergétique et de la fonction
musculaire.

INDICATIONS

tetra
Mag
300 mg

UN MÉDICAMENT

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS

EMBALLAGE

30 capsules

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec, loin de sources
directes de chaleur, à une température au dessous de
25°C. Date de péremption indiquée sur l'emballage
extérieur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de la portée des enfants de moins
de 3 ans. Ne pas dépasser la dose recommandée.
Les compléments alimentaires doivent être utilisés
dans le cadre d'un mode de vie sain et non pas
comme substituts d'une alimentation variée
et équilibrée.

CONTRE-INDICATIONS

Aucun effet secondaire connu associé à l'utilisation
du produit ; à éviter en cas d'hypersensibilité connue
à un ou plusieurs composants du produit.

MODE D'EMPLOI

Il est conseillé de prendre 1 capsule par jour, loin
des repas.

ammoniac, des acides gras
à la formation normale des hormones et des graisses
blanches et rouges ainsi qu'à la réduction de la fatigue.
La vitamine B6 joue un rôle fondamental dans
la création d'une barrière immunitaire de défense
contre les maladies; elle stimule les fonctions
cérébrales et prévient le vieillissement.

TETRAMAG 30 CAPSULES

Complément alimentaire

Poids net 29,19 g

LOT:

PER:

PPC: 95,00 DH

U035
01/2025



LES

Lyrica



Notice : Information de l'utilisateur

Lyrica 25 mg gélule Lyrica 75 mg gélule Lyrica 150 mg gélule Lyrica 300 mg gélule

prégabaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Lyrica et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lyrica ?
3. Comment prendre Lyrica ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Lyrica ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si
N'a
vo
1
A
S

Lyrica® 75 mg - 56 gélules
P.P.V : 307,00 DH



le demande.
ressive pendant

Lyrica, vous devez
les effets comprennent
e sensation d'anxiété, de
ns, de la nervosité, de la
dissements. Ces symptômes
sévère lorsque Lyrica est

questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Très fréquents : susceptibles d'affecter plus d'1 personne sur 10

- étourdissements, somnolence, maux de tête

Fréquents : susceptibles d'affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- augmentation de l'appétit
- sensation d'euphorie, état confusionnel, désorientation, diminution de la libido, irritabilité
- troubles de l'attention, maladresse, troubles de la mémoire, perte de mémoire, tremblements, difficulté à parler, sensation de picotement, engourdissement, sédation, léthargie, insomnie, fatigue, sensations anormales
- vision floue, vision double
- vertiges, troubles de l'équilibre, chutes
- sécheresse de la bouche, constipation, vomissements, flatulences, diarrhée, nausées, ballonnement
- troubles de l'érection
- gonflement du corps y compris des extrémités
- sensation d'ivresse, troubles de la marche
- prise de poids
- crampes musculaires, douleurs articulaires, douleurs dorsales, douleurs dans les membres
- mal de gorge

jusqu'à 1 personne sur 100