

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W21-801167



Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

8977

Société :

RAM

172367

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

JENJARE KHALID

Date de naissance :

18.11.1969

Adresse :

Elie Jribi nbracer zed vilay

Tél. :

066059 8499

Total des frais engagés : 5531 1968 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

24/05 / 2023

Nom et prénom du malade :

JENJARE KHALID

Age : 58

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

HTA D/G arthrose

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

MARAKA 2023

Le : 21/08/2023

Signature de l'adhérent

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24 MAI 2023	Généraliste	30024 G.75	300,24	INP : 091174714 Dr. YOUSSEF ALI Cardiologue fonctionnel Les Val d'Asnières 92137 Tél : 01 41 43 10 00 INPE : 00194002000002

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL KARIM El Karim - Tel: 05 22 89 56 87	24.05.23	1608,30

INPE : 092043308

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		
G		

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Youssef ALLALI

Cardiologue interventionnel

Ancien cardiologue des hôpitaux de Paris

Diplômé des Universités de Paris en Cardiologie interventionnelle

Diplômé des Universités de Paris en écho-doppler Cardio-vasculaire



الدكتور يوسف عالي

أخصائي في العمليات التدخلية للقلب والشرايين

حاصل على دبلوم قسطرة القلب وتوسيع الشرايين بجامعة باريس

حاصل على دبلوم الصدى بالألوان للقلب والشرايين بجامعة باريس

Casablanca le :

Dr. YOUSSEF ALLALI - 24 MAI 2023

270,00 x 3

1/

Copilox 75 / 100

145

start de

9760 x 3

2/

Avastine 20 : 145

3 مل

5070 x 1

3/

Gandenel 2,5 : 145

دكتور

YOUSSEF ALLALI

Cardiologue

Rés VAL ROSE

(Place AL YASSIR)

Tél / Fax : 05 22 24 13 71

INPE : 091174714 - TCE : 001940020000042

Dr. YOUSSEF ALLALI
Cardiologue
Rés VAL ROSE
(Place AL YASSIR)
Tél / Fax : 05 22 24 13 71
INPE : 091174714 - TCE : 001940020000042

1608,30

PHARMACIE EL HAMMI
Mr. Fouad El Hammam
Bd. Essalam Et Casablanca - Tel: 05 22 89 66 87

دكتور
YOUSSEF ALLALI
Cardiologue
Rés VAL ROSE
(Place AL YASSIR)
Tél / Fax : 05 22 24 13 71
INPE : 091174714 - TCE : 001940020000042

INPE : 091174714

TCE : 001940020000042

Sur Rendez-vous

العنوان : إقامة فار روز - أ الطابق الثاني - زاوية شارع محمد الخامس وساحة آل ياسر بالقدير الدار البيضاء

Adresse : Résidence VAL ROSE - A - 2^{ème} étage Angle Albert Premier (Place AL YASSIR) et Bd. Mohamed V Belvédère, Casablanca.

Tél.: 05 22 24 13 71 - Fax : 05 22 24 13 71 - E-mail : cabinetyoussefallali@hotmail.fr

PPV: 97DH60
PER: 02/25
LOT: M602-2

PPV: 97DH60
PER: 05/25
LOT: M151B

PPV: 97DH60
PER: 10/24
LOT: L3578-2

15A, 60

15A, 60

15A, 60

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
CoPlavix 75mg/100mg
b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

5 113001 082018

le cerveau.

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimi

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque hémorragique
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac).
 - des troubles de la coagulation internes (saignement au sein d'une articulation).
 - une blessure grave récente.
 - une intervention chirurgicale.
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans une artère ou une veine (accident vasculaire cérébral ischémique).
- si vous présentez une maladie hépatique.
- si vous avez des antécédents d'allergies, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'interaction avec l'acide acétylsalicylique.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille des déficit en déshydrogénase (ou déficit en alcool déshydrogénase) qui peuvent développer une forme particulière de maladie dans le sang en faible quantité).

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin
 - si une intervention chirurgicale est nécessaire.
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges ou dans l'intestin).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie (accident vasculaire cérébral ou thrombotique ou PTT) induant une apparition comme des petites tumeurs dans les yeux, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous pincez, vous pouvez demander plus de temps pour que l'effet de l'action de votre médicament soit diminué. Dans le cas de coupures ou de brûlures, constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les caillots sanguins.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
CoPlavix 75mg/100mg
b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

5 113001 082018

le cerveau.

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimi

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque hémorragique
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac).
 - des troubles de la coagulation internes (saignement au sein d'une articulation).
 - une blessure grave récente.
 - une intervention chirurgicale.
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans une artère ou une veine (accident vasculaire cérébral ischémique).
- si vous présentez une maladie hépatique.
- si vous avez des antécédents d'allergies, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'interaction avec l'acide acétylsalicylique.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille des déficit en déshydrogénase (ou déficit en alcool déshydrogénase) qui peuvent développer une forme particulière de maladie dans le sang en faible quantité).

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin
 - si une intervention chirurgicale est nécessaire.
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges ou dans l'intestin).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie (accident vasculaire cérébral ou thrombotique ou PTT) induant une apparition comme des petites tumeurs dans les yeux, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous pincez, vous pouvez demander plus de temps pour que l'effet de l'action de votre médicament soit diminué. Dans le cas de coupures ou de brûlures, constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les caillots sanguins.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
CoPlavix 75mg/100mg
b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

5 113001 082018

le cerveau.

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimi

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque hémorragique
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac).
 - des troubles de la coagulation internes (saignement au sein d'une articulation).
 - une blessure grave récente.
 - une intervention chirurgicale.
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans une artère ou une veine (accident vasculaire cérébral ischémique).
- si vous présentez une maladie hépatique.
- si vous avez des antécédents d'allergies, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'interaction avec l'acide acétylsalicylique.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille des déficit en déshydrogénase (ou déficit en alcool déshydrogénase) qui peuvent développer une forme particulière de maladie dans le sang en faible quantité).

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin
 - si une intervention chirurgicale est nécessaire.
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges ou dans l'intestin).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie (accident vasculaire cérébral ou thrombotique ou PTT) induant une apparition comme des petites tumeurs dans les yeux, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous pincez, vous pouvez demander plus de temps pour que l'effet de l'action de votre médicament soit diminué. Dans le cas de coupures ou de brûlures, constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les caillots sanguins.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe des bêtabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines stimuli, comme le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans le corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque et d'autres maladies cardiaques nécessitant l'utilisation de médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir la liste des ingrédients ci-dessous),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de pâlissement ou virer au bleu),
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute ou à la mort.

Faites attention avec CARDENSIEL :

Si vous présentez l'une des affections suivantes, indiquez-le à votre médecin ou à votre pharmacien, car elles peuvent nécessiter un traitement complémentaire ou une surveillance particulière (par exemple, vous prescrire un traitement complémentaire ou une surveillance particulière).

- diabète,
- jeûne strict,
- certaines maladies du cœur, comme les troubles du rythme cardiaque, ou les maladies cardiaques chroniques,
- problèmes rénaux ou hépatiques,
- troubles moins sévères de la circulation sanguine périphérique.