

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2538

Société : Ret RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KACHANI MUSTAPHA

Date de naissance : 01/01/1951

Adresse : JAMILA 5 Rue 145 N° 28 C.D. Djema CASA 04

Tél. : 0667 02 88 96

Total des frais engagés : 342,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

**Dr. BENBOUBKER KAZMANE Adiba**  
Médecine générale - Diabetologie  
Permis de Conduire  
Jamilia 5 Rue 145 N° 110 C.D - Casa  
Tel: 05 22 37 16 61

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24/07/2023

Nom et prénom du malade : KACHANI KHADIJA

Age: 1984

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : HTA

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 29 AOUT 2023

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/07/23	C		150 N <sup>o</sup> DR. BENBOUEKER KALMA AL Adiba Médecine générale - Diabetologie Permis de Conduire Jamila 5 Rue 145 N <sup>o</sup> 10 C.D - Casa T: 05 22 37 16 61	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACEUTIQUE EL MOATAZ Dr. BEN M'RANE HANAN Jamilia V, Rue 165, N°38, C.D. Casablanca - Tél.: 05 22 59 53 00	24/09/23	192,6-

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Benboubker Kazmane Adiba

MEDECINE GENERALE

Echographie

Expert Assermentée



الدكتورة بنبوبكر قزمان أديبة

الطب العام

الايكوغرافي

خبيرة لدى المحاكم

Casablanca, le 24/07/2023

نسمة KACHANI Khadija

64120 X3

1) An ane plus 50mg/12,5mg  
1 v/1 j pd 3 mois

AS

TTs 192,60

PHARMACIE IBN EL MOATAZ  
Dr. BENKORANE HANAN  
Jamila V, Rue 165, N°38 C.D  
Casablanca - Tel.: 05 22 59 53 00

Dr. BENBOUBKER KAZMANE Adiba  
Médecine générale - Diabetologie  
Permis de Conduire  
Jamila 5 Rue 145 N° 110 C.D - Casa  
Tel : 05 22 37 16 61

Jamila 5 - Rue 145 N°110 Cité Djemaa - Casablanca - Tél : 05 22 37 16 61

جميلة 5 زنقة 145 رقم 110 قرية الجماعة - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 37 16 61

# ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

## FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcrystalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stéarate, opadry OY jaune

Excipient à effet notoire : Lactose.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

## INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

## CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anurie.

## MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

### Voie orale.

- **Dose initiale :** 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous êtes (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie entraînant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

### Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'Hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets. L'administration concomitante de diurétiques épargeant de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antalgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la clozapine ou un sei de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramine. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

## EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

### Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématurate et de l'hémoglobine.

### Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Névrosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctive, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinite, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, alopecie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

### Rare

- Hépatite.

## Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

### Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous avez ou avez des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

## Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

## SURDOSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypertension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypochlorémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent entraîner une augmentation de la pénétration de la peau.

## CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas, n'en dosez sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

CECI EST UN MÉDICAMENT

LOT : 156  
PER : 01/26  
PPV : 64,20 DH

30 comprimés pelliculés



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA

Z.I.I.2 Mellil -Casablanca-

# ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

## FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcrystalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stéarate, opadry OY jaune

Excipient à effet notoire : Lactose.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

## INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

## CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anurie.

## MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

### Voie orale.

- **Dose initiale :** 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous êtes (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie entraînant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

### Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'Hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets. L'administration concomitante de diurétiques épargeant de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antalgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la clozapine ou un sei de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramine. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

## EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

### Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématurate et de l'hémoglobine.

### Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Névrosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctive, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinite, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, alopecie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

### Rare

- Hépatite.

## Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

### Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous avez ou avez des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

**Grossesse :** Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

## Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

## SURDOSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypertension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypochlorémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

## CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent entraîner une augmentation de la pénétration.

## CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

CECI EST UN MÉDICAMENT

LOT : 156  
PER : 01/26  
PPV : 64,20 DH

30 comprimés pelliculés



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA

Z.I.I.2 Mellil -Casablanca-

# ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

## FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stéarate, opadry OY jaune

Excipient à effet notoire : Lactose.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

## INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

## CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anurie.

## MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- **Dose initiale :** 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous êtes (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie entraînant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

## Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'Hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets. L'administration concomitante de diurétiques épargeant de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antalgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la clozapine ou un sei de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramine. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

## EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

### Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématurate et de l'hémoglobine.

### Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Névrosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctive, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinite, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, alopecie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

### Rare

- Hépatite.

## Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

## Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous avez ou avez des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

## Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

## SURDOSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypertension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypochlorémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

## CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent entraîner une augmentation de la pénétration.

## CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

CECI EST UN MÉDICAMENT

LOT : 156  
PER : 01/26  
PPV : 64,20 DH

30 comprimés pelliculés



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA

Z.I.I.2 Tit Mellil -Casablanca-