

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M23-004942

176300

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10855 Société : RAN
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : PNC Réformé
 Nom & Prénom : ABBOU NAWAL
 Date de naissance : 03/03/77
 Adresse : 06 Rue Abdelhak ben Nafyu Apt 9 Residence EL Houda Quaker Palmier Casa
 Tél. : 0662737896 Total des frais engagés : 702,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation : 8 SEP. 2023
 Nom et prénom du malade : ABBOU LICHA Age : 73
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☒ Enfant
 Nature de la maladie : trouble anxieux
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : / /

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8 SEP 2023	cf	300	13	PSYCHOTRANSMUTATION Appl N° 11 RABAT Tél: 05 37 20 00 25 INPE : 101110294

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

8/9/23

402.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre Montant détaillé des Honoraires

AM PC IM IV

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 G
35533411 11433553
B

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



نو- ديب 50

سيرترالين

التركيبية:

سيرترالين هيدروكلوريد 50 ملغ للقرص الواحد .
السواغات: سليولز الجريزوفولفين ، نشا الذرة ، صوديوم ، ستيرات المغنيزيوم ، طالك ، أيدروكسي بروبييل ميثيل سليولن ، E-15 ، انديكو كارمين لايك ، ثاني أكسيد التيتان ، بروبيلين غليكول ، ايزوبروبيل ، ماء مطهر .

الشكل و التقديم:

نو- ديب 50 ملغ عبارة عن أقراص ملبسة قابلة للكسر، علب من 15 و 30 و 60 قرصا .

وصف الدواء:

المكون الفعال لدواء نو- ديب 50 ® هو سيرترالين . وسيرترالين تنتمي لمجموعة دوائية يطلق عليها مثبطات استرجاع السيروتونين الانتقائية (ISRS) (اي اس اراس) وتستخدم هذه الأدوية لعلاج الاكتئاب و / أو اضطرابات القلق .

دواعي الإستعمال:

يستخدم هذا الدواء في علاج:

- نوبات الاكتئاب الكبرى .
- الوقاية من تكرار نوبات الاكتئاب الكبرى .
- اضطراب الهلع مع أو بدون الخوف من الأماكن المكشوفة .
- الوسواس القهري لدى البالغين و الأطفال من 6 إلى 17 سنة .
- اضطراب القلق الاجتماعي .
- اضطراب الكرب ما بعد الصدمة .

المقايير وكيفية الإستعمال:

يمكن تناول أقراص سيرترالين خلال الوجبات أو خارجها .

يجب تناول الدواء مرة واحدة في اليوم، صباحا أو مساء .

الجرعة المعتادة هي :

لدى البالغين:

الاكتئاب والوسواس القهري :

في حالة الاكتئاب والوسواس القهري ، الجرعة الأولية من الدواء هي 50 ملغ عن طريق الفم مرة في اليوم ،

ويمكن زيادة الجرعة بمقدار 50 ملغ كل أسبوع أو أكثر . وقد تصل الجرعة إلى 200 ملغ مرة في اليوم كحد أقصى .

اضطرابات الهلع والقلق الاجتماعي وحالة اضطراب الكرب ما بعد الصدمة :

في حالات اضطرابات الهلع و اضطراب القلق الاجتماعي و اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ، ينبغي أن يبدأ العلاج بجرعة 25 ملغ في اليوم ، والتي يمكن زيادتها إلى 50 ملغ في اليوم بعد أسبوع واحد .

ويمكن بعد ذلك زيادة الجرعة بمقدار 50 ملغ كل أسبوع أو أكثر . وقد تصل الجرعة إلى 200 ملغ مرة في اليوم كحد أقصى .

لدى الأطفال والمراهقين :

يستعمل دواء نو- ديب ® فقط لعلاج الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الوسواس القهري و البالغين من العمر ما بين 6 و 17 سنة .

الوسواس القهري :

• الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 12 سنة: الجرعة الأولية الموصى بها هي 25 ملغ مرة واحدة يوميا . بعد أسبوع، قد يقرر طبيبك زيادة الجرعة إلى 50 ملغ في اليوم . الجرعة القصوى هي 200 ملغ في اليوم .

• الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة: الجرعة الأولية الموصى بها هي 50 ملغ في اليوم . الجرعة القصوى هي 200 ملغ في اليوم .

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو قصور كلوي، يجب إخبار الطبيب عنها و اتباع تعليماته .

مدة العلاج: يحدد لك طبيبك المدة التي ينبغي لك أن تأخذ خلالها هذا الدواء ، وذلك بناء على طبيعة مرضك وكيف تستجيب للعلاج . قد تحتاج لعدة أسابيع حتى تبدأ في التحسن . بصفة عامة ، ينبغي أن يستمر علاج الاكتئاب لمدة 6 أشهر بعد التحسن .

موانع الإستعمال:

• الحساسية المفرطة للمكون الفعال لهذا الدواء أو لأحد من السواغات .

• العلاج المتزامن مع مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين، بما في ذلك سيليجيلين و موكلوبيد ، أو عند استعمال أي دواء من نوع مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين مثال لينزوليد .

• الاستعمال المتزامن لعقار بيموزيد .

تحذيرات خاصة واحتياطات الإستعمال:

أخبر طبيبك قبل البدء بتناول نو- ديب ® إذا كنت تعاني من أي مما يلي :

• الصرع أو اضطرابات تشنجية سابقة .

• إذا كنت تعاني من مرض الاضطراب ثنائي القطب أو الفصام .

• إذا فكرت أو كنت تفكر في إيذاء نفسك أو في الإنتحار .

• متلازمة السيروتونين: في حالات نادرة قد تحدث هذه المتلازمة عندما يتم تناول بعض الأدوية مع سيرترالين .

• إذا كان تركيز الصوديوم في الدم منخفض، لأن ذلك قد يحدث نتيجة للعلاج بنو- ديب ® . يجب عليك أيضا إخبار طبيبك إذا كنت تأخذ بعض الأدوية ضد ارتفاع ضغط الدم والتي قد تؤثر أيضا على تركيز الصوديوم في الدم .

• اتخاذ احتياطات خاصة إذا كنت من كبار السن لأنه يمكن أن تتعرض لخطر أكبر فيما يخص انخفاض تركيز الصوديوم في الدم .

• مرض الكبد: قد يقرر طبيبك معالجتك بجرعة أقل من دواء نو- ديب ® .

• مرض السكري: قد يتسبب تناول نو- ديب ® في تعديل تركيز الكليكون في الدم و قد ذلك يتطلب تكيف العلاج ضد مرض السكري .

• إذا كنت تعاني من اضطرابات النزيف أو إذا كنت تتناول الأدوية المضادة لتخثر الدم (مثل الأسبرين أو الوارفارين) أو الأدوية التي قد تزيد من خطر النزيف .

• الأطفال والمراهقون أقل من سن 18 سنة . لا يجب استخدام نو- ديب ® في علاج الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 سنة إلا إذا كانوا يعانون من اضطراب الوسواس القهري . إذا كنت تتعالم من هذا الاضطراب، يفترض أن يقوم الطبيب المعالج بتتبع الحالة بشكل دقيق .

• إذا كنت تتلقى علاجاً بالتخليج الكهربائي .

• إذا كانت لديك مشاكل في العين مثل الزرق (ارتفاع الضغط في العين)

التفاعلات الدوائية:

- ينبغي أن تنتظر مدة أسبوعين على الأقل بين توقفك عن تناول مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين و البدء في العلاج بالسيرترالين وأسبوع واحد على الأقل بين إيقاف العلاج بالسيرترالين و البدء في تناول مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين .

لتجنب أية تفاعلات محتملة بين عدة أدوية، يجب عليك إخبار طبيبك أو الصيدلي بشكل مستمر بأي علاج آخر تستعمله .

الحمل والرضاعة:

تخير المريضة طبيبها في حالة الحمل .

لا ينصح بالرضاعة الطبيعية أثناء العلاج .

التأثير على القدرة على القيادة وإستعمال الآلات:

هذا الدواء قد يؤثر على القدرات العقلية و البدنية اللازمة لأداء المهام الخطرة ، مثل التعامل مع الأجهزة أو قيادة السيارات .

الآثار الجانبية:

كما هو الحال مع كافة الأدوية ، فقد تنتج آثار جانبية مع نو- ديب في شكل أقراص ملبسة قابلة للكسر ، رغم أنها لا تخص كافة الأشخاص . الآثار الجانبية ترتبط بالجرعة و تختفي أو تقل في كثير من الأحيان مع استمرار العلاج . الآثار الجانبية الأكثر حدوثا هي: الأرق والدوخة والحمول والصداع والإسهال والغثيان وجفاف الفم وعدم الغثف والتعب .

ينصح بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأية أعراض جانبية .

إذا توقفت فجأة عن تناول هذا الدواء ، فقد تواجه آثار جانبية مثل الدوخة و نقصان الحس و اضطرابات النوم و الهيجان أو القلق و الصداع و الشعور بالغثيان ، و الرعشة . الرجاء إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بهذه الآثار الجانبية .

الإفراط في المقايير:

في حالة الإفراط في المقايير، اتصلوا بمركز محاربة التسمم بالمغرب (0537 68 64 64)

التخزين:

يحتفظ بهذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية و بعيدا عن متناول الأطفال .

جدول أ قائمة (1)



نو- ديب 50

سيرترالين

التركيبية:

سيرترالين هيدروكلوريد 50 ملغ للقرص الواحد.
السواغات: سليولوز الجريزوفولفين ، نشا الذرة ، صوديوم ، ستيرات المغنيزيوم ، طالك ، أيدروكسي بروبيل ميثيل سليولون E-15 ، انديكو كارمين لايك ، ثاني أكسيد التيتان ، بروبيلين غليكول ، ايزوبروبيل ، ماء مطهر .

الشكل و التقديم:

نو- ديب 50 ملغ عبارة عن أقراص ملبسة قابلة للكسر، علب من 15 و 30 و 60 قرصا.

وصف الدواء:

المكون الفعال لدواء نو- ديب 50 ® هو سيرترالين . وسيرترالين تنتمي لمجموعة دوائية يطلق عليها مثبطات استرجاع السيروتونين الانتقائية (ISRS) (اي اس اراس) وتستخدم هذه الأدوية لعلاج الاكتئاب و / أو اضطرابات القلق .

دواعي الإستعمال:

يستخدم هذا الدواء في علاج:

- نوبات الاكتئاب الكبرى .
- الوقاية من تكرار نوبات الاكتئاب الكبرى .
- اضطراب الهلع مع أو بدون الخوف من الأماكن المكشوفة .
- الوسواس القهري لدى البالغين و الأطفال من 6 إلى 17 سنة .
- اضطراب القلق الاجتماعي .
- اضطراب الكرب ما بعد الصدمة .

المقايير وكيفية الإستعمال:

يمكن تناول أقراص سيرترالين خلال الوجبات أو خارجها.

يجب تناول الدواء مرة واحدة في اليوم، صباحا أو مساء .

الجرعة المعتادة هي :

لدى البالغين:

الاكتئاب والوسواس القهري :

في حالة الاكتئاب والوسواس القهري ، الجرعة الأولية من الدواء هي 50 ملغ عن طريق الفم مرة في اليوم ،

ويمكن زيادة الجرعة بمقدار 50 ملغ كل أسبوع أو أكثر. وقد تصل الجرعة إلى 200 ملغ مرة في اليوم كحد أقصى.

اضطرابات الهلع والقلق الاجتماعي وحالة اضطراب الكرب ما بعد الصدمة :

في حالات اضطرابات الهلع و اضطراب القلق الاجتماعي و اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ، ينبغي أن يبدأ العلاج بجرعة 25 ملغ في اليوم ، والتي يمكن زيادتها إلى 50 ملغ في اليوم بعد أسبوع واحد .

ويمكن بعد ذلك زيادة الجرعة بمقدار 50 ملغ كل أسبوع أو أكثر. وقد تصل الجرعة إلى 200 ملغ مرة في اليوم كحد أقصى.

لدى الأطفال والمراهقين :

يستعمل دواء نو- ديب ® فقط لعلاج الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الوسواس القهري و البالغين من العمر ما بين 6 و 17 سنة.

الوسواس القهري :

• الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 12 سنة: الجرعة الأولية الموصى بها هي 25 ملغ مرة واحدة يوميا . بعد أسبوع، قد يقرر طبيبك زيادة الجرعة إلى 50 ملغ في اليوم . الجرعة القصوى هي 200 ملغ في اليوم .

• الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة: الجرعة الأولية الموصى بها هي 50 ملغ في اليوم . الجرعة القصوى هي 200 ملغ في اليوم .

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو قصور كلوي، يجب إخبار الطبيب عنها و اتباع تعليماته .

مدة العلاج: يحدد لك طبيبك المدة التي ينبغي لك أن تأخذ خلالها هذا الدواء، وذلك بناء على طبيعة مرضك وكيف تستجيب للعلاج. قد تحتاج لعدة أسابيع حتى تبدأ في التحسن . بصفة عامة ، ينبغي أن يستمر علاج الاكتئاب لمدة 6 أشهر بعد التحسن.

موانع الإستعمال:

• الحساسية المفرطة للمكون الفعال لهذا الدواء أو لأحد من السواغات .

• العلاج المتزامن مع مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين، بما في ذلك سيليجيلين و موكلوبيد ، أو عند استعمال أي دواء من نوع مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين مثال لينزوليد .

• الاستعمال المتزامن لعقار بيموزيد .

تحذيرات خاصة واحتياطات الإستعمال:

أخبر طبيبك قبل البدء بتناول نو- ديب ® إذا كنت تعاني من أي مما يلي :

• الصرع أو اضطرابات تشنجية سابقة .

• إذا كنت تعاني من مرض الاضطراب ثنائي القطب أو الفصام .

• إذا فكرت أو كنت تفكر في إيذاء نفسك أو في الإنتحار .

• متلازمة السيروتونين: في حالات نادرة قد تحدث هذه المتلازمة عندما يتم تناول بعض الأدوية مع سيرترالين .

• إذا كان تركيز الصوديوم في الدم منخفض، لأن ذلك قد يحدث نتيجة للعلاج بنو- ديب ®. يجب عليك أيضا إخبار طبيبك إذا كنت تأخذ بعض الأدوية ضد ارتفاع ضغط الدم والتي قد تؤثر أيضا على تركيز الصوديوم في الدم .

• اتخاذ احتياطات خاصة إذا كنت من كبار السن لأنه يمكن أن تتعرض لخطر أكبر فيما يخص انخفاض تركيز الصوديوم في الدم .

• مرض الكبد: قد يقرر طبيبك معالجتك بجرعة أقل من دواء نو- ديب ®.

• مرض السكري: قد يتسبب تناول نو- ديب ® في تعديل تركيز الكليكون في الدم و قد ذلك يتطلب تكيف العلاج ضد مرض السكري.

• إذا كنت تعاني من اضطرابات النزيف أو إذا كنت تتناول الأدوية المضادة لتخثر الدم (مثل الأسبرين أو الوارفارين) أو الأدوية التي قد تزيد من خطر النزيف .

• الأطفال والمراهقون أقل من سن 18 سنة . لا يجب استخدام نو- ديب ® في علاج الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 سنة إلا إذا كانوا يعانون من اضطراب الوسواس القهري . إذا كنت تتعالج من هذا الاضطراب، يفترض أن يقوم الطبيب المعالج بتتبع الحالة بشكل دقيق.

• إذا كنت تتلقى علاجاً بالتخليج الكهربائي.

• إذا كانت لديك مشاكل في العين مثل الزرق (ارتفاع الضغط في العين)

التفاعلات الدوائية:

- ينبغي أن تنتظر مدة أسبوعين على الأقل بين توقفك عن تناول مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين و البدء في العلاج بالسيرترالين وأسبوع واحد على الأقل بين إيقاف العلاج بالسيرترالين و البدء في تناول مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين.

لتجنب أية تفاعلات محتملة بين عدة أدوية، يجب عليك إخبار طبيبك أو الصيدلي بشكل مستمر بأي علاج آخر تستعمله.

الحمل والرضاعة:

تخير المريضة طبيبها في حالة الحمل.

لا ينصح بالرضاعة الطبيعية أثناء العلاج .

التأثير على القدرة على القيادة وإستعمال الآلات:

هذا الدواء قد يؤثر على القدرات العقلية و البدنية اللازمة لأداء المهام الخطرة ، مثل التعامل مع الأجهزة أو قيادة السيارات.

الآثار الجانبية:

كما هو الحال مع كافة الأدوية ، فقد تنتج آثار جانبية مع نو- ديب في شكل أقراص ملبسة قابلة للكسر ، رغم أنها لا تخص كافة الأشخاص.

الآثار الجانبية ترتبط بالجرعة و تختفي أو تقل في كثير من الأحيان مع استمرار العلاج . الآثار الجانبية الأكثر حدوثا هي: الأرق والدوخة والخمول والصداع و الإسهال والغثيان وجفاف الفم وعدم القذف والتعب.

ينصح بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأية أعراض جانبية.

إذا توقفت فجأة عن تناول هذا الدواء ، فقد تواجه آثار جانبية مثل الدوخة و نقصان الحس و اضطرابات النوم و الهيجان أو القلق و الصداع و الشعور بالغثيان ، و الرعشة . الرجاء إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بهذه الآثار الجانبية.

الإفراط في المقايير:

في حالة الإفراط في المقايير، اتصلوا بمركز محاربة التسمم بالمغرب (0537 68 64 64)

التخزين:

يحتفظ بهذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية وبعيدا عن متناول الأطفال.

جدول أ قائمة (I)

Professeur Jamal MEHSSANI

Psychiatre - Psychothérapeute

Pédopsychiatrie - Addictologie

**Ancien Chef de l'Unité de Pédopsychiatrie à
l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V - Rabat**

الأستاذ جمال المحساني

طبيب نفسي

**الطب النفسي للأطفال - علاج الإدمان
رئيس وحدة الطب النفسي للأطفال سابقا
بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط**

8 SEP. 2023

Rabat,

**Professeur Jamal MEHSSANI
Psychiatre - Psychothérapeute
3, Av. Moulay Ismail Appt. N° 11
RABAT - Tél.: 05 37 20 00 25
INPE : 101110294**

ANNOU LILA

**201.00 x 2
402.00**

No Def So

**26
633476
12/9/23**

1-0-0

**Pharmacie - Parapharmacie
RIAD ASSALAM
Av. Al Araar, Secteur 12, Bloc R, Hay Riad
Tél : 05 37 56 35 82**

**Professeur Jamal MEHSSANI
Psychiatre - Psychothérapeute
3, Av. Moulay Ismail Appt. N° 11
RABAT - Tél.: 05 37 20 00 25
INPE : 101110294**

**x 3 u
=**

**عمارة 3، شارع مولاي اسماعيل الطابق الثاني شقة رقم 11 ساحة باب الملاح - الرباط
3, Avenue Moulay Ismail 2^{ème} étage Appt. n°11 Place Bab Mellah - Rabat**

الهاتف : 05 37 20 00 25 - 06 61 77 58 33 البريد الإلكتروني : jamal.mehssani@gmail.com