

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES RÉMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-653134

176991

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1103 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : BENTALHA FATIMA Vve HIRRIZI Med

Date de naissance :

Adresse : BP 70636 complexe Med II Hassan II Casablanca

Tél. : 0676097300 Total des frais engagés : 1721,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Cas Le : 13/09/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/09/2023	Cos 2706		40000	INP : 091066621

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE RESULTANT 418 Avenue M... Casablanca 05 22 22 54 105 22 840	13/09/23	1321.70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX																
				MONTANTS DES SOINS																
				DEBUT D'EXECUTION																
				FIN D'EXECUTION																
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																			
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																			
	25533412	21433552																		
	00000000	00000000																		
	D																			
	00000000	00000000																		
	35533411	11433553																		
	B																			
	G																			
	[Création, remont, adjonction]			MONTANTS DES SOINS																
Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS																	
			DATE DE L'EXECUTION																	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Centre de Rythmologie
de Casablanca

URAGENCES

24/24

05 22 36 09 09

Dr Najib GARTI

Cardiologue - Rythmologue

Pace Maker

Défibrillateurs

Cryoablation de la Fibrillation
auriculaire

Traitement des troubles du rythme
par Radiofréquence

Echocardiographie Doppler Couleur

Epreuve d'effort

Holter tensionnel et rythmique

Diplômé de la faculté de médecine
de limoges (France)

Sur Rendez - Vous

Gsm : 06 61 32 64 27

LOT 10104 1
EXP 12 2025
PPV 35.70

Casablanca, le 13/9/2023

Mr (Mme)

1. BENTALHA

Fahme

3x269.3

Coveram 10/5

1 cp'

201.00

126.8 MDER

50

1 cp'

012 965

4x37.8 Sednal

50

1 cp'

35.00 Alprax

50

7/2

012 966

1321.7

HARMACIE MERSULIA
18, Avenue Mers Sultana
Casablanca
05 22 22 86 44 / 05 22 22 86 44

Dr Najib GARTI
CARDIOLOGUE - RYTHMOLOGUE
19, Bd. Franklin Roosevelt (Ex. Bd. Mh. Rachid) - Casa
05 22 36 09 09 - Gsm 06 61 243 006

19, Bd. Franklin Roosevelt, Anfa (Rez de chaussée Clinique Val D'anfa) - Casa

Patente N° 36615328 - IF 40713811 - INPE 091086621 - ICE 001584040000063

Tél : 05 22 36 09 09 - Tél / Fax : 05 22 36 08 88

E-mail : garti.naj@hotmail.fr - Site : www.cvarythmologie.com

سكترال 200 ملغ

كلورهدات أسيتوتولول

أقرا

LOT : 22E001
PER: 01/2025

SECTRAL 200MG
CP PEL B20

P.P.V : 37DH80



ملف المعلومات الواردة

طبيبك أو من الصيدلي.
حتى وإن كانوا يعانون

من نفس الأعراض التي تعاني منها.

• في حال تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو لاحظت أية أعراض جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ماهو سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
3. كيف تتناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف تقوم بحفظ سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
6. معلومات إضافية.

1. **سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟**

المجموعة العلاجية الدوائية - حاصرات بيتا، الانتقالية - رمز C07AB04، ATC. يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة، أسيتوتولول، والتي تنتمي إلى فئة حاصرات بيتا. تستخدم هذه الأدوية لخفض ضغط الدم الشرياني وعلاج بعض أمراض القلب. يستعمل هذا الدواء:

- لخفض ضغط الدم الشرياني.
- لعلاج بعض اضطرابات نظم القلب.
- لمنع نوبات الذبحة الصدرية الممثلة التي تحدث أثناء بذل الجهد، الذبحة الصدرية هي المسؤولة عن ظهور ألم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والذراع، بعد نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب).

2. **ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟**

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاقصص طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من الحساسية لـ الأسيتوتولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (حاصرات بيتا)، أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

• إذا كنت تعاني من الربو أو إذا كنت تعاني من احتقان شديد في القصبات الهوائية والربو (مرض الانسداد الرئوي المزمن).

• إذا كان قلبك لا يعمل بشكل سليم (فشل القلب) على الرغم من تلقي العلاج.

• إذا كنت تعاني من فشل حاد في القلب (صدمة قلبية).

• إذا كنت تعاني من اضطرابات في النشاط الكهربائي للقلب مما قد يؤدي إلى بطء ضربات القلب و ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (حصار أذيني بطيني من الدرجة الثانية والثالثة).

• إذا كنت تعاني من ذبحة برنزيتمال (شكل آخر من الذبحة الصدرية مخالفة للذبحة الصدرية

الجهدية) المسؤولة عن ظهور آلام في الصدر أثناء الراحة.

• إذا كان قلبك ينضض بشكل غير منتظم.

• إذا كان قلبك ينضض بشدة (أقل من 45 من 50 نبضة في الدقيقة).

• إذا كنت تعاني من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشرايين (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من ورم القواتم غير المعالج (مرض في الغدة الموجودة فوق الكلى).

• إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).

• إذا عانيت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.

• إذا كنت تعاني من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض الاستقلابي).

• إذا كنت موهضة.

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفصح حيث أن هذا الدواء يحتوي على نشا القمح.

التحذيرات والإحتياطات عند الاستعمال:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة.

يجب ألا تتوقف عن علاجك تشكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك أو لأن إيقافه فجأة قد يعرض حياتك للخطر.

• إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك التحذير بأنك تتناول هذا الدواء.

يجب عليك أيضاً إعلام طبيبك:

• إذا كنت مصاباً بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج للتأكد من عدم حدوث نقص سكر الدم.

• إذا كنت تعاني من مرض كلوي (فشل كلوي) أو مرض كلبي (فشل كلبي).

• إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي (الصدفية).

• إذا عانيت في السابق من الحساسية.

• إذا كنت تعاني من ظاهرة رينود (خلل في الدورة الدموية على مستوى الأصابع)، أو التهاب الشرايين (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (التسمم الدرقي).

الأدوية الأخرى وسيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة:

لا يجب تناول سيكترال في نفس الوقت مع ديلتيازيم أو فرياباميل (دواء للقلب) أو فينيلوإيمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بخلاف ذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ واضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروف بأنها تحفز هذه الآثار الجانبية.

تم الإلزام عن تزايد خطر الإصابة بالاكنتاب عند تناول هذا الدواء مع الديلتيازيم.

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل والإرضاع:

الحمل: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.

إذا ما كنت تتناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبضعة أيام، لأن بعض آثار العلاج تظهر أيضاً عند حديثي الولادة (تباطؤ ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).

الإرضاع: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

ينتقل هذا الدواء إلى حليب الثدي للمرضع، لذلك، تمنع الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج.

القيادة واستعمال الآلات:

قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتوغل أو تعب. إذا عانيت من قبل أو كنت تعاني من هذه الآثار، فينوجب عليك الحذر عند قيادة المركبات أو استعمال الآلات.

سكترال 200 ملغ

كلورهدات أسيتوتولول

أقرا

LOT : 22E001
PER: 01/2025

SECTRAL 200MG
CP PEL B20

P.P.V : 37DH80



ملف المعلومات الواردة

طبيبك أو من الصيدلي.
حتى وإن كانوا يعانون

من نفس الأعراض التي تعاني منها.

• في حال تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو لاحظت أية أعراض جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ماهو سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
3. كيف تتناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف تقوم بحفظ سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
6. معلومات إضافية.

1. **سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟**

المجموعة العلاجية الدوائية - حاصرات بيتا، الانتقالية - رمز C07AB04، ATC. يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة، أسيتوتولول، والتي تنتمي إلى فئة حاصرات بيتا. تستخدم هذه الأدوية لخفض ضغط الدم الشرياني وعلاج بعض أمراض القلب. يستعمل هذا الدواء:

- لخفض ضغط الدم الشرياني.
- لعلاج بعض اضطرابات نظم القلب.
- لمنع نوبات الذبحة الصدرية الممثلة التي تحدث أثناء بذل الجهد، الذبحة الصدرية هي المسؤولة عن ظهور ألم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والذراع، بعد نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب).

2. **ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟**

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاقصص طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من الحساسية لـ الأسيتوتولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (حاصرات بيتا)، أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

• إذا كنت تعاني من الربو أو إذا كنت تعاني من احتقان شديد في القصبات الهوائية والربو (مرض الانسداد الرئوي المزمن).

• إذا كان قلبك لا يعمل بشكل سليم (فشل القلب) على الرغم من تلقي العلاج.

• إذا كنت تعاني من فشل حاد في القلب (صدمة قلبية).

• إذا كنت تعاني من اضطرابات في النشاط الكهربائي للقلب مما قد يؤدي إلى بطء ضربات القلب و ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (حصار أذيني بطيني من الدرجة الثانية والثالثة).

• إذا كنت تعاني من ذبحة برنزيتمال (شكل آخر من الذبحة الصدرية مخالفة للذبحة الصدرية

الجهدية) المسؤولة عن ظهور آلام في الصدر أثناء الراحة.

• إذا كان قلبك ينضض بشكل غير منتظم.

• إذا كان قلبك ينضض بشدة (أقل من 45 من 50 نبضة في الدقيقة).

• إذا كنت تعاني من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشرايين (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من ورم القواتم غير المعالج (مرض في الغدة الموجودة فوق الكلى).

• إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).

• إذا عانيت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.

• إذا كنت تعاني من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض الاستقلابي).

• إذا كنت موهضة.

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفصح حيث أن هذا الدواء يحتوي على نشا القمح.

التحذيرات والإحتياطات عند الاستعمال:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة.

يجب ألا تتوقف عن علاجك تشكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك أو لأن إيقافه فجأة قد يعرض حياتك للخطر.

• إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك التحذير بأنك تتناول هذا الدواء.

يجب عليك أيضاً إعلام طبيبك:

• إذا كنت مصاباً بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج للتأكد من عدم حدوث نقص سكر الدم.

• إذا كنت تعاني من مرض كلوي (فشل كلوي) أو مرض كلبي (فشل كلبي).

• إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي (الصدفية).

• إذا عانيت في السابق من الحساسية.

• إذا كنت تعاني من ظاهرة رينود (خلل في الدورة الدموية على مستوى الأصابع)، أو التهاب الشرايين (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (التسمم الدرقي).

الأدوية الأخرى وسيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة:

لا يجب تناول سيكترال في نفس الوقت مع ديلتيازيم أو فرياباميل (دواء للقلب) أو فينيلوإيمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بخلاف ذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ واضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروف بأنها تحفز هذه الآثار الجانبية.

تم الإلزام عن تزايد خطر الإصابة بالاكنتاب عند تناول هذا الدواء مع الديلتيازيم.

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل والإرضاع:

الحمل: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.

إذا ما كنت تتناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبضعة أيام، لأن بعض آثار العلاج تظهر أيضاً عند حديثي الولادة (تباطؤ ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).

الإرضاع: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

ينتقل هذا الدواء إلى حليب الثدي للمرضع، لذلك، تمنع الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج.

القيادة واستعمال الآلات:

قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتوغل أو تعب. إذا عانيت من قبل أو كنت تعاني من هذه الآثار، فينوجب عليك الحذر عند قيادة المركبات أو استعمال الآلات.

سكترال 200 ملغ

كولورهدات أسيتوتولول

أقرا

SECTRAL 200MG
CP PEL B20

P.P.V : 37DH80



LOT : 22E001
PER: 01/2025

ملف المعلومات الواردة

طبيبك أو من الصيدلي.
حتى وإن كانوا يعانون

من نفس الأعراض التي تعاني منها.

• في حال تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو لاحظت أية أعراض جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ماهو سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
3. كيف تتناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف تقوم بحفظ سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
6. معلومات إضافية.

1. **سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟**

المجموعة العلاجية الدوائية - حاصرات بيتا، الانتقالية - رمز C07AB04، ATC. يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة، أسيتوتولول، والتي تنتمي إلى فئة حاصرات بيتا. تستخدم هذه الأدوية لخفض ضغط الدم الشرياني وعلاج بعض أمراض القلب. يستعمل هذا الدواء:

- لخفض ضغط الدم الشرياني.
- لعلاج بعض اضطرابات نظم القلب.
- لمنع نوبات الذبحة الصدرية الخفيفة التي تحدث أثناء بذل الجهد، الذبحة الصدرية هي المسؤولة عن ظهور ألم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والذراع، بعد نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب).

2. **ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟**

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاقصص طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية لـ الأسيتوتولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (حاصرات بيتا)، أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- إذا كنت تعاني من الربو أو إذا كنت تعاني من احتقان شديد في القصبات الهوائية والربو (مرض الانسداد الرئوي المزمن).

إذا كان قلبك لا يعمل بشكل سليم (فشل القلب) على الرغم من تلقي العلاج.

إذا كنت تعاني من فشل حاد في القلب (صدمة قلبية).

إذا كنت تعاني من اضطرابات في النشاط الكهربائي للقلب مما قد يؤدي إلى بطء ضربات القلب و ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (حصار أدبيني طبيعي من الدرجة الثانية والثالثة).

• إذا كنت تعاني من ذبحة برونزيمال (شكل آخر من الذبحة الصدرية مخالفة للذبحة الصدرية

الجهدية) المسؤولة عن ظهور آلام في الصدر أثناء الراحة.

• إذا كان قلبك ينضض بشكل غير منتظم.

• إذا كان قلبك ينضض بشدة (أقل من 45 من 50 نبضة في الدقيقة).

• إذا كنت تعاني من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشرايين (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من ورم القواتم غير المعالج (مرض في الغدة الموجودة فوق الكلى).

• إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).

• إذا عانيت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.

• إذا كنت تعاني من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض الاستقلابي).

• إذا كنت موهضة.

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفصح حيث أن هذا الدواء يحتوي على نشا القمح.

التحذيرات والإحتياطات عند الاستعمال:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة.

يجب ألا تتوقف عن علاجك تشكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك أو لأن إيقافه فجأة قد يعرض حياتك للخطر.

• إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك التحذير بأنك تتناول هذا الدواء.

يجب عليك أيضاً إعلام طبيبك:

- إذا كنت مصاباً بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج للتأكد من عدم حدوث نقص سكر الدم.
- إذا كنت تعاني من مرض كلوي (فشل كلوي) أو مرض كلوي (فشل كلوي).
- إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي (الصدفية).

• إذا عانيت في السابق من الحساسية.

• إذا كنت تعاني من ظاهرة رينود (خلل في الدورة الدموية على مستوى الأصابع)، أو التهاب الشرايين (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (التسمم الدرقي).

الأدوية الأخرى وسيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة:

لا يجب تناول سيكترال في نفس الوقت مع ديلتيازيم أو فرياباميل (دواء للقلب) أو فينيلوإيمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بخلاف ذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ واضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروف بأنها تحفز هذه الآثار الجانبية.

تم الإلزام عن تزايد خطر الإصابة بالاكنتاب عند تناول هذا الدواء مع الديلتيازيم.

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل والإرضاع:

الحمل: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.

إذا ما كنت تتناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبضعة أيام، لأن بعض آثار العلاج تظهر أيضاً عند حديثي الولادة (تباطؤ ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).

الإرضاع: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

ينتقل هذا الدواء إلى حليب الثدي للمرضع، لذلك، تمنع الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج.

القيادة واستعمال الآلات:

قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتوغل أو تعب. إذا عانيت من قبل أو كنت تعاني من هذه الآثار، فينوجب عليك الحذر عند قيادة المركبات أو استعمال الآلات.

سكترال 200 ملغ

كلورهدات أسيتوتولول

أقرا

LOT : 22E001
PER: 01/2025

SECTRAL 200MG
CP PEL B20

P.P.V : 37DH80



ملف المعلومات الواردة

طبيبك أو من الصيدلي.
حتى وإن كانوا يعانون

من نفس الأعراض التي تعاني منها.

في حال تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو لاحظت أية أعراض جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ماهو سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
3. كيف تتناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف تقوم بحفظ سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟
6. معلومات إضافية.

1. ماهو سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة وماهي دواعي استعماله؟

المجموعة العلاجية الدوائية - حاصرات بيتا، الانتقالية - رمز C07AB04، ATC.

يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة، أسيتوتولول، والتي تنتمي إلى فئة حاصرات بيتا.

تستخدم هذه الأدوية لخفض ضغط الدم الشرياني وعلاج بعض أمراض القلب.

يستعمل هذا الدواء:

- لخفض ضغط الدم الشرياني.
- لعلاج بعض اضطرابات نظم القلب.
- لمنع نوبات الذبحة الصدرية الممثلة التي تحدث أثناء بذل الجهد، الذبحة الصدرية هي المسؤولة عن ظهور ألم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والذراع، بعد نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب).

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة؟

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاقصص طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من الحساسية لـ الأسيتوتولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (حاصرات بيتا)، أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

• إذا كنت تعاني من الربو أو إذا كنت تعاني من احتقان شديد في القصبات الهوائية والربو (مرض الانسداد الرئوي المزمن).

• إذا كان قلبك لا يعمل بشكل سليم (فشل القلب) على الرغم من تلقي العلاج.

• إذا كنت تعاني من فشل حاد في القلب (صدمة قلبية).

• إذا كنت تعاني من اضطرابات في النشاط الكهربائي للقلب مما قد يؤدي إلى بطء ضربات القلب و ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (حصار أدبيني طبيعي من الدرجة الثانية والثالثة).

• إذا كنت تعاني من ذبحة برونزيمال (شكل آخر من الذبحة الصدرية مخالفة للذبحة الصدرية

الجديدة) المسؤولة عن ظهور آلام في الصدر أثناء الراحة.

• إذا كان قلبك ينبض بشكل غير منتظم.

• إذا كان قلبك ينبض بشدة (أقل من 45 إلى 50 نبضة في الدقيقة).

• إذا كنت تعاني من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) وانتهاء الشريان (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من ورم القواتم غير المعالج (مرض في الغدة الموجودة فوق الكلى).

• إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).

• إذا عانيت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.

• إذا كنت تعاني من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض الاستقلابي).

• إذا كنت موصفة.

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفصح حيث أن هذا الدواء يحتوي على نشا القمح.

التحذيرات والإحتياطات عند الاستعمال:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة.

يجب ألا تتوقف عن علاجك تشكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك أو لأن إيقافه فجأة قد يعرض حياتك للخطر.

• إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك التحذير بأنك تتناول هذا الدواء.

يجب عليك أيضاً إعلام طبيبك:

• إذا كنت مصاباً بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج للتأكد من عدم حدوث نقص سكر الدم.

• إذا كنت تعاني من مرض كلوي (فشل كلوي) أو مرض كلبي (فشل كلبي).

• إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي (الصدفية).

• إذا عانيت في السابق من الحساسية.

• إذا كنت تعاني من ظاهرة رينود (خلل في الدورة الدموية على مستوى الأصابع)، أو التهاب الشرايين (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).

• إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (التسمم الدرقي).

الأدوية الأخرى وسيكترال 200 ملغ أقراص مغلفة:

لا يجب تناول سيكترال في نفس الوقت مع ديلتيازيم أو فرياباميل (دواء للقلب) أو فينيلوإيمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بخلاف ذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ واضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروف بأنها تحفز هذه الآثار الجانبية.

تم الإلحاح عن تزايد خطر الإصابة بالاكنتاب عند تناول هذا الدواء مع الديلتيازيم.

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل والإرضاع:

الحمل: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.

إذا ما كنت تتناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبضعة أيام، لأن بعض آثار العلاج تظهر أيضاً عند حديثي الولادة (تباطؤ ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).

الإرضاع: استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

ينتقل هذا الدواء إلى حليب الثدي للمرضع، لذلك، يمنع الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج.

القيادة واستعمال الآلات:

قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتوغل أو تعب. إذا عانيت من قبل أو كنت تعاني من هذه الآثار، فينوجب عليك الحذر عند قيادة المركبات أو استعمال الآلات.

NO-DEP® 50mg

Sertraline

LOT: 436
PER: MAR 2025
PPV: 126 DH 80

secables

COMPOSITION :

Sertraline chlorhydrate (DCI) 50 mg par comprimé.

Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Amyglycolate sodique, Stéarate de magnésium, Talc, HPMC E-15, Indigo carmine lake, Dioxyde de titane, Propylène glycol, Alcool isopropylique, Eau purifiée.**FORMES ET PRESENTATIONS:**

NO-DEP 50 mg, comprimés pelliculés sécables, Boite de 15, 30 et de 60.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Le composant actif de NO-DEP® est la sertraline. La sertraline appartient à un groupe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS); ces médicaments sont utilisés pour traiter la dépression et/ou des troubles anxieux.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- Episodes dépressifs majeurs.
- Prévention des récurrences d'épisodes dépressifs majeurs.
- Troubles panique, avec ou sans agoraphobie.
- Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez l'adulte ainsi que chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.
- Trouble anxiété sociale.
- Etat de stress post-traumatique (ESPT).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés de sertraline peuvent être administrés pendant ou après les repas.
Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir.
La dose habituelle est:

Adultes:

Dépression et trouble obsessionnel compulsif:

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg/jour.
est de 200 mg/jour.

Trouble panique, trouble anxiété sociale et état de stress post-traumatique:

Dans le trouble panique, le trouble anxiété sociale et l'état de stress post-traumatique, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour, qui est augmentée à 50 mg/jour.

La dose peut être augmentée par tranches de 50 mg/jour.

La dose

NO-DEP® 50mg

Sertraline

قَابِلٌ لِلْخَسْرِ

 LOT : 425
 PER : DEC 2024
 PPV : 201 DH 00
COMPOSITION:

Sertraline chlorhydrate (DCI) 50 mg par comprimé.

Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Amyglycolate sodique, Stéarate de magnésium, Talc, HPMC E-15, Indigo carmine lake, Dioxyde de titane, Propylène glycol, Alcool isopropylique, Eau purifiée.

FORMES ET PRESENTATIONS:

NO-DEP 50 mg, comprimés pelliculés sécables, Boîte de 15, 30 et de 60.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Le composant actif de NO-DEP® est la sertraline. La sertraline appartient à un groupe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS); ces médicaments sont utilisés pour traiter la dépression et/ou des troubles anxieux.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- Episodes dépressifs majeurs.
- Prévention des récidives d'épisodes dépressifs majeurs.
- Troubles panique, avec ou sans agoraphobie.
- Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez l'adulte ainsi que chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.
- Trouble anxiété sociale.
- Etat de stress post-traumatique (ESPT).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés de sertraline peuvent être administrés pendant ou en dehors des repas.

Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir.

La dose habituelle est:

Adultes:

Dépression et trouble obsessionnel compulsif:

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

Trouble panique, trouble anxiété sociale et état de stress post-traumatique:

Dans le trouble panique, le trouble anxiété sociale et le trouble de stress post-traumatique, le traitement doit être débuté à la dose de 25

كوفيرام® 5 ملغ / 10 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

كوفيرام® 10 ملغ / 10 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

كوفيرام® 5 ملغ / 5 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

269,00

اقرأ بدقة هذه المعلومات لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة في مكان آمن بها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك أو الصيدلاني.
- لقد وُصف هذا الدواء لك من قبل الطبيب أو الصيدلاني، هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (انظر إلى مقطع 4 : «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أية حالة يستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كوفيرام، حبة؟
3. كيف يؤخذ كوفيرام، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كوفيرام، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أية حالة يستعمل؟

الغاية العلاجية للصدلانية: منظم للضغط الشرياني للأجيوتنسين (IEC) وحاصر للكالسيوم.

كود : C09BB04 : ATC

يوصف كوفيرام، حبة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني و/أو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستقر (في حال تناقص أو انحصار الدم الوارد للقلب).

فيما يمكن المرضى الذين يستخدمون البيرانندوبريل و الأملوديدين بطريقة منفصلة أن يأخذوا كلا المادتين في حبة واحدة من كوفيرام، حبة.

إن كوفيرام، حبة عبارة عن مزيج من مادتين: البيرانندوبريل والأملوديدين.
إن البيرانندوبريل منظم للضغط الشرياني للأجيوتنسين (IEC)، والأملوديدين حاصر للكالسيوم (ينتمي لصفى الأدوية المسماة ديهيدروبيريدين dihydropyridines). وإن هاتين المادتين تعملان معاً في توسيع

زيادة غير متوقعة في التأثير الخافض لضغط الدم لكوفيرام حبة.

الحمل والإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تتعدين بأنك حامل أو كنت تخططين للحمل، فاطلبي نصيحة طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

الحمل

يجب أن تخبري طبيبك إذا كنت تتعدين بأنك حامل (أو قد تصبحين) حاملاً.

عادة سوف ينصحك طبيبك بالتوقف عن أخذ كوفيرام حبة قبل حدوث الحمل أو بمجرد وقوعه حيث سيصف لك دواء آخر بديلاً عنه.

لا تنصح بأخذ كوفيرام حبة في بداية الحمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجنين عند استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

لقد أثبت أن الأملوديدين يفرز في حليب الأم بكميات ضئيلة.

أعلمي طبيبك إن كنت ترضعين أو على وشك الإرضاع.

لا يوصى بإعطاء كوفيرام حبة للأطفال المرضعات، ويمكن لطبيبك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرضاع خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابق لأوانه (عديم).

قيادة السيارات أو العمل على الآليات:

قد يؤثر كوفيرام حبة على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآلات، إذا تسبب لك العلاج بالنعاس.

كوفيرام® 5 ملغ / 10 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

كوفيرام® 10 ملغ / 10 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

كوفيرام® 5 ملغ / 5 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

269,00

اقرأ بدقة هذه المعلومات لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة في مكان آمن بها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك أو الصيدلاني.
- لقد وُصف هذا الدواء لك من قبل الطبيب أو الصيدلاني، هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (انظر إلى مقطع 4 : «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أية حالة يستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كوفيرام، حبة؟
3. كيف يؤخذ كوفيرام، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كوفيرام، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أية حالة يستعمل؟

الغاية العلاجية للصيدلانية: منظم للضغط المحوّل للأنيوتنسين (IEC) وحاصر للكالسيوم.

كود : C09BB04 : ATC

يوصف كوفيرام، حبة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني و/أو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستقر (في حال تناقص أو انحصار الدم الوارد للقلب).

فيما يمكن المرضى الذين يستخدمون البيرانندوبريل و الأملوديدين بطريقة منفصلة أن يأخذوا كلا المادتين في حبة واحدة من كوفيرام، حبة.

إن كوفيرام، حبة عبارة عن مزيج من مادتين: البيرانندوبريل والأملوديدين. إن البيرانندوبريل منظم للضغط المحوّل للأنيوتنسين (IEC)، والأملوديدين حاصر للكالسيوم (ينتمي لصنف الأدوية المسماة ديهيدروبيريدين dihydropyridines). وإن هاتين المادتين تعملان معاً في توسيع

زيادة غير متوقعة في التأثير الخافض لضغط الدم لكوفيرام حبة.

الحمل والإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تتعدين بأنك حامل أو كنت تخططين للحمل، فاطلبي نصيحة طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

الحمل

يجب أن تخبري طبيبك إذا كنت تتعدين بأنك حامل (أو قد تصبحين) حاملاً.

عادة سوف ينصحك طبيبك بالتوقف عن أخذ كوفيرام حبة قبل حدوث الحمل أو بمجرد وقوعه حيث سيصف لك دواء آخر بديلاً عنه.

لا تنصح بأخذ كوفيرام حبة في بداية الحمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجنين عند استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

لقد أثبت أن الأملوديدين يفرز في حليب الأم بكميات ضئيلة.

أعلمي طبيبك إن كنت ترضعين أو على وشك الإرضاع.

لا يوصى بإعطاء كوفيرام حبة للأطفال المرضعات، ويمكن لطبيبك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرضاع خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابق لأوانه (عديم).

قيادة السيارات أو العمل على الآليات:

قد يؤثر كوفيرام حبة على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآلات، إذا تسبب لك العلاج بالنعاس.

كوفيرام® 5 ملغ / 10 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

كوفيرام® 10 ملغ / 10 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

كوفيرام® 5 ملغ / 5 ملغ حبات

بيرانندوبريل أرجينين / أملوديدين

269,00

اقرأ بدقة هذه المعلومات لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة في مكان آمن بها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك أو الصيدلاني.
- لقد وُصف هذا الدواء لك من قبل الطبيب أو الصيدلاني، هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (انظر إلى مقطع 4 : «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أية حالة يستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كوفيرام، حبة؟
3. كيف يؤخذ كوفيرام، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كوفيرام، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أية حالة يستعمل؟

الفئة العلاجية: المضادة للضغط الشرياني، مثبط للخميرة المحوِّلة للأنجيو تينسين (IEC) وحاصر للكالسيوم.

كود : C09BB04 : ATC

يوصف كوفيرام، حبة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني و/أو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستقر (في حال تناقص أو انحصار الدم الوارد للقلب).

فيما يمكن للمرضى الذين يستخدمون بيراندوبريل و الأملوديدين بطريقة منفصلة أن يأخذوا كلا المادتين في حبة واحدة من كوفيرام، حبة.

إن كوفيرام، حبة عبارة عن مزيج من مادتين: بيراندوبريل والأملوديدين. إن بيراندوبريل مثبط للخميرة المحوِّلة للأنجيو تينسين (IEC)، والأملوديدين حاصر للكالسيوم (ينتمي لصنف الأدوية المسماة ديهيدروبيريدين dihydropyridines). وإن هاتين المادتين تعملان معاً في توسيع

زيادة غير متوقعة في التأثير الخافض لضغط الدم لكوفيرام حبة.

الحمل والإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تتعدين بأنك حامل أو كنت تخططين للحمل، فاطلبي نصيحة طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

الحمل

يجب أن تخبري طبيبك إذا كنت تتعدين بأنك حامل (أو قد تصبحين) حاملاً.

عادةً سوف ينصحك طبيبك بالتوقف عن أخذ كوفيرام حبة قبل حدوث الحمل أو بمجرد وقوعه حيث سيصف لك دواء آخر بديلاً عنه.

لا تنصح بأخذ كوفيرام حبة في بداية الحمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجنين عند استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

لقد أثبت أن الأملوديدين يفرز في حليب الأم بكميات ضئيلة.

أعلمي طبيبك إن كنت ترضعين أو على وشك الإرضاع.

لا يوصى بإعطاء كوفيرام حبة للأطفال المرضعات، ويمكن لطبيبك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرضاع خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابق لأوانه (عديم).

قيادة السيارات أو العمل على الآليات:

قد يؤثر كوفيرام حبة على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآلات، إذا تسبب لك العلاج بالنعاس.

ID: 13092023

Nom : BENTALHA FATIMA

Sexe : F

Date de naissance :

ans

Symptômes :

10 mm/mV

25 mm/s

Filtre : H50 d 100 Hz

13-Sep-2023 PM12:01:05

Médicament :

cm

kg


/

mmHg

62 bpm

Antécédents :

10 mm/mV



2350K 03-04 04-05

Service :

Examen : Clinique Cardiologique VAL D ANFA

ID:13092023

Nom : BENTALWA-FATIMA

Sexe: F

Date de naissance:

ans

cm

kg

/

mmHg

fréq. ventr.

61

bpm

Int. PR

154

ms

Durée QRS

96

ms

Int. QT/QTc(E)

412/ 416

ms

Axe P/QRS/T

19/ 53/ 66

°

Ampl RV5/SV1


2.39/ 0.43

mV

Ampl RV5+SV1

2.82

mV



Rapport non confirmé

Revu par :

Examen : Clinique Cardiologique VAL D ANFA