

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
15/09/2015	Visite de suivi	1	100	100

~~EXECUTION DES ORDONNANCES~~

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	25/05/2023	452,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Spécialiste des Maladies de L'Appareil Digestif

(Foie, estomac, colon, hémorroïdes)

Lauréat de C.I.H Avicenne Rabat

D.U de Proctologie de Toulouse

Membre de La Société Française de L'Appareil Digestif

Membre de La Société Française de Coloproctologie

Ancien Médecin à l'Hôpital Moulay Youssef

• Echographie Abdominale

• Endoscopie Digestive

• Proctologie Médicale et Chirurgicale



أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي
(الكبد ، المعدة ، الأمعاء ، الموسيري)

خرج المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط

حاصل على دبلوم

جراحة المريض (أنتور)

عضو الجمعية الفرنسية لدراسة المريض

عضو الجمعية الفرنسية لدراسة المريض

طبيب سابق في مستشفى مروان بن سعيد

• الكشف بالفم، المدخل للمعدة والقولون


• الكشف بالآمتحان فوق المريض

Casablanca le:

21/01/2023

23

152,50



① Ketoflex 500 mg

2 g h 1 Fr

En combinaison

2 g + 2 g

Duoflex 2 g

2 g + 2 g

Libman

② Kalest 2 g

2 g h 1 Fr

شارع أبو بكر الصالحي ، قاعة أحداث عمارة E (رقم 1 سيدى معروف - الطابق الأول - البيضاء)

9 Avenue Abou Bakr EL Kadiri, Résidence AHFAD, Imm. E, N°1, Sidi Maârouf.

☎ 0522 97 52 74 ☎ 0661 36 32 13

Lot:

4411A
07.2027
32000HS

EXP:

PPV:

LOT 221877
EXP 08/2025
PPV 42.00DH

24,50

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-pi-
oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-mé-
thyl-4-aminobutane.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 4

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se combinent pour traiter les symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique. Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse qui réduit la sécrétion de l'acide chlorhydrique dans l'estomac et inhibe l'activité sécrétoire. L'association de ces deux substances permet une action à la fois centrale et périphérique sur les troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et urinaire. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement en forme plasmatique dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance est métabolisée dans le foie par des enzymes microsomiques. Elle est éliminée principalement par l'urine et le foie. La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase de clairance plasmatique totale. La clairance totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs, desméthylchlordiazépoxide, démoxépam, desmététhylchlordiazépoxide et le démoxépam. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastomotique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

LOT 2367 PER 04/2026
PV 21.00 DH

Fabriqué sous licence **Moda**

ORO ® dispersible

Musfon ® 80 mg

voie orale



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement pour l'administration de phloroglucinol. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourraient lui être nocif.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Dénomination du médicament :

MUSFON® 80 mg, 10, 20 ou 30 comprimés orodispersibles

2. Composition du médicament

Phloroglucinol dihydrate 80 mg

Quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à 62,2

Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidon de magnésium, aspartam (E951), gélule un comprimé.

Excipients à effet notoire : aspartame, lactose

3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A : appareil digestif et métabolisme)

(G : système génito-urinaire)

4. Indications thérapeutique

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

5. Posologie :

- Mode et voies d'administration : Voie orale.

Chez l'adulte : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau.

Posologie

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 2 comprimés orodispersibles par jour, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.

Chez l'enfant : 1 comprimé orodispersible 2 fois par jour.

6. Contre-indications :

Spécialiste des Maladies de L'Appareil Digestif
(Foie, estomac, colon, hémorroïdes)

Lauréat de C.H Avicenne Rabat

D.U de Proctologie de Toulouse

Membre de La Société Française de L'Appareil Digestif

Membre de La Société Française de Coloproctologie

Ancien Médecin à l'hôpital Moulay Youssef

• Echographie Abdominale

• Endoscopie Digestive

• Proctologie Médicale et Chirurgicale



أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي
(الكبد ، المعدة ، الأمعاء ، البواسير)

خريج المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط

حاصل على دبلوم جراحة المخ (تونس)

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي

عضو الجمعية الفرنسية لجراحة المخ

طبيب سابق في مستشفى مولاي يوسف

• الكشف بالبصري الداخلي للمعدة والأمعاء

• الكشف بالأنواع فوق الصوتية

Casablanca le :

25/09/2013
Dr. Mohamed Dernaoui
Specialist in Digestive Diseases
Dr. Mohamed Dernaoui
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

Age = 66 ans
Résultat

Résultat : Problème hémoroidal

• constipation

— Foie de taille I droite droite

— Hépatite, néphrite

— Maladie de la rate

— Les M. Rétention prothétique

— Des lésions

— Rate de taille I

— Foie — Résultat

— Résultat

شارع أبو بكر القادي ، إقامة أحفاد عمارة E رقم 1 سيدى معروف - الطابق الأول - البيضاء.

• Avenue Abou Bakr EL Kadiri, Résidence AHFAD, Imm. E, N°1, Sidi Maârouf.

0522 97 52 74 0661 36 32 13

Spécialiste des Maladies de L'Appareil Digestif
(Foie, estomac, colon, hémorroïdes)

Lauréat de C.H Avicenne Rabat

D.U de Proctologie de Toulouse

Membre de La Société Française de L'Appareil Digestif

Membre de La Société Française de Coloproctologie

Ancien Médecin à l'hôpital Moulay Youssef

• Echographie Abdominale

• Endoscopie Digestive

• Proctologie Médicale et Chirurgicale

Casablanca le :

أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي
(الكبد ، المعدة ، الأمعاء ، البواسير)

خريج المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط

حاصل على دبلوم جراحة المخرج (تونس)


عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي

عضو الجمعية الفرنسية لجراحة المخرج

طبيب سابق في مستشفى مولاي يوسف

• الكشف بالبherent الداخلي للمعدة والأمعاء

• الكشف بالأمواج فوق الصوتية



Dr. Mohamed Dernaoui
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
(Foie, Estomac, Colon, Hémorroïdes, etc.)
Casablanca le 22/13

Dr. Mohamed Dernaoui
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
(Foie, Estomac, Colon, Hémorroïdes, etc.)
Casablanca le 22/13

شارع أبو بكر القادرى ، إقامة أحفاد عمارة E رقم 1 سيدى معروف - الطابق الأول - البيضاء.

Avenue Abou Bakr EL Kadiri, Résidence AHFAD, Imm. E, N°1, Sidi Maârouf.

0522 97 52 74 0661 36 32 13