

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0035253

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 01233

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance : 01.01.1945

Adresse : B.01 SIDI MAAROUFI N° 24 CASA

Tél. : 06.74.04.18.31 Total des frais engagés : 1388,8 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 21.09.2023

Nom et prénom du malade : ELMOUSAADI M'BARKA Age :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 21.09.2023

Signature de l'adhérent(e) : W.W.W.

Autorisation CNPD N° : A-A215 / 2019



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/09/2023 c.t			6	Dr ZAKARIA Diabetologue Microvascular Tél: 06 22 92 46 51

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	21/09/23	1380,80

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRE

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

### [Création, remont, adjonction]

88 8

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DR. AMAL ZARHLOULE

OMNIPRATICIENNE

DIU EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE

LASERS MEDICAUX À VISEE ESTHÉTIQUE

NUTRITION ET MICRO-NUTRITION, DIABÉTOLOGIE

ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE



الدكتورة آمال زهال

الطب العام


دبلوم جامعي في أمراض الجلد التدالخية

اللزز الطبي من أجل التجميل و التقنيات المعازية

من أجل التجميل.

القندية و القندية الدقيقة

أمراض السكري و المحس بالصدى



091267278

Casablanca, le :

21/09/2013

RL Nour El BARKA

34290

1) Dupozol 50/12,5 cp  
1cp/1



(11430x77)

32les

24530 2) Sodermix gel

1cp X 2/1



9900 3) Additiva vital cp

1cp/1



1les

4) Insekiun cp do

1cp/1



(82,50x6)

49260 aut

20100 5) DAFLEN cp 1000  
1cp/1



شارع موديبو كيتا، سيدى معروف 3، زقة 13، رقم 3، الطابق الأول، الشقة 1 - الدار البيضاء

Bd. Modibo keita, Sidi maarouf 3 - Rue 13 N°3, 1<sup>er</sup> étage, App.N°1, CASABLANCA

الهاتف : 05 22 82 46 33

البريد الإلكتروني : Email : amalzarh2002@gmail.com

1380,80





# DIPREZAR®

Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé, boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

\* Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

\* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

\* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

\* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?

3. Comment prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - code ATC : C09DA01  
DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II [losartan] et d'un diurétique [hydrochlorothiazide]. Le losartan empêche la libération de l'angiotensine II dans le sang et empêche les récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la circulation sanguine dans les vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Cela contribue également à réduire la pression artérielle.

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle [pression sanguine élevée].

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé :

\* Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

\* Si vous êtes allergique aux diurétiques thiazidiques (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains anticonceptifs tels que le cétomoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.

\* Si votre fonction hépatique est gravement altérée.

\* Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement.

\* Si vous souffrez de goutte.

\* Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® en début de grossesse et au cours de la grossesse.

\* Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.

\* Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'alsikiren.

EN CAS DE DOUCE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés :

Mises en garde et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être [ou susceptible de devenir] enceinte. DIPREZAR® est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourra entraîner gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse [voir rubrique 6 Grossesse et allaitement].

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® :

\* Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,

\* Si vous prenez des diurétiques,

\* Si vous faites un régime sans sel,

\* Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,

\* Si vous avez une insuffisance cardiaque,

\* Si votre fonction hépatique est altérée [voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé »].

\* Si vous avez un rétrécissement des artères rénales [sténose artérielle rénale] ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,

\* Si vous avez un rétrécissement des artères [athérosclérose], de l'angine de poitrine [douleur thoracique du fait d'une maladie cardiaque],

\* Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale [rétrécissement des valves du cœur] ou cardiomyopathie hypertrophique [une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque],

\* Si vous êtes diabétique,

\* Si vous avez eu de la goutte,

\* Si vous avez ou avez des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs articulaires, un rash cutané et de la fièvre [lupus érythémateux disséminé],

\* Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium.

\* Vous devrez subir une anesthésie [même chez le dentiste] ou une intervention chirurgicale si vous devez faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin ou l'établissement médical que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.

\* Si vous avez une hyperthyroïdité primaire [un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostéron suite à une anomalie des glandes surrénales],

\* Vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle élevée :

\* Un IEC (par exemple enalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux liés diabète,

\* L'alsikiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle, et les taux d'électrolytes [du potassium, par exemple] dans votre sang à intervalles réguliers.

Les patients qui prennent de l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments pourraient développer un cancer de la peau non mélanome et de cette manière détecter toute nouvelle lésion ou modification suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées par un spécialiste.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera recommandé d'éviter les rayons UV et d'avoir une protection adéquate contre l'utilisation d'HCTZ doit aussi être réévaluée avec votre médecin.

Voir également la rubrique « Ne prenez jamais DIPREZAR® sans information ».

## Enfants et adolescents :

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® chez les enfants.

Autres médicaments et DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contiennent des médicaments.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être suivies trop près de votre médicament.

Des précautions particulières [telles que contrôles de suppléments potassiques, substituts de sel contenant potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, d'autres médicaments pour contrôler le rythme cardiaque ou la pression artérielle] sont recommandées.

Il est aussi important pour votre médecin de savoir si vous prenez d'autres médicaments pour abaisser votre pression artérielle.

\* D'autres médicaments pour le traitement du cancer,

\* Des antidiabétiques,

\* Des médicaments pour le traitement d'infections fongiques,

\* Des médicaments contre l'arthrose,

\* Des médicaments myorelaxants,

\* Des somnifères,

\* Des médicaments tels que la morphine,

\* Des médicaments pressives tels que l'adrénaline ou l'isoprotéropépine,

\* Des médicaments antidiabétiques oraux ou des insulines.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose prescrite si vous prenez DIPREZAR® et recevez des produits de contraste iodés.

## DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés et comprimés à libération prolongée :

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en prenant ou augmenter les effets de chacun d'eux.

Des quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent entraîner des troubles de l'appétit au cours ou en dehors des repas.

## Grossesse et allaitement :

Vous devrez informer votre médecin si vous pensez être enceinte ou recommandez normalement d'arrêter de prendre DIPREZAR® si vous êtes enceinte. Il vous recommande DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg est déconseillé pendant la grossesse et au cours de 3 mois car cela pourra entraîner gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse [voir rubrique 6 Grossesse et allaitement].

## Sportifs :

Le diurétique contenu dans ce médicament peut entraîner un contrôle antidopage.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, une attention particulière [telles que la conduite d'une voiture] vous ne savez pas comment vous tolérez ce médicament.

## DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés et comprimés à libération prolongée :

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance au médicament,

12,5 mg, comprimé pelliculé ou comprimé à libération prolongée.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé à libération prolongée, vous devrez consulter immédiatement votre médecin si vous avez une surdose.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé à libération prolongée, vous devrez consulter immédiatement votre médecin si vous avez une surdose.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé à libération prolongée, vous devrez consulter immédiatement votre médecin si vous avez une surdose.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé à libération prolongée, vous devrez consulter immédiatement votre médecin si vous avez une surdose.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé à libération prolongée, vous devrez consulter immédiatement votre médecin si vous avez une surdose.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé à libération prolongée, vous devrez consulter immédiatement votre médecin si vous avez une surdose.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé à libération prolongée, vous devrez consulter immédiatement votre médecin si vous avez une surdose.



Multivitamines · Minéraux  
Oligo-Éléments

## + Extrait de Ginseng

Complément alimentaire,  
ce n'est pas un médicament

**Pourquoi les vitamines, minéraux et oligo-éléments sont importants pour notre organisme?**

**ADDITIVA Vital** est un complément alimentaire précieux, constitué essentiellement de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'extrait de Ginseng.

Ces substances nutritives essentielles soutiennent le fonctionnement de l'organisme humain et entrent de façon générale, à l'image des hydrates de carbone, des protéines et des lipides, dans la composition des aliments que nous absorbons chaque jour.

Ils sont indispensables à la vie et certains ne peuvent être remplacés par d'autres éléments nutritifs. De ce fait, un apport quotidien suffisant est indispensable.

Un besoin accru de même qu'un déficit peuvent apparaître un jour ou l'autre. La plupart du temps, ces variations affectent plusieurs de ces éléments nutritifs majeurs.

Sont concernés en premier lieu les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les sportifs, les travailleurs de force, etc. Mais d'autres personnes peuvent être affectées, telles que les patients nécessitant une prise régulière de médicaments, ou dont les repas pris la plupart du temps à la cantine ou constitués en grande partie de plats déjà cuisinés, favorisent une alimentation déséquilibrée. Sont enfin et fréquemment menacées les personnes soumises à un régime ou qui doivent suivre des cures d'amaigrissement.

Aujourd'hui, pour pouvoir affronter les agressions de la vie quotidienne ou de l'environnement, l'organisme nécessite parfois un apport accru qui lui permet de préserver sa résistance et sa santé.

Un principe général veut que plus l'alimentation est déséquilibrée et l'environnement agressif, plus il est difficile d'apporter à l'organisme une quantité suffisante en vitamines, minéraux et oligo-éléments.

**ADDITIVA Vital** contient des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et d'extrait de Ginseng combinés avec soin. Un seul comprimé par jour apporte à votre organisme un complément parfait.

Dans le tableau suivant, nous vous présentons les fonctions et le rôle de ces éléments nutritifs majeurs pour l'organisme.

### Vitamines

Vitamine A	participe à la constitution et à l'entretien de la soutien la croissance.
Vitamine E	participe à la constitution des membranes cel
Vitamine C	participe à la constitution des os, du cartilage du fer.
Biotine	élément entrant dans la composition de plus métabolismes de l'organisme.
Acide folique	important pour la division cellulaire.
Niacine	important en particulier pour la libération d'
Vitamine B5	élément entrant dans la composition des e qu'au métabolisme des lipides, des hydrat
Vitamine B1	entre dans la composition de diverses enz
Vitamine B2	élément entrant dans la composition des e l'organisme, en particulier pour le métaboli
Vitamine B6	intervient dans le métabolisme des acides an des globules rouges du sang.
Vitamine B12	agit favorablement sur le métabolisme des lipides

4 026466 060217

PPC: 99DH00

## MIX® Crema

area leziunilor cutanate  
zare  
us mecanismelor toxice  
ri. Situații frecvente ca:  
ul, reziduurile toxice sau  
area solară excesivă sau  
rea radicalilor liberi la  
rea diverselor probleme

chimica, capabilă de a  
a pielei.

mechanism de acțiune  
restaura echilibrul  
epidermei.  
brevetat bogat în  
oxid-dismutază] și  
cipiul activ vegetal,  
carii, în contact cu

zi, pe zona de tratat.  
ei, se pot folosi, o



Made in France

## SODERMIX® Cream

The skin is subject to free-radicals-mediated toxic mechanisms, especially in disorders such as fibrosis, keloid scars, and processes of hyperkeratinization. Furthermore, some common events such as air pollution, cigarette smoke, toxic waste, or more particular ones, such as excessive sun exposure or radiation therapy, are all generating free radicals in the skin, and causing skin disorders. Antioxidants are chemicals that prevent the development of these free radicals, and are susceptible to maintain or restore the physiological condition of skin.

## PROPERTIES

SODERMIX® contains a patented vegetal active ingredient rich in antioxidants, especially SOD and catalase.

The microcapsules in its formula contain and protect the vegetal active ingredient, which following the application, is released in contact with the skin.

SODERMIX® has a novel way of action through its capacity to restore the physiological levels of free radicals in the epidermal cells.

HOW TO USE SO  
SODERMIX® sho  
After complete per  
may be applied.

PRESENTATION  
Cream O/W - Tube 1



Unit 3D, North Point House  
Business Park, New Mallow Road.  
Cork T23AT2P, Ireland.



## SODERMIX®

SOOTHING REPAIRING  
CREAM

CREMA REPARADORA  
CALMANTE

CRÈME RÉPARATRICE  
APAISANTE



LSI SILDERMA

Unit 3D, North Point House  
Business Park, New Mallow Road.  
Cork T23AT2P, Ireland.

## Notice: information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium
3. Comment prendre l'INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver l'INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé

l'INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

l'INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). l'INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec l'INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin

Traitements des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

l'INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit l'INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

#### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire.

#### Si vous avez pris plus de l'INexium qu'

Si vous prenez plus de l'INexium que la dose recommandée par votre médecin ou à votre pharmacien

#### Si vous oubliez de prendre l'INexium

- Si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez-le au plus tôt. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre l'INexium, ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4 Quels sont les effets indésirables éventuels



## Notice: information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium
3. Comment prendre l'INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver l'INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé

l'INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

l'INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). l'INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec l'INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin

Traitements des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

l'INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit l'INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

#### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire.

#### Si vous avez pris plus de l'INexium qu'

Si vous prenez plus de l'INexium que la dose recommandée par votre médecin ou à votre pharmacien

#### Si vous oubliez de prendre l'INexium

- Si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez-le au plus tôt. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre l'INexium, ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4 Quels sont les effets indésirables éventuels



## Notice: information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium
3. Comment prendre l'INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver l'INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé

l'INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

l'INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). l'INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec l'INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin

Traitements des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

l'INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit l'INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

#### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire.

#### Si vous avez pris plus de l'INexium qu'

Si vous prenez plus de l'INexium que la dose recommandée par votre médecin ou à votre pharmacien

#### Si vous oubliez de prendre l'INexium

- Si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez-le au plus tôt. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre l'INexium, ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4 Quels sont les effets indésirables éventuels



## Notice: information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium
3. Comment prendre l'INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver l'INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé

l'INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

l'INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). l'INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec l'INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin

Traitements des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

l'INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit l'INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

#### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire.

#### Si vous avez pris plus de l'INexium qu'

Si vous prenez plus de l'INexium que la dose recommandée par votre médecin ou à votre pharmacien

#### Si vous oubliez de prendre l'INexium

- Si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez-le au plus tôt. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre l'INexium, ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4 Quels sont les effets indésirables éventuels



## Notice: information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium
3. Comment prendre l'INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver l'INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé

l'INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

l'INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). l'INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec l'INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin

Traitements des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

l'INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit l'INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

#### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire.

#### Si vous avez pris plus de l'INexium qu'

Si vous prenez plus de l'INexium que la dose recommandée par votre médecin ou à votre pharmacien

#### Si vous oubliez de prendre l'INexium

- Si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez-le au plus tôt. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre l'INexium, ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4 Quels sont les effets indésirables éventuels



## Notice: information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium
3. Comment prendre l'INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver l'INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quel cas est-il utilisé

l'INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

l'INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). l'INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec l'INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin

Traitements des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

l'INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit l'INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire.

### Si vous avez pris plus de l'INexium qu'il n'en faut

Si vous prenez plus de l'INexium que la dose recommandée par votre médecin ou à votre pharmacien

### Si vous oubliez de prendre l'INexium

- Si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez-le au plus tôt. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre l'INexium, ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses). Cependant, si vous avez oublié de prendre l'INexium, prenez une dose supplémentaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4 Quels sont les effets indésirables éventuels



# daflon® 1000 mg

Comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?**

1. Dù est-ce que DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
  3. Comment prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
  5. Comment conserver DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.
- 1. QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**
- Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES/BIOFLAVONOÏDES - code ATC : C05CA53
- Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).
- Ce médicament est préconisé dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.
- Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?**
- Ne prenez jamais DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :
- Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Avertissements et précautions**
- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 1000 mg, comprimé pelliculé.
- Enfants**
- Sans objet**
- AUTRES MEDICAMENTS ET DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ**
- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
- DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS**
- Sans objet**
- GROSSESSE ET ALLAITEMENT**
- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Grossesse :**
- Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Daflon pendant la grossesse.
- Allaitements :**
- En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.
- CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES**
- Sans objet**
- DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ CONTIENT**
- Sans objet**

**3. COMMENT PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Insuffisance veineuse :** 1 comprimé par jour au moment du repas.

Dans la crise hémorroïdaire : la posologie est de 3 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 1 comprimé par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Les données concernant le surdosage avec Daflon sont limitées mais les symptômes peuvent être diarrhée, nausée, douleur abdominale, prurit et rash.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, qui surviennent plus systématiquement chez tout le monde.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie en utilisant le suivant :

- très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)

- fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

- très rare (affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000)

- fréquence inconnue (les données disponibles ne permettent pas d'estimer la fréquence)

Il peuvent inclure :

- Fréquent : diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement.

- Peu fréquent : colite.

- Rare : sensations vertigineuses, céphalées, malaise, rash, prurit, urticaire.

- Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. COMMENT CONSERVER DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments qui vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS****CE QUE CONTIENT DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?**

• Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée ..... 1000,000 mg

Correspondant à :

Diosmine 90 pour cent ..... 900,000 mg

Flavonolides exprimés en hespéridine 10 pour cent ..... 100,000 mg

Humidité moyenne ..... 40,000 mg

Pour un comprimé pelliculé

• Les autres composants sont :

Carboxyméthylcellulose sodique, cellulose microcristalline, gelatine, stéarate de magnésium, talc.

Pellucide : oxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromellose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

**QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîtes de 15 et 30 comprimés pelliculés.

Conseil d'éducation sanitaire :

Troubles de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo).

lourds.

201,00