

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie



Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc

N° W21-798061

178462

Payement ✓

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : <u>3120</u>	Société : <u>RAM</u>		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <u>ELAMRAJI - JANAL Rachid</u>			
Date de naissance : <u>08-07-1955</u>			
Adresse : <u>170 Grappe 3 Attakis</u>			
Tél. : <u>06 61 18 71 45</u> Total des frais engagés <u>4079,20</u> Dhs			

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Dr SOUKRI Spécialiste en Cardiologie et Vasculaire Résidence Mohamed N 2 (au dessus de la clinique de la Palestine) 10500 Casablanca Tel: 0525001778 Urgente: 066644369 </div>			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade : <u>SD Amrani Janal Rachid</u>			
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
 Fait à : Maroc Le : 18/09/2023
 Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/09/2013	ces		200 HT	INP : 11111111111111111111111111111111 DOUKRAT DR. S. DOUKRAT

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. LAAOUIDI Jaouida Allopathie - Homéopathie - Cosmétologie 3, Rés. Qaria Syahra, Nakhil Sud Marrakech - Tel : 05 24 30 65 47 GSM : 06 95 23 98 98	14/09/23	2422,20

ANALYSES - RADIographies			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr.BOURRIQUAT Saloua Pharmacie Laboratoire YACOUB EL MANSOUR 31,Av Yacoub El Mansour: Guéliz - Marrakech Tél : 05 24 44 70 80-Fax : 05 24 43 78 06	15/09/23	B 280	335,00 Dhs
	16/09/23	B 800	1072,00

Dr SOUKRAT Safia

Ancienne interne du CHU Med VI

Ancienne interne de l'hôpital militaire Avicenne



د. سكريات صافية

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي

محمد السادس

طبيبة سابقة بالمستشفى العسكري

ابن سينا بمراكيش

- Spécialiste en Cardiologie et maladies vasculaires
- Diplômée de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech-Maroc
- Diplômée de la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux-France
- Echodoppler cardiaque et vasculaire
- Holter tensionnel et rythmique
- Epreuve d'effort

أخصائية في أمراض القلب والشرايين

خريجة كلية الطب بمراكيش

خريجة كلية الطب بيوردو- فرنسا

الفحص بالصدى الصوتي للقلب والشرايين

قياس الضغط الدموي و تبجيل دقات

القلب على المدى الطويل

تخطيط المعد

Le 14/09/2023.

ordonnance

El Amraani Jaouad Rachid.

$$273,00 \times 7 = 1911,00$$

1/ Exfinex 160/100 mg

$$56,80 \times 9 = 511,20$$

2/ Aldacthone 200 mg

$$2422,20$$

3/ fofalex 760 mg

On -> 1/1

Tél: 0525001278 Urgence: 0666474369 Mail: safiasoukrat@gmail.com

Résidence Mohamed Marouane, Appartement 2, 1^{er} étage 51/49 Bd de la Palestine

(au dessus de Dar el fakya) Daoudiat Marrakech

اقامة محمد مروان، شقة 2، الطابق الأول شارع فلسطين (فوق دار الفاكية و أمام متجر الجيبرة) الداوديات مراكش.

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 56,80 DH



ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 170029

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 170029

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 170029

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 170029

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 170029

ALDACTONE 50MG 20 CPS

P.P.V : 56DH80



6 118001 170029

ALDACTONE 50MG 20 CPS

P.P.V : 56DH80



6 118001 170029

ALDACTONE 50® mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 170029

Laboratoires
Pfizer

Laboratoires
Pfizer

S.A.



1181

Si l'un de ces symptômes se manifeste chez vous de manière particulièrement prononcée, veuillez le signaler à votre médecin. Les autres effets indésirables possibles, susceptibles d'être graves, de l'amiodipine ou du valsartan administrés seuls sont les suivants:

Amlodipine

OCCASIONNELS

Insomnie, modification de l'humeur, tremblements, troubles de la sensibilité, troubles du goût, vision double, essoufflement, rhume, vomissements, troubles digestifs, chute des cheveux, coloration anormale de la peau, sensibilité à la lumière, douleurs musculaires, prise de poids, perte de poids

Très rares

Saignement spontané ou petit saignement dans la peau (signes possibles d'une thrombocytopenie), fièvre, inflammation de la gorge ou ulcération dans la bouche dues à des infections (signes d'une leucocytose), augmentation du sucre dans le sang, perte de poids, insensibilité ou fourmillement dans les doigts ou les orteils (signes possibles d'un infarctus du myocarde), augmentation de la tension artérielle, battements cardiaques irréguliers (signes possibles d'une fibrillation auriculaire), battements cardiaques trop lents ou trop rapides, douleur thoracique soudaine et oppressante (signes possibles d'un infarctus du myocarde), éruption, fièvre, démangeaisons (signes possibles d'une vascularite), douleurs intenses dans la région

Occasionnels

Infection des voies respiratoires, diminution de la libido

Très rares

Hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque, inflammation des vaisseaux sanguins, altération de la fonction rénale, défaillance rénale, complications pendant la grossesse

Fréquence inconnue :

Formation de bulles sur la peau.

Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en aviser votre médecin sans délai.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

En raison d'effets secondaires possibles tels que vertiges ou fatigue, ce médicament peut affecter les capacités de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Si vous avez eu quelques accès de vomissements, si vous souffrez de diarrhées ou si vous prenez actuellement un diurétique (médicament qui augmente la quantité d'urine excrétée).

Si vous prenez d'autres médicaments ou substances





1181

Si l'un de ces symptômes se manifeste chez vous de manière particulièrement prononcée, veuillez le signaler à votre médecin. Les autres effets indésirables possibles, susceptibles d'être graves, de l'amiodipine ou du valsartan administrés seuls sont les suivants:

Amlodipine

OCCASIONNELS

Insomnie, modification de l'humeur, tremblements, troubles de la sensibilité, troubles du goût, vision double, essoufflement, rhume, vomissements, troubles digestifs, chute des cheveux, coloration anormale de la peau, sensibilité à la lumière, douleurs musculaires, prise de poids, perte de poids

Très rares

Saignement spontané ou petit saignement dans la peau (signes possibles d'une thrombocytopenie), fièvre, inflammation de la gorge ou ulcération dans la bouche dues à des infections (signes d'une leucocytose), augmentation du sucre dans le sang, perte de poids, insensibilité ou fourmillement dans les doigts ou les orteils (signes possibles d'un infarctus du myocarde), augmentation de la tension artérielle, battements cardiaques irréguliers (signes possibles d'une fibrillation auriculaire), battements cardiaques trop lents ou trop rapides, douleur thoracique soudaine et oppressante (signes possibles d'un infarctus du myocarde), éruption, fièvre, démangeaisons (signes possibles d'une vascularite), douleurs intenses dans la région

Occasionnels

Infection des voies respiratoires, diminution de la libido

Très rares

Hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque, inflammation des vaisseaux sanguins, altération de la fonction rénale, défaillance rénale, complications pendant la grossesse

Fréquence inconnue :

Formation de bulles sur la peau.

Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en aviser votre médecin sans délai.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

En raison d'effets secondaires possibles tels que vertiges ou fatigue, ce médicament peut affecter les capacités de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Si vous avez eu quelques accès de vomissements, si vous souffrez de diarrhées ou si vous prenez actuellement un diurétique (médicament qui augmente la quantité d'urine excrétée).

Si vous prenez d'autres médicaments ou substances





1181

Si l'un de ces symptômes se manifeste chez vous de manière particulièrement prononcée, veuillez le signaler à votre médecin. Les autres effets indésirables possibles, susceptibles d'être graves, de l'amiodipine ou du valsartan administrés seuls sont les suivants:

Amlodipine

OCCASIONNELS

Insomnie, modification de l'humeur, tremblements, troubles de la sensibilité, troubles du goût, vision double, essoufflement, rhume, vomissements, troubles digestifs, chute des cheveux, coloration anormale de la peau, sensibilité à la lumière, douleurs musculaires, prise de poids, perte de poids

Très rares

Saignement spontané ou petit saignement dans la peau (signes possibles d'une thrombocytopenie), fièvre, inflammation de la gorge ou ulcération dans la bouche dues à des infections (signes d'une leucocytopenie), augmentation du sucre dans le sang, perte de poids, insensibilité ou fourmillement dans les doigts ou les orteils (signes possibles d'un infarctus du myocarde), augmentation de la tension artérielle, battements cardiaques irréguliers (signes possibles d'une fibrillation auriculaire), battements cardiaques trop lents ou trop rapides, douleur thoracique soudaine et oppressante (signes possibles d'un infarctus du myocarde), éruption, fièvre, démangeaisons (signes possibles d'une vascularite), douleurs intenses dans la région

Occasionnels

Infection des voies respiratoires, diminution de la libido

Très rares

Hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque, inflammation des vaisseaux sanguins, altération de la fonction rénale, défaillance rénale, complications pendant la grossesse

Fréquence inconnue :

Formation de bulles sur la peau.

Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en aviser votre médecin sans délai.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

En raison d'effets secondaires possibles tels que vertiges ou fatigue, ce médicament peut affecter les capacités de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Si vous avez eu quelques accès de vomissements, si vous souffrez de diarrhées ou si vous prenez actuellement un diurétique (médicament qui augmente la quantité d'urine excrétée).

Si vous prenez d'autres médicaments ou substances





1181

Si l'un de ces symptômes se manifeste chez vous de manière particulièrement prononcée, veuillez le signaler à votre médecin. Les autres effets indésirables possibles, susceptibles d'être graves, de l'amiodipine ou du valsartan administrés seuls sont les suivants:

Amlodipine

OCCASIONNELS

Insomnie, modification de l'humeur, tremblements, troubles de la sensibilité, troubles du goût, vision double, essoufflement, rhume, vomissements, troubles digestifs, chute des cheveux, coloration anormale de la peau, sensibilité à la lumière, douleurs musculaires, prise de poids, perte de poids

Très rares

Saignement spontané ou petit saignement dans la peau (signes possibles d'une thrombocytopenie), fièvre, inflammation de la gorge ou ulcération dans la bouche dues à des infections (signes d'une leucocytopenie), augmentation du sucre dans le sang, perte de poids, insensibilité ou fourmillement dans les doigts ou les orteils (signes possibles d'un infarctus du myocarde), augmentation de la tension artérielle, battements cardiaques irréguliers (signes possibles d'une fibrillation auriculaire), battements cardiaques trop lents ou trop rapides, douleur thoracique soudaine et oppressante (signes possibles d'un infarctus du myocarde), éruption, fièvre, démangeaisons (signes possibles d'une vascularite), douleurs intenses dans la région

Occasionnels

Infection des voies respiratoires, diminution de la libido

Très rares

Hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque, inflammation des vaisseaux sanguins, altération de la fonction rénale, défaillance rénale, complications pendant la grossesse

Fréquence inconnue :

Formation de bulles sur la peau.

Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en aviser votre médecin sans délai.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

En raison d'effets secondaires possibles tels que vertiges ou fatigue, ce médicament peut affecter les capacités de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Si vous avez eu quelques accès de vomissements, si vous souffrez de diarrhées ou si vous prenez actuellement un diurétique (médicament qui augmente la quantité d'urine excrétée).

Si vous prenez d'autres médicaments ou substances





1181

Si l'un de ces symptômes se manifeste chez vous de manière particulièrement prononcée, veuillez le signaler à votre médecin. Les autres effets indésirables possibles, susceptibles d'être graves, de l'amiodipine ou du valsartan administrés seuls sont les suivants:

Amlodipine

OCCASIONNELS

Insomnie, modification de l'humeur, tremblements, troubles de la sensibilité, troubles du goût, vision double, essoufflement, rhume, vomissements, troubles digestifs, chute des cheveux, coloration anormale de la peau, sensibilité à la lumière, douleurs musculaires, prise de poids, perte de poids

Très rares

Saignement spontané ou petit saignement dans la peau (signes possibles d'une thrombocytopenie), fièvre, inflammation de la gorge ou ulcération dans la bouche dues à des infections (signes d'une leucocytose), augmentation du sucre dans le sang, perte de poids, insensibilité ou fourmillement dans les doigts ou les orteils (signes possibles d'un infarctus du myocarde), augmentation de la tension artérielle, battements cardiaques irréguliers (signes possibles d'une fibrillation auriculaire), battements cardiaques trop lents ou trop rapides, douleur thoracique soudaine et oppressante (signes possibles d'un infarctus du myocarde), éruption, fièvre, démangeaisons (signes possibles d'une vascularite), douleurs intenses dans la région

Occasionnels

Infection des voies respiratoires, diminution de la libido

Très rares

Hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque, inflammation des vaisseaux sanguins, altération de la fonction rénale, défaillance rénale, complications pendant la grossesse

Fréquence inconnue :

Formation de bulles sur la peau.

Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en aviser votre médecin sans délai.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

En raison d'effets secondaires possibles tels que vertiges ou fatigue, ce médicament peut affecter les capacités de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Si vous avez eu quelques accès de vomissements, si vous souffrez de diarrhées ou si vous prenez actuellement un diurétique (médicament qui augmente la quantité d'urine excrétée).

Si vous prenez d'autres médicaments ou substances





1181

Si l'un de ces symptômes se manifeste chez vous de manière particulièrement prononcée, veuillez le signaler à votre médecin. Les autres effets indésirables possibles, susceptibles d'être graves, de l'amlopipine ou du valsartan administrés seuls sont les suivants:

Amlodipine

OCCASIONNELS

Insomnie, modification de l'humeur, tremblements, troubles de la sensibilité, troubles du goût, vision double, essoufflement, rhume, vomissements, troubles digestifs, chute des cheveux, coloration anormale de la peau, sensibilité à la lumière, douleurs musculaires, prise de poids, perte de poids

Très rares

Saignement spontané ou petit saignement dans la peau (signes possibles d'une thrombocytopenie), fièvre, inflammation de la gorge ou ulcération dans la bouche dues à des infections (signes d'une leucocytopenie), augmentation du sucre dans le sang, perte de poids, insensibilité ou fourmillement dans les doigts ou les orteils (signes possibles d'un infarctus du myocarde), augmentation de la tension artérielle, battements cardiaques irréguliers (signes possibles d'une fibrillation auriculaire), battements cardiaques trop lents ou trop rapides, douleur thoracique soudaine et oppressante (signes possibles d'un infarctus du myocarde), éruption, fièvre, démangeaisons (signes possibles d'une vascularite), douleurs intenses dans la région

Occasionnels

Infection des voies respiratoires, diminution de la libido

Très rares

Hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque, inflammation des vaisseaux sanguins, altération de la fonction rénale, défaillance rénale, complications pendant la grossesse

Fréquence inconnue :

Formation de bulles sur la peau.

Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en aviser votre médecin sans délai.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

En raison d'effets secondaires possibles tels que vertiges ou fatigue, ce médicament peut affecter les capacités de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Si vous avez eu quelques accès de vomissements, si vous souffrez de diarrhées ou si vous prenez actuellement un diurétique (médicament qui augmente la quantité d'urine excrétée).

Si vous prenez d'autres médicaments ou substances





1181

Si l'un de ces symptômes se manifeste chez vous de manière particulièrement prononcée, veuillez le signaler à votre médecin. Les autres effets indésirables possibles, susceptibles d'être graves, de l'amiodipine ou du valsartan administrés seuls sont les suivants:

Amlodipine

OCCASIONNELS

Insomnie, modification de l'humeur, tremblements, troubles de la sensibilité, troubles du goût, vision double, essoufflement, rhume, vomissements, troubles digestifs, chute des cheveux, coloration anormale de la peau, sensibilité à la lumière, douleurs musculaires, prise de poids, perte de poids

Très rares

Saignement spontané ou petit saignement dans la peau (signes possibles d'une thrombocytopenie), fièvre, inflammation de la gorge ou ulcération dans la bouche dues à des infections (signes d'une leucocytose), augmentation du sucre dans le sang, perte de poids, insensibilité ou fourmillement dans les doigts ou les orteils (signes possibles d'un infarctus du myocarde), augmentation de la tension artérielle, battements cardiaques irréguliers (signes possibles d'une fibrillation auriculaire), battements cardiaques trop lents ou trop rapides, douleur thoracique soudaine et oppressante (signes possibles d'un infarctus du myocarde), éruption, fièvre, démangeaisons (signes possibles d'une vascularite), douleurs intenses dans la région

Occasionnels

Infection des voies respiratoires, diminution de la libido

Très rares

Hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque, inflammation des vaisseaux sanguins, altération de la fonction rénale, défaillance rénale, complications pendant la grossesse

Fréquence inconnue :

Formation de bulles sur la peau.

Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en aviser votre médecin sans délai.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

En raison d'effets secondaires possibles tels que vertiges ou fatigue, ce médicament peut affecter les capacités de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Si vous avez eu quelques accès de vomissements, si vous souffrez de diarrhées ou si vous prenez actuellement un diurétique (médicament qui augmente la quantité d'urine excrétée).

Si vous prenez d'autres médicaments ou substances



Dr SOUKRAT Safia

Ancienne interne du CHU Méd VI

Ancienne interne de l'hôpital militaire Avicenne



د. سكرات صافية

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي

محمد السادس

طبيبة سابقة بالمستشفى العسكري

إبن سينا بمراكش

► أخصائية في أمراض القلب والشرايين

► ذريحة كلية الطب بمراكش

► ذريحة كلية الطب ببوردو - فرنسا

► الفحص بالصدى الصوتي للقلب والشرايين

► قياس الضغط الدموي وتسجيل دقات

► القلب على المدى الطويل

► تحضير الجهد

Le ١٤/٠٩/٢٠٢٣
ordonnance

M. M. Amrani Jamel, Tariq

Calprotectine fecal.

DR SOUKRAT SAFIA
Spécialiste en Cardiologie et maladies vasculaires
Résidence Mohamed Marouane 51/49
Bd de la Palestine, Daoudiat Marrakech
Dar el fakya, Daoudiat Marrakech
Tél: 0525001278 Urg: 0666474369

DR SOUKRAT SAFIA
Spécialiste en Cardiologie et maladies vasculaires
Résidence Mohamed Marouane 51/49
Bd de la Palestine, Daoudiat Marrakech
Dar el fakya, Daoudiat Marrakech
Tél: 0525001278 Urg: 0666474369

Tél: 0525001278 Urgence: 0666474369 Mail: safiasoukrat@gmail.com

📍 Résidence Mohamed Marouane, Appartement 2, 1^{re} étage 51/49 Bd de la Palestine
(au dessus de Dar el fakya) Daoudiat Marrakech

📍 إقامة محمد مروان، شقة 2، الطابق الأول، شارع فلسطين (فوق دار الفاكية وأمام متجر الجميرا)، الداوديات، مراكش

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31 Avenue Yacoub El Mansour - Marrakech - Gueliz
Tél : 0524447060 / Fax : 0524437899
Biogiste : DR BOURRIOUAIAT S.



IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE 69100750

PATENTE 45304015 RC 40434

CNSS 1195313 INP 073002636

ICE 001527687000052

FACTURE N° 230916005

Marrakech le 16-09-2023

MR ELAMRANI JAMAL RACHID
170-GRAPPE III-AMELKIS MARRAKECH
E4899

Prescripteur :

Récapitulatif des analyses			
Analyse	Clé	Total	
CALPROTECTINE	B800	1072.00 MAD	
Total		1072.00 MAD	

Total en B: B800

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE : mille soixante-douze dirhams

PAYE : 1072.00DH

Dr.BOURRIOUAIAT Sabra
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31,Ave Yacoub EL Mansour
Gueliz - Marrakech
Tel : 0524447060 / Fax : 0524437899

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

YACOUB EL MANSOUR

31 Avenue Yacoub El Mansour - Marrakech - Gueliz
Tél : 0524447060 / Fax : 0524437899
Biogliste : DR BOURRIOUAIAT S.



IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE 69100750

PATENTE 45304015 RC 40434

CNSS 1195313 INP 073002636

ICE 001527687000052

FACTURE N° 230915035

Marrakech le 15-09-2023

MR ELAMRANI JAMAL RACHID
170-GRAPPE III-AMELKIS MARRAKECH
E4899

Prescripteur :

Récapitulatif des analyses			
Analyse	Clé	Total	
PSA TOTALE	B250	335.00 MAD	
		Total	335.00 MAD

Total en B: B250

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE : trois cent trente-cinq dirhams

PAYE : 335.00DH

Dr.BOURRIOUAIAT S.
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31,Av Yacoub EL Mansour
Gueliz - Marrakech
Tél : 0524447060-Fax : 0524437899

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31 – Avenue Yacoub El Mansour - Marrakech - Guéliz

Tél : 0524447060 / Fax : 0524437899

BIOLOGISTE : DR BOURRIOUAIAT S.

MR ELAMRANI JAMAL RACHID
170–GRAPPE III–AMELKIS MARRAKECH
DDN : 08-07-1955 ID : E4899

Prescripteur :

Date du prélèvement : 16-09-2023 à 07:55

Dossier N° : 230916005

IMMUNOLOGIE

CALPROTECTINE FCALE

(BUHLMANN QUANTUM Blue – Seuil: 30 ug/g)

164 ug/g

Interprétation des résultats :

Valeurs normales	< 80 ug/g
Zone grise, à contrôler dans 4 à 6 semaines	80 – 160 ug/g
Valeurs élevées.....	> 160 ug/g

Prélèvement effectué en dehors de notre laboratoire

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

YACOUB EL MANSOUR

31 – Avenue Yacoub El Mansour - Marrakech - Guéliz

Tél : 0524447060 / Fax : 0524437899

BIOLOGISTE : DR BOURRIOUAIAT S.

MR ELAMRANI JAMAL RACHID
170-GRAPPE III-AMELKIS MARRAKECH
DDN : **08-07-1955** ID : **E4899**

Prescripteur :

Date du prélèvement : 15-09-2023 à 11:59

Dossier N° : **230915035**

IMMUNO – ENZYMOLOGIE

PSA TOTAL

(Chimiluminescence ABBOTT Ci4100 – Seuil:0,008 ng/ml)

0,945 ng/ml (<4,000)

CMI

مركز الت Cediyat

16/09/23

07:53:35

9900217770

92177701

LABO YACOUB EL MANSOUR

Marrakech

A0000000031010

APP : VISA

EL AMRANI/JAMAL RACHID.

xxxxxxxxxxxxxx3327

11/24 CARTE NATIONALE

OBBA5A0963DB81F1

220-0-9999-1-44

MONTANT: 1072,00 MAD

NUM TRANSACTION : 002

NUM AUTORISATION: 401293

STAN : 014702

DEBIT

Le CMI vous remercie

**TICKET A CONSERVER
COPIE CLIENT**

CMI

مركز التحديدات

15/09/23 11:56:56
9900217770
92177701
LABO YACOUB EL MANSOUR
Marrakech

A0000000031010
APP : VISA
EL AMRANI/JAMAL RACHID.
xxxxxxxxxxxxxx3327
11/24 CARTE NATIONALE
63EBE3B279A88F8B
220-0-9999-1-44

MONTANT: 335,00 MAD

NUM TRANSACTION : 012
NUM AUTORISATION: 302737
STAN : 014696

DEBIT

Le CMI vous remercie

TICKET A CONSERVER
COPIE CLIENT