

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : *0000654*

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : *Najib Fatima*

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : .....


En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
10/10/13	Ch	1	300 DH	Dr. ZERROUQ BEN HACHA RACHID CARDIOLOGUE Annl 3 Rue 3 N° 6 55000 Casablanca Tél: 05 22 73 1500 / 05 22 67776
10/10/13	Echotag card		800 DH	Dr. ZERROUQ BEN HACHA RACHID CARDIOLOGUE Annl 3 Rue 3 N° 6 55000 Casablanca Tél: 05 22 73 1500 / 05 22 7776

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	22/01/86	45.90

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<p><b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D'ANALYSE</b>  <b>158 BD DE GRANDE CEINTURE</b>  <b>HAY MOHAMMED CASABLANCA</b>  <b>TEL: 0522 50 18 65 0522 53 78 74</b></p>	11/10/83	B.S.R.P	582,-

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

### **(Création, remont, adjonction)**



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. Rachid Ben Khattab Sefrioui**

**CARDIOLOGUE**

Diplôme de la Faculté de Médecine de Lille ( FRANCE)

Ancien Médecin Attaché des Hôpitaux Français

Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

Echographie Doppler Couleur Cardiaque et Vasculaire

Holter Rythmique et Tensionnel

Epreuve d'effort

**الدكتور رشيد بن الخطاب الصفيوي**

طبيب إختصاصي في أمراض القلب والشريان

محض القلب والشريان باصري و الدربل بالأنوار

تخطيط القلب أثناء الجهد

خريج كلية الطب بليل (فرنسا)

طبيب إختصاصي بمستشفيات فرنسا سابقا



Casablanca le : **10 Octobre 2023** ..... الدار البيضاء في :

**NOTE D'HONORAIRES**

Le Docteur Rachid BEN KHATTAB a l'honneur de présenter ses meilleures salutations à **Mme NAJIB FATIMA B** et lui adresse selon l'usage , sa note d'honoraires , soit la somme de **. 800 DH ( Huit cent dirhams )** , pour la réalisation d'un **Echo-doppler cardiaque**

Casablanca le :

**10-10-23**

Signé :

*Dr Rachid BEN KHATTAB*  
Dr. SEFRIoui BENKHATTAB - Dr. Rachid  
CARDIOLOGUE  
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél. : 05 22 73 15 00 / 05 22 76 77 76

CARDIOLOGUE

Diplôme de la Faculté de Médecine de Lille ( FRANCE)

Ancien Médecin Attaché des Hôpitaux Français

Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

Echographie Doppler Couleur Cardiaque et Vasculaire

Holter Rythmique et Tensionnel

Epreuve d'effort

الدكتور رشيد بن الخطاب الصفيوي

طبيب اختصاصي في أمراض القلب والشريان

شخص القلب والشريان باصري و الدربل بالأذوات

تخطيط القلب لأناء المجهود

خريج كلية الطب بليل (فرنسا)

طبيب اختصاصي بمستشفيات فرنسا سابقا



Casablanca le : ..... 10.Octobre.2023 ..... الدار البيضاء في :

140 / 80

Mme NAJIB FATIMA B


M. DE L'ESPÉRANCE  
1. Chetcaouini, Résidence Parc  
Mag. N°5, Imm. A - Casablanca  
Tél.: 05 22 35 20 86  
0920279062

AVLOCARDYL 40



1/2 cp matin et soir pendant 1 mois

RELAXIUM B 6 300 MG



1 comprimé le matin \* 30 jours

ACETHIO



2 comprimés 2 fois par jour \* 5 jours

INESO 20




1 cp matin et soir \* 4 jours, puis 1 cp le matin à jeun 20 jours

METEOSPASMYL



2 capsules 2 fois par jour

HEPANAT



2 cp \* 2 / j \* 10 j 2 heures après les repas et les autres médicaments



LOT: M1055  
FER: 14/12/25  
PPU: 139.00 DH

الدكتور رشيد بن الخطاب الصفيوي  
Dr. SEFRIOUT BENKHATTAB Rachid  
CARDIOLOGUE  
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél: 05 22 73 15 00 / 05 22 76 77 76

الدكتور رشيد بن الخطاب الصفيوي  
Dr. SEFRIOUT BENKHATTAB Rachid  
CARDIOLOGUE  
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél: 05 22 73 15 00 / 05 22 76 77 76

# HEPANAT®

le dieci erbe

هيپانات

40 قرص

73,80 DH

SYSTEME DE GESTION QUALITE  
CERTIFIE ISO 9001:2015  
PAR CERTIQUALITY

Produit Fabriqué par ESI srl - ITALY eslit  
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) - Italy  
Importé et distribué par ESNAPHARM - 7, Rue Abdelmajid Benjelloun  
Maârif extension - Casablanca

C A consommer de préférence avant fin :

03/2026  
2083G

RI Lot n°

53

lute

Rheum officinale racine 10,7 mg. Thymus vulgaris racine 16 mg. Gentiana lutea racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg.

Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

## Propriétés :

Confort digestif et intestinal.

## Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour.

## Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

## Présentations :

- Boîte de 20 comprimés.
- Boîte de 40 comprimés.

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

## COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

Produit Fabriqué par ESI srl

Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY  
www.esi.it

Importé et Distribué par ESNAPHARM - 7, Rue Abdelmajid Benjelloun  
Maârif extension - Casablanca

SYSTEME DE GESTION QUALITE  
CERTIFIE ISO 9001:2015  
PAR CERTIQUALITY

### 3. COMMENT PRENDRE METEOSPASYL®

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASYL altére l'état psychique ou la conduite des véhicules et des machines.

Effect sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Effect sur votre vote ou votre conseil à un autre

pharmacien avant de prendre tout médicament.

Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre voisin si

Vous devrez éviter de prendre ce médicament si

Vous devrez éviter de prendre ce médicament si

Vous devrez éviter de prendre tout médicament.

Conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre voisin si

Vous devrez éviter de prendre tout médicament.

Si vous devrez prendre votre médicament car l'utilisation de la pilule est nécessaire.

Il est possible de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Grossesse et allaitement

Vous devrez toujours consulter votre pharmacien car l'utilisation de la pilule est nécessaire.

Sans objet.

METEOSPASYL® capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool.

ACONE

Meteos  
smy®

Veuillez lire  
de l'information importante  
des médicaments  
Vous devrez toujours consulter  
un pharmacien pour vous.  
prendre ce médicament  
en suivant scrupuleusement les instructions  
formulées dans cette notice ou par votre  
médecin ou pharmacien.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la  
conseiller ou d'information.  
Si vous ressentez l'un des effets indésirables,  
l'inestérile ou votre médicament a provoqué des  
effets indésirables. Voir rubrique 4.  
• Si vous ressentez l'un des effets indésirables,  
parlez-en à votre pharmacien ou à votre pharmacien  
clean. Ces symptômes aussi à tout moment  
l'insémination artificielle ou la portée des  
enfants.

Quelle contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASYL®, capsule molle ?

2. Quels sont les effets indésirables connus ?

3. Comment prendre METEOSPASYL, capsule molle ?

4. Quels sont les effets indésirables événuels ?

5. Comment conserver METEOSPASYL, capsule molle ?

6. Informations supplémentaires.

molle ?

Quelle contient cette notice ?

# AVLOCARDY

PROPRANOLOL

Veuillez lire attentivement cette notice  
médicamenteuse car elle contient des  
informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez y faire référence si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien. • Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il est nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active, le propranolol qui appartient à la famille des bêta-bloquants. Il agit en diminuant la tension artérielle, en réduisant les troubles du rythme cardiaque et en ralentissant le cœur.

Ce médicament est utilisé principalement : • pour traiter une tension artérielle élevée, • pour éviter des douleurs au niveau de la poitrine (crises douloureuses de l'angine de poitrine), • après une crise cardiaque (infarctus du myocarde), • pour des maladies du cœur et des vaisseaux causées par un taux élevé d'hormones thyroïdiennes dans le sang, • pour traiter certaines maladies du cœur et notamment certains troubles du rythme cardiaque, • pour éviter des migraines, • pour traiter certains types de tremblements, • pour éviter des palpitations liées par une situation stressante (tel que le trac), • pour éviter des saignements digestifs chez les personnes qui souffrent d'une maladie grave du foie (cirrhose).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

### Ne prenez jamais AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le propranolol) ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la section 6.
- Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement des bronches et des poumons (bronchopneumopathie chronique obstructive).
- Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque non contrôlée par un traitement.
- Si vous avez eu un problème cardiaque grave (choc cardiogénique).
- Si votre tension artérielle élevée est causée par une maladie d'une glande située au-dessus du rein (phéochromocytome non traité).
- Si vous souffrez d'une certaine forme d'angine de poitrine appelée angor de Prinzmetal (reconnaissable par des douleurs au niveau de la poitrine).
- Si votre cœur bat trop lentement (moins de 45-50 battements par minute).
- Si vous souffrez de troubles de la conduction : blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième

• agrés, bloc sino-auriculaire.

- Si vous avez des problèmes d'écoulement du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (séropathie de Raynaud).
- Si vous avez une maladie très grave du foie.
- avec une tension artérielle basse.
- Si vous avez une maladie qui peut entraîner une hypoglycémie (taux de sucre trop bas dans le sang).

### 3. ASSESSMENTS ET PRÉCAUTIONS

Avant de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable.

Vous devez prévenir votre pharmacien : • Si vous avez un taux de sucre élevé dans le sang (diabète), • Si vous avez une maladie grave du foie et/ou du rein, • Si vous avez une maladie de la peau (psoriasis), • Si vous avez déjà eu des allergies, • Si vous avez une maladie de la circulation sanguine (telle que la maladie de Raynaud), • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, • Si vous avez des antécédents cardiaques.

Vous ne devez jamais arrêter brutalement votre traitement sans avoir demandé, au préalable, l'avis de votre pharmacien.

• Si vous devez subir une opération, vous devez prévenir votre anesthésiste que vous prenez ce médicament.

### Patients devant faire attention au risque d'hypoglycémie

Une hypoglycémie est un taux trop bas de sucre dans le sang. Ce médicament peut aggraver une hypoglycémie en particulier, chez les personnes souffrant de diabète et les personnes non diabétiques mais qui sont prédisposées à l'hypoglycémie (le nourrisson, l'enfant, la personne âgée, les personnes souffrant d'une maladie du foie, les personnes sous dialyse, les personnes qui ont fait un jeûne ou les personnes qui ont pris trop de comprimés).

Cette hypoglycémie peut conduire à des convulsions ou un coma. Vous reconnaîtrez les signes annonciateurs d'une hypoglycémie par une faiblesse, des sueurs, une fringale, des tremblements, une somnolence, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré. Si l'un de ces signes survient, mangez ou buvez quelque chose de sucré et contactez votre pharmacien.

La substance active de ce médicament (le propranolol) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle antidopage.

### Autres médicaments et AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

Sauf avis contraire de votre pharmacien, n'utilisez pas AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable avec certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium : bépridil, diltiazem, vérapamil et flunarizine). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

### Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, si certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

### Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence,

AVLOCARDYL 40 MG  
CP SEC B50  
P.P.V. 410H80  
PER. 10 2023  
LOT. 222309



118882 618221

**ACETHIO 500 mg / 2 mg, comprimés, Boite de 20**  
D.G. : Paracétamol/Thiocolchicoside

P.P.V. :

32,00

LOT :

EXP :



vomissements, prévenez votre médecin.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites dans la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose supérieure à 6 comprimés par 24 heures. La durée du traitement est limitée à 7 jours consécutifs.

Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifier que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol.

Prévenez votre médecin en cas de maladie du foie ou des reins, ou d'abus d'alcool.

Prévenez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol.

En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, ACETHIO comprimés doit être utilisé avec précaution.

Ce médicament contient l'amidon de blé qui peut contenir des traces de gluten.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

**Enfants et adolescents :** N'administrez pas ce médicament aux enfants ou aux adolescents âgés de moins de 16 ans pour des raisons de sécurité.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Interactions avec d'autres médicaments :**

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang ou un dosage de la glycémie.

ACETHIO peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**Interactions avec les aliments et les boissons :**

Sans objet.

**Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :**

Sans objet.

**Grossesse et allaitement :**

Ne prenez pas ce médicament : "si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte. "Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception.

Ce médicament peut mettre en danger votre enfant. Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez car il passe dans le lait maternel.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

**Sportifs :** Sans objet.

**Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :**

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence liées à l'usage de ce médicament même si elles restent très rares.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

**Mises en garde spéciales :**

Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir rubrique : Posologie).

**Précautions particulières d'emploi :**

En cas de diarrhée, de douleurs d'estomac, de nausées ou de

**ACETHIO 500 mg / 2 mg, comprimés, Boîte de 20**  
D.G. : Paracétamol/Thiocolchicoside

P.P.V. :

32,00

LOT :

EXP :



vomissements, prévenez votre médecin.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites dans la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose supérieure à 6 comprimés par 24 heures. La durée du traitement est limitée à 7 jours consécutifs.

Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifier que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol.

Prévenez votre médecin en cas de maladie du foie ou des reins, ou d'abus d'alcool.

Prévenez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol.

En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, ACETHIO comprimés doit être utilisé avec précaution.

Ce médicament contient l'amidon de blé qui peut contenir des traces de gluten.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

**Enfants et adolescents :** N'administrez pas ce médicament aux enfants ou aux adolescents âgés de moins de 16 ans pour des raisons de sécurité.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Interactions avec d'autres médicaments :**

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang ou un dosage de la glycémie.

ACETHIO peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

**Interactions avec les aliments et les boissons :**

Sans objet.

**Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :**

Sans objet.

**Grossesse et allaitement :**

Ne prenez pas ce médicament : "si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte. "Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception.

Ce médicament peut mettre en danger votre enfant. Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez car il passe dans le lait maternel.

**D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.**

**Sportifs :** Sans objet.

**Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :**

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence liées à l'usage de ce médicament même si elles restent très rares.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

**1. QU'EST-CE QUE ACETHIO ® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :** Paracétamol : analgésique, antipyrrétique. (Code ATC : N02BE01). Thiocolchicoside : myorelaxant. (Code ATC : M03BX05).

**Indications thérapeutiques :**

- Traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en pathologie rachidienne aigüe chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ACETHIO ® COMPRIMÉS ?**

Liste des informations à connaître avant la prise du médicament Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Contre-indications :**

Ne prenez jamais ACETHIO ®, dans les cas suivants :  
- Si vous êtes allergique au thiocolchicoside et/ou au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.  
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.  
- Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte.  
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception.  
- Si vous allaitez.  
- Insuffisance hépatocellulaire ou maladie grave du foie.  
- Enfants de moins de 16 ans.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**  
FAITES ATTENTION AVEC ACETHIO ® 500 mg / 2 mg.

**Mises en garde spéciales :**

Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir rubrique : Posologie).

**Précautions particulières d'emploi :**

En cas de diarrhée, de douleurs d'estomac, de nausées ou de



Gélule  
Voie orale

# Relaxium B6

Deva  
Pharmaceutique

## QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### XANT

LOT : 220306  
DUOD : 05/2026  
87.00DH

maltodextrine, dioxyde de silicium.

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin ..... 650 mg  
équivalent en Magnésium ..... 375 mg

Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### FORME ET PRÉSENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

### PROPRIÉTÉS

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

### VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

#### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

#### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

#### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

**Dr. Rachid Ben Khattab Sefrioui**

**CARDIOLOGUE**

Diplôme de la Faculté de Médecine de Lille ( FRANCE)

Ancien Médecin Attaché des Hôpitaux Français

Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

Echographie Doppler Couleur Cardiaque et Vasculaire,

Holter Rythmique et Tensionnel

Epreuve d'effort

**الدكتور رشيد بن الخطاب الهمري**

طبيب إختصاصي في أمراض القلب والشريان

نخصن القلب والشريان باصري و الدربيل بالألوات

• تخطيط القلب لذئب الهمري

خريج كلية الطب بليل (فرنسا)

طبيب إختصاصي بمستشفيات فرنسا سابقا



Casablanca le : 10 Octobre 2023 ..... الدار البيضاء في :

**ANALYSES MEDICALES**

Mme NAJIB FATIMA B

GLYCÉMIE À JEUN

TROPONINE SANGUINE ( résultat d'urgence SVP )

N.F.S PLAQUETTES

V.S

CREATININE SANGUINE

T.G.O - T.G.P

LABORATOIRE D'ANALYSES  
DE BIOLOGIE MÉDICALE AL QODS  
158 BD DE GRANGE CINTURE  
HAY MOHAMMAUD - CASABLANCA  
TEL: 05 22 60 18 65 / 05 22 63 78 74  
FAX: 05 22 60 78 68

دكتور رشيد بن الخطاب الهمري  
Dr. SEFRIoui BENKHATTAB Rachid  
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél: 05 22 73 15 00 / 05 22 76 77 76

# مختبر التحاليل الطبية القدس

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Casablanca le 11 octobre 2023

Mme NAJIB FATIMA

FACTURE N°	25110
------------	-------

## Analyses :

B216 Numération formule sanguine -----	B	80	
B223 Vitesse de sédimentation -----	B	30	
B118 Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
B111 Créatinine -----	B	30	
B146 +B147 Transaminases -----	B	100	
B149 Troponine -----	B	250	Total : B 520

## Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER 582,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cinq Cent Quatre vingt Deux Dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES  
DE BIologie MEDICALE AL QODS  
158, Bd. de la Grande Ceinture - Hay Mohammadi - Tél : 0522 60 18 65 / 0522 63 78 74 - Fax 0522 60 78 68 - Casablanca  
Patente N° : 31800310 - I.F : 48001330 - I.C.E : 001701811000003

# مختبر التحاليل الطبية القدس

## Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Edition du : 11/10/23

Réf. : 23J904

Code patient : 90076 du : 11/10/23

Mme NAJIB FATIMA

Docteur SEFRIoui BEN KHATTAB R

		Normales
Transaminases - SGOT / ASAT -----:	22 UI/l	< 32
Transaminases - SGPT / ALAT -----:	10 UI/l	< 45

### MARQUEURS CARDIAQUES

Troponine ----- : 0,02 ng/ml < 0,06  
Tech, immunoenzymatique,  
AIA Pack cTnI 3ème Génération Ultrasensible (Tosoh Bioscience)

15- AVENUE DE LA GRANDE CEINTURE  
LABORATOIRE D'ANALYSES  
DE BIOLOGIE MEDICALE AL QODS  
HAY MOHAMMADI  
TEL: 05 24 01 855 / 05 24 2663 7874  
FAX: 05 24 01 855 / 05 24 2663 7866

# مختبر التحاليل الطبية القدس

## Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale AL QODS

LARBI RAMDANI pharmacien biologiste

Edition du : 11/10/23

Réf. : 23J904

Code patient : 90076 du : 11/10/23

Mme NAJIB FATIMA

Docteur SEFRIoui BEN KHATTAB R

### HEMATOLOGIE

#### NUMERATION FORMULE SANGUINE

##### GLOBULES ROUGES

			Normales
Hématies -----	4,81	M/mm <sup>3</sup>	4,2 - 5,2
Hémoglobine -----	12,8	g/100 ml	11,3 - 16
Hématocrite -----	40	%	35 - 46
- V.G.M. -----	82	μ <sup>3</sup>	75 - 102
- T.C.M.H. -----	27 *	pg	28 - 32
- C.C.M.H. -----	32,3	g/100 ml	31 - 37

##### GLOBULES BLANCS

Numération des leucocytes -----	<b>5 740</b>	/mm <sup>3</sup>	3750 - 13000
Polynucléaires Neutrophiles -----	55,1	%	50 - 70
Soit :	<b>3 163</b>	/mm <sup>3</sup>	1500 - 7500
Polynucléaires Eosinophiles -----	2,0	%	1 - 3
Soit :	<b>115</b>	/mm <sup>3</sup>	40 - 300
Polynucléaires Basophiles -----	0,3	%	< 1
Soit :	<b>17</b>	/mm <sup>3</sup>	< 100
Lymphocytes -----	35,8	%	20 - 40
Soit :	<b>2 055</b>	/mm <sup>3</sup>	1500 - 4000
Monocytes -----	6,8	%	1 - 8
Soit :	<b>390</b>	/mm <sup>3</sup>	40 - 1000

##### PLAQUETTES

Résultat -----	<b>207 000</b>	/mm <sup>3</sup>	150000 - 400000
Indice de distribution des plaquettes (IDP)-----	16,6	fl	15 - 17
Volume plaquettaire moyen (VPM)-----	11,1	fl	6,5 - 12
Rapport des grandes plaquettes (P-RGC)-----	34,6	%	11 - 45

#### VITESSE DE SEDIMENTATION

		Normales
1 <sup>ère</sup> heure -----	11 * mm	< 10
2 <sup>ème</sup> heure -----	33 * mm	< 20

### BIOCHIMIE

Glycémie -----	0,96	g/l	0,7 - 1,1
Soit :	5,30	mmol/l	3,88 - 6,11
Créatinine -----	6,50	mg/l	5 - 9
Soit :	57,52	μmol/l	44,25 - 79,65

LABORATOIRE D'ANALYSES  
DE BILOGIE MÉDICALE AL QODS  
158, Bd. de la Grande Ceinture - Hay Mohammadi - Tél : 0522 60 18 65 / 0522 63 78 74  
Patente N° : 31800310 - I.F : 48001330 - I.C.E : 001701811000003

# CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIOVASCULAIRES

**Dr. Rachid Ben khattab Sefrioui**  
CARDIOLOGUE

Diplôme de la Faculté de Médecine de Lille ( FRANCE)

Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

Echographie Doppler Couleur Cardiaque et Vasculaire

Holter Rythmique et Tensionnel

Epreuve d'effort

Casablanca le : ..... 10/10/23

20:19:36

## ECHO-DOPPLER CARDIAQUE

**Nom , Prénoms : Madame NAJIB FATIMA B**

**Age : 80 ans**

**Indications : Dyspnée d'effort**

**Observations : Echogénicité moyenne**

### ETUDE BIDIMENSIONNELLE ET TM :

**Ventricule gauche :** Cinétique globale et segmentaire normale

Diamètre télédiastolique =	<b>40 mm</b>	Diamètre télésystolique =	<b>23 mm</b>	F.R = 43 %
Septum IVen diastole =	<b>9 mm</b>	Paroi post.en diastole =	<b>8 mm</b>	F.E = 72 %

**Oreillette gauche :** 17 mm      **Diamètre Ao :** 29 mm      **Ouverture Sygmoïde :** 17 mm

**Aorte :** de diamètre normal

**Sigmoïdes aortiques :** Sont fines , de cinétique normale

**Valves mitrale :** Sont fines , de cinétique normale

**Valves tricuspidé :** normale

**Valves pulmonaires :** normale

**Cavités cardiaques d. :** Sont de taille normale

**Pericarde** Pericarde sec

**Surface V. Aort**

### ETUDE DOPPLER

**Flux mitral :** Normal

**Flux Aortique :** Normal

**Vit. E : 0.7 m/s**

**Flux Tricuspidé :** Normal

**E/A < 1**

**Flux pulmonaire :**

**VTI Ao = 26 cm**

### CONCLUSION :

**Fonction ventriculaire gauche systolique normale FE = 70 %**

**Trouble de la fonction diastolique du VG ;**

**Les cavités cardiaques droites et gauches sont de taille normale**

**Absence d'atteinte valvulaire**

**Péricarde sec**

الدكتور رشيد بن الخطاب السفريوي  
Dr. SEFRIOUT BENKHATTAB Rachid  
CARTIOLOGIE  
Amal 3 Rue 3 N° 6 Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél.: 05 22 73 15-00/05 22 76 77 76