

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
 0 Prise en charge : pec@mupras.com
 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-812901

239636

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9710

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

LAABIBATE ABDELKADER

Date de naissance :

1947

Adresse :

CITG AZHAR IMIO NR LIBERNUSSI

Tél. : 0680495569

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

ME LAABIBATE ABDELKADER

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

Autorisation CNDP N° : AA-215/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
X12/10/23	G	300	DH	INPE:091199687 DI: MARYAM AL ADESSA CARO DENTAL Bd. Faid: Rte. des Russes INP N°122 Ain Chock - Casablanca 0522 522 530 - INPE:091199687

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
MARPHACIE ESCUELLA M. KHEIARI P. EL OKACH ASSOCIATION ALAZHAR Immeuble 1. N° 2 Ahi Loghiam Sidi Benoussel CASABLANCA Tél.: 05 22 75 00 00	12/10/23	4890,90

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DEBUT D'EXECUTION [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	FIN D'EXECUTION [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DATE DU DEVIS [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DATE DE L'EXECUTION [REDACTED]

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hasnaa FARESSE

Spécialiste en Cardiologie et Maladies Vasculaires
 Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca
 Diplômée en Echocardiographie de la Faculté
 Victor Ségalen Bordeaux II France
 Diplômée en Echocardiographie Congénitale
 et Pédiatrique Université Claude Bernard Lyon France
 Ex. Interne au CHU de Casablanca
 Ex. Interne au CHU de Rouen - France



الدكتورة فارس حسناء

اختصاصية في أمراض القلب والشرايين
 خريجة كلية الطب بالبيضاء
 خريجة كلية الطب فيكتور سيفاكالين بوردو فرنسا
 في تشخيص أمراض القلب للأطفال والرضع
 دبلوم أمراض القلب للأطفال والرضع
 من كلية كلود برنار ليون فرنسا
 طببية داخلية سابقة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء
 طببية سابقة بالمستشفى الجامعي روون بفرنسا

Casablnaca, le :

12 / 10 / 23

MF LAARBOURATE

ABDELKADER

31,6,00 x 3

(1)

Phamix 75 mg. 1-0-0

N.S

27,7,00 x 3

(2)

Cardiaspirine 100, 0 - 1 - 0

N.S

113,70 x 3

(3)

Ronciphex 20, 1-0-0

N.S

79,50 x 3

(4)

Dynotens gtt. 20glt x 21J

N.S

46,7,00 x 6

(5)

Gonarel 2mg. 1-0-1

N.S

1890,90

Dr. Hasnaa FARESSE
CARDIOLOGUE
 Bd El Qods Rés. Les Rosiers Imm. 1
 N°122 Ain Chock - Casablanca
 Tél.: 0522 522 530 - INFF: 091199687

III de Zui

RDV de Zui

شارع القدس، إقامة الورود، الطابق 1 الرقم 112 - عين المشرق - الدار البيضاء

Bd. El Qods Résidence les Rosiers 1er Etage N° 112, Ain Chock - Casablanca

Tél.: 0522 522 530-0663 800 124 - Email: faresse.h1@hotmail.com

PPV : 46 DH 70

Lot/Batch :

2R637

Fab/Mfg:

04/22

EXP. :

03/2025

Lot/Batch :

2R637

Fab/Mfg:

04/22

EXP. :

03/2025

PPV : 46 DH 70

Lot/Batch :

2R637

Fab/Mfg:

04/22

EXP. :

03/2025

PPV : 46 DH 70

Lot/Batch :

2R637

Fab/Mfg:

04/22

EXP. :

03/2025

Ranciphex® 10 et 20 mg

Rabéprazole sodique

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un douleur, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

RANCIPHEX® 10 mg
RANCIPHEX® 20 mg

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

RANCIPHEX® 10 mg
RANCIPHEX® 20 mg

La substance active est:

Rabéprazole sodique

Pour un comprimé gastro-résistant.

La substance active est:

Rabéprazole sodique 20 mg

Pour un comprimé gastro-résistant.

Les autres composants:

Magnésium, oxyde de magnésium, hydroxypropylcellulose fabriquée partiellement substituée, hydroxypropylcellulose, stératate de magnésium, éthylcellulose, phthalate d'hydropropionate, monoglycérides diacétyle, lact, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente sous forme de comprimés® gastro-résistants. Boîte de 14, 28 et 56.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons.

RANCIPHEX® contient la substance active rabéprazole qui appartient au groupe de médicaments appelés «inhibiteurs de la Pompe à Proton» fonctionnant par diminution de la quantité d'acide produite.

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES:

RANCIPHEX® est utilisé dans le traitement:

- Du reflux Gastro-Œsophagien (REGO).

Le REGO se produit lorsque de l'acide:

Les effets indésirables sont généralement modérés et s'améliorent sans que vous ayiez besoin d'arrêter le principe de médicament.
Arrêtez de prendre RANCIPHEX® et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical urgent:

- Réactions allergiques - les signes peuvent inclure : gonflement soudain de votre visage, difficultés à respirer ou pression sanguine basse pouvant causer un événement ou une crise.
- Signes fréquents d'infection, tels qu'un mal de gorge, une température élevée (fièvre), ou un ulcère dans votre (tête, cou ou abdomen) ou sanglants (côtes, rectum).
- Ces effets indésirables sont rares.
- Eruptions vésiculeuses, douleur Cutanée, indésirables sont rares.

Autres effets indésirables possibles
Fréquents (touchent moins de 10% des patients).

Infections.
Sommeil difficile.

Maux de tête, vertiges.

Toux, régurgitation de la bile, flatulence, nausées, vomissements.

Courbatures ou mal de dos.
Fibrillation ou syndrome pseudo-fibrillaire.

Peu fréquents (touchent moins de 1% des patients).

Nervosité ou somnolence.
Infection au niveau des poumons.

Sinus douleurs et bouchés (nasal).
Bouche sèche.

Indigestion ou rôts (éruptions cutanées).
Éruption cutanée ou rougeur de la peau.

Douleur au niveau des muscles, des jambes ou des articulations.

Infection de la vessie (infection des voies urinaires).
Douleur thoracique.

Frissons ou fièvre.
Modifications du fonctionnement de votre foie (mesurable par des tests sanguins).

Perce d'appétit (anorexie).
Dépression.
Hypersensibilité (indiquant des réactions allergiques).

Troubles visuels.

GTIN: 16118001300805
Lot No: PT01860A
EXP.: 05/2024
S.N.: NFZNZUJK2U3

PPV: 113 DH 70

Ranciphex® 10 et 20 mg

Rabéprazole sodique

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un douleur, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

RANCIPHEX® 10 mg
RANCIPHEX® 20 mg

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

RANCIPHEX® 10 mg
RANCIPHEX® 20 mg

La substance active est:

Rabéprazole sodique Pour un comprimé gastro-résistant.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente sous forme de comprimés[®] gastro-résistants. Boîte de 14, 28 et 56.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons.

RANCIPHEX[®] contient la substance active rabéprazole sodique appartenant au groupe de médicaments appelés « inhibiteurs de la Pompe à Protons » fonctionnant par diminution de la quantité d'acide produit.

Les effets indésirables sont généralement modérés et s'améliorent sans que vous ayiez besoin d'arrêter le principe actif.

Arrêtez de prendre RANCIPHEX[®] et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical urgent:

• Réactions allergiques - ces signes peuvent inclure : gonflement soudain de votre visage, difficultés à respirer ou pression sanguine basse pouvant causer un évanouissement ou une crise.

• Signes fréquents d'infection, tels qu'un mal de gorge, une température élevée (fièvre), ou un ulcère dans votre (estomac).

• Confusions ou saignements (tak). Ces effets indésirables sont rares.

• Eruptions vésiculeuses, douleur. Ces effets indésirables sont rares.

Autres effets indésirables possibles Fréquents (touchent moins de 10% des patients)

Infections, Infections.

Sommeil difficile, Sommeil difficile.

Maux de tête, vertiges, Maux de tête, vertiges.

Toux, régurgitation ou mal de gorge, Toux, régurgitation ou mal de gorge.

États sur votre estomac ou vasteur, nausées, vomissements, États sur votre estomac ou vasteur, nausées, vomissements.

Courbatures ou mal de dos, Courbatures ou mal de dos.

Fâchesse ou syndrome pseudo-peptic, Fâchesse ou syndrome pseudo-peptic.

Peu fréquents (touchent moins de 1% des patients)

Nervosité ou somnolence, Nervosité ou somnolence.

Infection au niveau des poumons, Infection au niveau des poumons.

Sinus douleurs et bouchages, Sinus douleurs et bouchages.

Bouche sèche, Bouche sèche.

Indigestion ou rôts (éruptions), Indigestion ou rôts (éruptions).

Éruption cutanée ou rougeur de la peau, Éruption cutanée ou rougeur de la peau.

Douleur au niveau des muscles, des jambes ou des articulations, Douleur au niveau des muscles, des jambes ou des articulations.

Infection de la vessie (infection des voies urinaires), Infection de la vessie (infection des voies urinaires).

Frissons ou fièvre, Frissons ou fièvre.

Modifications du fonctionnement de votre foie (mesurable par des tests sanguins).

Perte d'appétit (anorexie), Perte d'appétit (anorexie).

Hypersensibilité (indiquant des réactions allergiques), Hypersensibilité (indiquant des réactions allergiques).

Troubles visuels, Troubles visuels.

Le R00 se produit lorsque de l'acide :

votre p[®] votre p[®].

GTIN: 16118001300805
Lot No: PT01860A
EXP.: 05/2024
S.N.: NFZNZUJK2U3

PPV: 113 DH 70

Ranciphex® 10 et 20 mg

Rabéprazole sodique

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un douleur, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

RANCIPHEX® 10 mg
RANCIPHEX® 20 mg

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

RANCIPHEX® 10 mg
RANCIPHEX® 20 mg

La substance active est:

Rabéprazole sodique

Pour un comprimé gastro-résistant.

La substance active est:

Rabéprazole sodique 20 mg

Pour un comprimé gastro-résistant.

Les autres composants:

Magnésium, oxyde de magnésium, hydroxypropylcellulose fabriquée partiellement substituée, hydroxypropylcellulose, stératate de magnésium, éthylcellulose, phthalate d'hydropropionate, monoglycérides diacétyle, lact, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente sous forme de comprimés® gastro-résistants. Boîte de 14, 28 et 56.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons.

RANCIPHEX® contient la substance active rabéprazole qui appartient au groupe de médicaments appelés «inhibiteurs de la Pompe à Proton» fonctionnant par diminution de la quantité d'acide produite.

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES:

RANCIPHEX® est utilisé dans le traitement:

- Du reflux Gastro-Œsophagien (REGO).

Le REGO se produit lorsque de l'acide:

Les effets indésirables sont généralement modérés et s'améliorent sans que vous ayiez besoin d'arrêter le principe de médicament.
Arrêtez de prendre RANCIPHEX® et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical urgent:

- Réactions allergiques - les signes peuvent inclure : gonflement soudain de votre visage, difficultés à respirer ou pression sanguine basse pouvant causer un événement ou une crise.
- Signes fréquents d'infection, tels qu'un mal de gorge, une température élevée (fièvre), ou un ulcère dans votre (tête, cou ou abdomen) ou sanglants (côtes, rectum).
- Ces effets indésirables sont rares.
- Eruptions vésiculeuses, douleur Cutanée, indésirables sont rares.

Autres effets indésirables possibles
Fréquents (touchent moins de 10% des patients).

Infections.
Sommeil difficile.

Maux de tête, vertiges.

Toux, régurgitation de la bile, flatulence, nausées, vomissements.

Courbatures ou mal de dos.
Fibrillation ou syndrome pseudo-fibrillaire.

Peu fréquents (touchent moins de 1% des patients).

Nervosité ou somnolence.
Infection au niveau des poumons.

Sinus douleurs et bouchés (nasal).
Bouche sèche.

Indigestion ou rôts (éruptions cutanées).
Éruption cutanée ou rougeur de la peau.

Douleur au niveau des muscles, des jambes ou des articulations.

Infection de la vessie (infection des voies urinaires).
Douleur thoracique.

Frissons ou fièvre.
Modifications du fonctionnement de votre foie (mesurable par des tests sanguins).

Perce d'appétit (anorexie).
Dépression.
Hypersensibilité (indiquant des réactions allergiques).

Troubles visuels.

GTIN: 16118001300805
Lot No: PT01860A
EXP.: 05/2024
S.N.: NFZNZUJK2U3

PPV: 113 DH 70

attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous pourriez avoir besoin de la relire, ou si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en

cas identiques, cela pourrait lui être nocif. Si vous remarquez un effet indésirable non désiré, devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non désiré, devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non désiré, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

RDIOASPIRINE®

mg, comprimés gastro-résistants

ans quel cas est-il utilisé ?
connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Dans le dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'estrique, le comprimé ne se suqueuse gastrique.

attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous pourriez avoir besoin de la relire, ou si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en

cas identiques, cela pourrait lui être nocif. Si vous remarquez un effet indésirable non désiré, devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non désiré, devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non désiré, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

RDIOASPIRINE®

mg, comprimés gastro-résistants

ans quel cas est-il utilisé ?
connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'estomac, le comprimé ne se suqueuse gastrique.

attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous pourriez avoir besoin de la relire, ou si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en

cas identiques, cela pourrait lui être nocif. Si vous remarquez un effet indésirable non désiré, devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non désiré, devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non désiré, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

RDIOASPIRINE®

mg, comprimés gastro-résistants

ans quel cas est-il utilisé ?
connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Dans le dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'estrique, le comprimé ne se suqueuse gastrique.

Plavix® 75 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donner pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qui est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix.

3. Comment prendre Plavix.

Quels sont les effets indésirables éventuels.

Comment conserver Plavix.

Comment détruire le contenu de l'emballage et autres informations.

CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Le Plavix® (clopidogrel) et appartiennent à une classe de médicaments appelés

plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang

qui, lors de la coagulation du sang, empêchent cette aggrégation, les plaquettes réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène

adulte pour éviter la formation de caillots sanguins (thrombus) dans les

veines deviennent rigides. Cette maladie également appelée

maladie de l'artère, peut entraîner à la survenue d'événements atherosclerotiques (tels que

la crise cardiaque, ou le décès), empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque

grave car, aussi connu sous le nom d'atherosclerose), et

l'angine, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une

maladie, un accident vasculaire cérébral ou

grave connue sous le nom d'angor instable ou

quelque. Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose

peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse)

(jaunesse).

Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, arrêtez du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la

formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien consuler d'anormal.

Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre

médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").

Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens.

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison

Autres médicaments et Plavix

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, ou

ordonnance,

Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Plavix.

Vous devez informer avec précision votre médecin si vous

des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de

des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer l'anti-inflammatoire non stéroïdien, médicament utilisé pour diminuer le douleur et/ou les malades inflammations des muscles ou des articulations, ou à ce moment ou tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang,

de la ticlopidine, un autre anti-agrégant plaquettaire,

un inhibiteur sélectif de la récepteur de la sérotonine (incluant notamment la fluoxétine

ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,

de l'omeprazole ou de l'esoméprazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement

du fluorazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés pour traiter les infections

d'infections longues,

de l'éfavirenz, ou d'autres traitements antirétroviraux (utilisés pour traiter les infections

au VIH),

de la carbamazépine pour le traitement de certaines formes d'épilepsies,

du moclobémide, pour le traitement de la dépression,

du répaglinide, médicamenteusement utilisé pour traiter le diabète,

du paclitaxel, médicamenteusement utilisé pour traiter un cancer,

des opioïdes, si vous êtes traités par du clopidogrel, informez votre médecin avant qu'un

opioïde ne vous soit prescrit (utilisé pour traiter la douleur intense).

Si vous avez eu une douleur thoracique grave (angoisse instable ou crise cardiaque), Plavix peut

vous être prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique, substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une

utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg, sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans

081257

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain setââ Casablanca

Plavix 75 mg, cp pel b 28
P.P.V. 316,00 DH

118001



Plavix® SANOFI

comprimés pelliculés

(clopidogrel)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donner pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qui est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix.

3. Comment prendre Plavix.

Quels sont les effets indésirables éventuels.

Comment conserver Plavix.

Comment détruire le contenu de l'emballage et autres informations.

CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Le Plavix® (clopidogrel) et appartiennent à une classe de médicaments appelés plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation, les plaquettes réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène "adulte" pour éviter la formation de caillots sanguins (thrombus) dans les artères dévagées rigides. Cette maladie également appelée "adulte" pour éviter la survenue d'événements atherosclerotiques (tels que la crise cardiaque, ou le décès), empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque d'accident vasculaire cérébral ou vous avez une maladie, un accident vasculaire cérébral, ou

grave connue sous le nom d'angor instable ou qui. Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose

peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4. Effets indésirables éventuels).

Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, arrêtez du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien consuler d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4. Effets indésirables éventuels).

Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens complémentaires.

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison

Autres médicaments et Plavix

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, ou

ordonnance,

Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Plavix.

Vous devez informer avec précision votre médecin si vous

des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de

des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer l'anti-inflammatoire non stéroïdien, médicament utilisé pour diminuer le douleur et/ou les malades inflammations des muscles ou des articulations, ou à tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang,

ou tout autre médicament utilisé pour diminuer la coagulation du sang,

de la ticlopidine, un autre anti-agrégant plaquétaire,

un inhibiteur sélectif de la récepteur de la serotoninne (incluant notamment la fluoxétine

ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,

de l'omeprazole ou de l'esoméprazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement

du fluorurode ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés pour traiter les infections

d'infections longues,

de l'éfavirenz, ou d'autres traitements antirétroviraux (utilisés pour traiter les infections

au VIH),

de la carbamazépine pour le traitement de certaines formes d'épilepsies,

du moclobémide, pour le traitement de la dépression,

du répaglinide, médicamenteusement utilisé pour traiter le diabète,

du paclitaxel, médicamenteusement utilisé pour traiter un cancer,

des opioïdes, si vous êtes traités par du clopidogrel, informez votre médecin avant qu'un

opioïde ne vous soit prescrit (utilisé pour traiter la douleur intense).

Si vous avez eu une douleur thoracique grave (angoisse instable ou crise cardiaque), Plavix peut

vous être prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique, substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une

utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg, sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain setââ Casablanca

Plavix 75 mg, cp pel b 28
P.P.V. 316,00 DH

081257
118001



Dr Hasnaa FARESSE

Nom : LAABIBATE ABDELKADER

Sex: femell

Lit No:

Date: 12/10/2023 15:42:42

Age:

SN: 0004232

Section:

Cli No.:

CaseNo.:

Fréquence:	1000Hz	QT Interval:	429ms	Prompt:
Temps d'écha	28s	QTc Interval:	446ms	Total Battens 29 , Battements No 29 .
FC:	65bpm	P Axis:	68.40;â	in gear Sinus mode Target rate; Middle Left axis deviation; old anteroseptal
P Interval:	94ms	QRS Axis:	345.00;â	Mi; Abnormal T wave;
QRS Interval:	80ms	T Axis:	107.60;â	
T Interval:	193ms	RV5/SV1	0.62/0.49mV	
PR Interval:	159ms	RV5+SV1	1.10mV	

RRS Fe = 65 / min

Dr Hasnaa FARESSE
CARDIOLOGUE
Bd El Qods Rue Les Rosiers Imm. 1
N° 122 Ain Chock - Casablanca
0522 522 530 - INPE 091197687

Docteur: Dr Hasnaa FARESSE

