

COMMANDATIONS IMPORTANTES À ENFOUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUTRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19-0035492

180202

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1040

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BEN B K I R A AHMID

Date de naissance :

Adresse : HABITUELLE

Tél. : 06 68 29 84 47

Total des frais engagés : 2030,70

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR MIKOU
ENDOCRINOLOGIE DIABETE
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASABLANCA
TEL: 022 31 16 70 - FAX: 022 31 16 70

Date de consultation : 11/11/2012

Nom et prénom du malade : Mousaoui Khadija

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 12/12/2012

Signature de l'adhérent(e) :



Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/10/23	CS		500	Dr MIKO A. ENDOCRINOLOGIE 1630 BD. RAHAL EL MESKINI 022 31 022 31 0674
11 OCT 2023	CS		300	Dr MIKO A. ENDOCRINOLOGIE 1630 BD. RAHAL EL MESKINI 022 31 022 31 0674

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie SMA	11 OCT 2023	450,70
INPE : 092054170		

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr EL KHAFFAFA Hammadi Béchir Ben Youssef Hay Al Qods 86 17 Fax : 05 22 76 84	27/10/23	01270	1280,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

DEVIS DES TRAITEMENTS

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H	25533412 21433552 00000000 00000000	D	MONTANTS DES SOINS
	G	00000000 00000000 35533411 11433553	B	DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur MIKOU Abdelhaq

الدكتور ميكو عبد الحق

Diplômé de la faculté de Médecine de Toulouse
Spécialiste en Endocrinologie - Diabète
Maladies de la nutrition

خريج كلية الطب بتولوز

اختصاصي في

أمراض الغدد، مرض السكر

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol
- Goitre -

السمنة وأمراض الكوليستروول

Sur Rendez-vous

بالموعد

Membre de :

- SFD
 - EASD
 - MGSD
- Société Francophone du Diabète
Association Européenne pour l'Etude du Diabète
Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

11 Oct. 2023

Casablanca, le

Le BENBIR Khadja
18,70 Diamine 60 mg x 10
Oxygent 10 mg x 6
Cetor 10 mg x 10
Sodrix 1,5 mg x 10
Levokystex 10 mg x 10
Cardio AS 100 mg x 10
Vitamul 10 mg x 2
Orexivit 10 mg x 10
D Cetor 10 mg x 10
Levospas 10 mg x 2
Total 100,70

Traitement
Pour 3 Mois

SMAALI Moutassim
Casablanca 02.24.73.19
Pharmacie SMAALI
Roches-Notées
Tél. 02.24.73.19

39. شارع رحالة المسكنى - الطابق (2) - الدار البيضاء - الهاتف (05 22 31 16 30) - هاتف و فاكس : 05 22 31 06 74

39, Bd Rahal El Meskini - 2^{ème} étage - Casablanca - Tél. : 05 22 31 16 30 - Tel/Fax: 05 22 31 06 74

E-mail:famillemikou@gmail.com - INPE:091113076

Dr MIKOU A.
ENDOCRINOLOGIE A.
RACHID EL MESKINI
TEL: 05 22 31 06 74

Notice :

Information de l'utilisateur

D-CURE FORTE 100.000 U.I.

solution buvable en ampoule, boîtes de 3.

Cholécalciférol (Vitamine D 3)

PPV: 49, 60 DH
LOT: 23B09
EXP: 02/2026

لـ ١٥٢ مـ ١٢٧ هـ نـ ١٢٧ هـ مـ ١٢٧ هـ

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 - Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirables non mentionné dans cette notice.
 - Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte?
 3. Comment prendre D-Cure forte?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver D-Cure forte?
 6. Information supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
 - Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
 - si vous avez moins de 18 ans.
 - si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
 - si vous souffrez d'hypercalcurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).



Gélule
Voie orale

Orexivit®

Extrait de fenugrec + Multivitamines + Fer



Solution buvable
Voie orale

Qu'est-ce que OREXIVIT, et dans quels cas est-il utilisé ?

Forme et présentation

OREXIVIT Solution buvable, Flacon de 200 ml

OREXIVIT Gélule, Boîte de 30 gélules

Utilisation

OREXIVIT stimule l'appétit, favorise la prise de poids et procure force et énergie, il est recommandé dans les situations accompagnées d'une perte d'appétit, perte de poids et manque de tonus et d'énergie.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OREXIVIT ?

Propriété

OREXIVIT solution buvable est une association de vita-

OREXIVIT gélule est une association de vitamines et d'

Précautions

Ne pas dépasser la dose recommandée

Grossesse et allaitement

Par mesure de précaution, ne pas administrer chez la femme

favorise la montée de lait pour la femme allaitante

Comment prendre OREXIVIT ?

Posologie

Solution buvable

- Enfants de moins de 5 ans : ½ cuillère à café par jour

- Enfants de 5 à 12 ans : 1 cuillère à café par jour

- Adultes : 2 cuillères à café par jour

LOT: 230245
DLUO: 02/2026
69,00DH

تصانع: أوركسيفيت بجمع بين

واعي الاستعمال: الكبار، لفتيان

صانع الاستعمال: الكبار والأطفال

لأطفال - يحفظ بعيداً عن الرطوبة و



6 111269 050010 >

EVIRIL FORT 100 mg

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée qsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.

- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution d'apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrites.
- proposé dans d'autres polyarthrites supposées d'origine toxicitaire et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;
Voie orale.

- Durée du traitement ;
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.
DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- EFFETS INDESIRABLES

AVANT DE COMMENCER CE TRAITEMENT, IL EST RECOMMANDE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHA

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlez-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMT DE TOUJOURS DEMANDER RE PHARMACIEN AVANT

PPV

LOT

PER

MENT SUR LA CAPACITE UTILISER CERTAINES

EN CAS DE SURDOSSAGE

ISQUE DE SYNDROME DE

rance
ation

le péremption figurant sur la boîte

ui-ci n'est pas le titulaire de

VITANEVRIL® FORT 100 mg

30 comprimés pelliculés

AMM au Maroc



6 118000 180593

éte approuvée est le : 03/2015

352125-06

EVIRIL FORT 100 mg

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée qsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.

- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution d'apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrites.
- proposé dans d'autres polyarthrites supposées d'origine toxicitaire et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;
Voie orale.

- Durée du traitement ;
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.
DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- EFFETS INDESIRABLES

AVANT DE COMMENCER CE TRAITEMENT, VOUS DEVEZ VOUS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHA

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlez-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMT DE TOUJOURS DEMANDER RE PHARMACIEN AVANT

PPV

LOT

PER

MENT SUR LA CAPACITE UTILISER CERTAINES

EN CAS DE SURDOSSAGE

ISQUE DE SYNDROME DE

rance
ation

le péremption figurant sur la boîte

ui-ci n'est pas le titulaire de

VITANEVRIL® FORT 100 mg

30 comprimés pelliculés

AMM au Maroc



éte approuvée est le : 03/2015

352125-06

EVIRIL FORT 100 mg

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée qsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.

- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution d'apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrites.
- proposé dans d'autres polyarthrites supposées d'origine toxicitaire et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;
Voie orale.

- Durée du traitement ;
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.
DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- EFFETS INDESIRABLES

AVANT DE COMMENCER CE TRAITEMENT, VOUS DEVEZ VOUS
DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
EN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHA

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlez-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMT DE TOUJOURS DEMANDER RE PHARMACIEN AVANT

PPV

LOT

PER

MENT SUR LA CAPACITE
UTILISER CERTAINES

EN CAS DE SURDOSSAGE

IN D'UNE OU PLUSIEURS

ISQUE DE SYNDROME DE

france
ation

le péremption figurant sur la boîte
ui-ci n'est pas le titulaire de

VITANEVRIL® FORT 100 mg

30 comprimés pelliculés

AMM au Maroc



6 118000 180593

éte approuvée est le : 03/2015

352125-06

EVIRIL FORT 100 mg

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée qsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.

- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution d'apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrites.
- proposé dans d'autres polyarthrites supposées d'origine toxicitaire et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;
Voie orale.

- Durée du traitement ;
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.
DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- EFFETS INDESIRABLES

AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT, IL EST RECOMMANDE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHA

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlez-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMT DE TOUJOURS DEMANDER RE PHARMACIEN AVANT

PPV

LOT

PER

MENT SUR LA CAPACITE UTILISER CERTAINES

EN CAS DE SURDOSSAGE

IN D'UNE OU PLUSIEURS

ISQUE DE SYNDROME DE

france
ation

le péremption figurant sur la boîte

qui-ci n'est pas le titulaire de

VITANEVRIL® FORT 100 mg

30 comprimés pelliculés

AMM au Maroc



6 118000 180593

éte approuvée est le : 03/2015

352125-06

EVIRIL FORT 100 mg

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée qsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.

- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution d'apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrites.
- proposé dans d'autres polyarthrites supposées d'origine toxicitaire et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;
Voie orale.

- Durée du traitement ;
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.
DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- EFFETS INDESIRABLES

AVANT DE COMMENCER CE TRAITEMENT, VOUS DEVEZ VOUS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHA

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlez-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMT DE TOUJOURS DEMANDER RE PHARMACIEN AVANT

PPV

LOT

PER

MENT SUR LA CAPACITE UTILISER CERTAINES

EN CAS DE SURDOSSAGE

IN D'UNE OU PLUSIEURS

ISQUE DE SYNDROME DE

rance
ation

le péremption figurant sur la boîte

ui-ci n'est pas le titulaire de

VITANEVRIL® FORT 100 mg

30 comprimés pelliculés

AMM au Maroc



éte approuvée est le : 03/2015

352125-06

EVIRIL FORT 100 mg

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée qsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.

- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution d'apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrites.
- proposé dans d'autres polyarthrites supposées d'origine toxicitaire et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;
Voie orale.

- Durée du traitement ;
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.
DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- EFFETS INDESIRABLES

AVANT DE COMMENCER CE TRAITEMENT, VOUS DEVEZ VOUS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHA

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlez-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMT DE TOUJOURS DEMANDER RE PHARMACIEN AVANT

PPV

LOT

PER

MENT SUR LA CAPACITE UTILISER CERTAINES

EN CAS DE SURDOSSAGE

IN D'UNE OU PLUSIEURS

ISQUE DE SYNDROME DE

france
ation

le péremption figurant sur la boîte
ui-ci n'est pas le titulaire de

VITANEVRIL® FORT 100 mg

30 comprimés pelliculés

AMM au Maroc



6 118000 180593

éte approuvée est le : 03/2015

352125-06

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



RCK

LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la fertilité. Le traitement d'une hypothyroïdie par Lévothyrox doit donc être adapté sur la base d'une surveillance biologique car un sous-dosage est susceptible de ne pas améliorer l'hypothyroïdie et un surdosage peut entraîner une hyperthyroïdie.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

Indications thérapeutiques

Il est préconisé dans les situations suivantes :

MeteoSpasmyl®

Capsule molle - Boîte de 20 Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

ce contient cette notice ?

- Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
 3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool
Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si

METEOSPASMYL® B 20 caps molles

Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 100293

peut provoquer des vertiges et cela peut effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

DIAMICRON® 60 mg

Gliclazide

Comprimés sécables à Libération Modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée :

- si vous êtes allergique au gliclazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 5, ou à d'autres médicaments de la même classe (sulfonylurées), ou à d'autres médicaments apparentés (sulfamides hypoglycémiants) ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (de type 1) ;
- si vous avez des corps cétoniques et du sucre dans vos urines (ce qui peut signifier que vous avez une acidocétose diabétique), un pré-coum ou un coma diabétiques ;
- si vous souffrez d'insuffisances rénale ou hépatique sévères ;
- si vous prenez des médicaments pour traiter des infections fongiques (miconazole) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60mg, comprimé sécable à libération modifiée») ;
- si vous allaitez (voir rubrique «Grossesse, allaitement et fertilité»).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.

Vous devez respecter le traitement prescrit par votre médecin pour atteindre une glycémie normale. Cela signifie qu'à part la prise régulière du traitement, vous respectez un régime alimentaire, faites de l'exercice physique et, quand cela est nécessaire, perdez du poids.

Durant le traitement par gliclazide, un contrôle régulier de votre taux de sucre dans le sang (et éventuellement dans les urines), et également de votre hémoglobine glycée (HbA1c), est nécessaire.

Dans les premières semaines de traitement, le risque d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) peut être augmenté. Dans ce cas, un contrôle médical rigoureux est nécessaire.

Une hypoglycémie peut survenir :

- si vous prenez vos repas de manière irrégulière ou si vous sautez un repas,
- si vous jeûnez,
- si vous êtes malnutri,

Si vous changez de régime alimentaire,

- si vous augmentez votre activité physique et que votre apport en hydrates de carbone ne compense pas cette augmentation,

- si vous buvez de l'alcool, en particulier si vous sautez des repas,
- si vous prenez d'autres médicaments ou des remèdes naturels en même temps,
- si vous prenez de trop fortes doses de gliclazide,
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles fonctionnels de la glande thyroïdienne, de la glande hypophysaire ou du cortex surrénal),

• si votre fonction rénale ou hépatique est sévèrement diminuée.

Si vous avez une hypoglycémie, vous pouvez présenter les symptômes suivants : Maux de tête, faim intense, nausées, vomissements, fatigue, troubles du sommeil, agitation, agressivité, manque de concentration, vigilance et temps de réactions diminués, dépression, confusion, troubles de la parole ou de la vision, tremblements, troubles sensoriels, vertiges et sensation d'impuissance.

Les signes et symptômes suivants peuvent aussi survenir : transpiration, peau moite, anxiété, battements du cœur rapides ou irréguliers, augmentation de la pression artérielle, forte douleur subite dans la poitrine qui peut irradier dans les zones proches (angine de poitrine).

Si le taux de sucre dans le sang continue à baisser, vous pouvez souffrir d'une confusion importante (délire), présenter des convulsions, perdre votre sang froid, votre respiration peut être superficielle et les battements de votre cœur ralentis, vous pouvez perdre conscience.

Dans la plupart des cas, les symptômes d'une hypoglycémie disparaissent très rapidement si vous consommez du sucre, par exemple des comprimés de glucose, morceaux de sucre, jus de fruits, thé sucré.

Vous devez donc toujours avoir sur vous du sucre (comprimés de glucose, morceaux de sucre). Souvenez-vous que les édulcorants ne sont pas efficaces. Veuillez contacter votre médecin ou l'hôpital le plus proche si la prise de sucre n'est pas efficace ou si les symptômes réapparaissent.

Les symptômes d'une hypoglycémie peuvent être absents, être moins évidents ou se développer très lentement ou vous pouvez ne pas vous rendre compte à temps que votre taux de sucre dans le sang a baissé. Ceci peut se produire chez les personnes âgées qui prennent certains médicaments (par exemple les médicaments agissant sur le système nerveux central et les bêta-bloquants).

Si vous êtes en situation de stress (par exemple accidents, opération chirurgicale, fièvre, ...), votre médecin peut temporairement faire un relais par un traitement par insuline.

Les symptômes d'une hyperglycémie (fort taux de sucre dans le sang) peuvent survenir lorsque le traitement par gliclazide n'a pas encore suffisamment réduit la glycémie, lorsque vous n'avez pas respecté le traitement prescrit par votre médecin si vous prenez des préparations à base de Millepertuis (Hypericum perforatum) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée») ou dans des situations particulières de stress. Ces derniers peuvent inclure soif, envie fréquente d'uriner, bouche sèche, peau sèche qui démarre, infections de la peau et performances réduites.

Si ces symptômes surviennent, vous devez contacter votre médecin ou votre pharmacien. Une perturbation de la glycémie (faible ou fort taux de sucre dans le sang) peut survenir lorsque le gliclazide est prescrit en même temps que des médicaments de la classe des antibiotiques appelés fluoroquinolones, en particulier chez les patients âgés. Dans ce cas, votre médecin vous rappellera l'importance de surveiller votre glycémie.

Si vous avez des antécédents familiaux ou si vous êtes atteint d'un déficit en Glucose-6-Phosphate-Déshydrogénase (G6PD) (anomalie des globules rouges), une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir.

Dès cas de porphyrie aiguë ont été décrits avec d'autres médicaments de la classe des sulfonylurées chez les patients atteints de porphyrie (maladies génétiques héréditaires provoquant une accumulation dans l'organisme de porphyrines ou de précurseurs de porphyrines).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au valproate, un déficit du glucose 6-phosphate-déhydrogénase (G6PD) ou un syndrome de malabsorption des lipides.

Enfants

DIAMICRON 60 mg chez l'enfant

Autres médicaments

Informez votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament hypoglycémiant, pour surveiller

- autres médicaments agorasiques ou antagonistes de l'insuline
- antibiotiques
- médicaments pour traiter les infections fongiques (miconazole, fluconazole)
- médicaments pour traiter les infections bactériennes

• rétinol, vitamine A, vitamine E, vitamine K, vitamine C, vitamine B12, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B7, vitamine B8, vitamine B9, vitamine B10, vitamine B11, vitamine B12, vitamine B13, vitamine B14, vitamine B15, vitamine B16, vitamine B17, vitamine B18, vitamine B19, vitamine B20, vitamine B21, vitamine B22, vitamine B23, vitamine B24, vitamine B25, vitamine B26, vitamine B27, vitamine B28, vitamine B29, vitamine B30, vitamine B31, vitamine B32, vitamine B33, vitamine B34, vitamine B35, vitamine B36, vitamine B37, vitamine B38, vitamine B39, vitamine B40, vitamine B41, vitamine B42, vitamine B43, vitamine B44, vitamine B45, vitamine B46, vitamine B47, vitamine B48, vitamine B49, vitamine B50, vitamine B51, vitamine B52, vitamine B53, vitamine B54, vitamine B55, vitamine B56, vitamine B57, vitamine B58, vitamine B59, vitamine B60, vitamine B61, vitamine B62, vitamine B63, vitamine B64, vitamine B65, vitamine B66, vitamine B67, vitamine B68, vitamine B69, vitamine B70, vitamine B71, vitamine B72, vitamine B73, vitamine B74, vitamine B75, vitamine B76, vitamine B77, vitamine B78, vitamine B79, vitamine B80, vitamine B81, vitamine B82, vitamine B83, vitamine B84, vitamine B85, vitamine B86, vitamine B87, vitamine B88, vitamine B89, vitamine B90, vitamine B91, vitamine B92, vitamine B93, vitamine B94, vitamine B95, vitamine B96, vitamine B97, vitamine B98, vitamine B99, vitamine B100, vitamine B101, vitamine B102, vitamine B103, vitamine B104, vitamine B105, vitamine B106, vitamine B107, vitamine B108, vitamine B109, vitamine B110, vitamine B111, vitamine B112, vitamine B113, vitamine B114, vitamine B115, vitamine B116, vitamine B117, vitamine B118, vitamine B119, vitamine B120, vitamine B121, vitamine B122, vitamine B123, vitamine B124, vitamine B125, vitamine B126, vitamine B127, vitamine B128, vitamine B129, vitamine B130, vitamine B131, vitamine B132, vitamine B133, vitamine B134, vitamine B135, vitamine B136, vitamine B137, vitamine B138, vitamine B139, vitamine B140, vitamine B141, vitamine B142, vitamine B143, vitamine B144, vitamine B145, vitamine B146, vitamine B147, vitamine B148, vitamine B149, vitamine B150, vitamine B151, vitamine B152, vitamine B153, vitamine B154, vitamine B155, vitamine B156, vitamine B157, vitamine B158, vitamine B159, vitamine B160, vitamine B161, vitamine B162, vitamine B163, vitamine B164, vitamine B165, vitamine B166, vitamine B167, vitamine B168, vitamine B169, vitamine B170, vitamine B171, vitamine B172, vitamine B173, vitamine B174, vitamine B175, vitamine B176, vitamine B177, vitamine B178, vitamine B179, vitamine B180, vitamine B181, vitamine B182, vitamine B183, vitamine B184, vitamine B185, vitamine B186, vitamine B187, vitamine B188, vitamine B189, vitamine B190, vitamine B191, vitamine B192, vitamine B193, vitamine B194, vitamine B195, vitamine B196, vitamine B197, vitamine B198, vitamine B199, vitamine B200, vitamine B201, vitamine B202, vitamine B203, vitamine B204, vitamine B205, vitamine B206, vitamine B207, vitamine B208, vitamine B209, vitamine B210, vitamine B211, vitamine B212, vitamine B213, vitamine B214, vitamine B215, vitamine B216, vitamine B217, vitamine B218, vitamine B219, vitamine B220, vitamine B221, vitamine B222, vitamine B223, vitamine B224, vitamine B225, vitamine B226, vitamine B227, vitamine B228, vitamine B229, vitamine B230, vitamine B231, vitamine B232, vitamine B233, vitamine B234, vitamine B235, vitamine B236, vitamine B237, vitamine B238, vitamine B239, vitamine B240, vitamine B241, vitamine B242, vitamine B243, vitamine B244, vitamine B245, vitamine B246, vitamine B247, vitamine B248, vitamine B249, vitamine B250, vitamine B251, vitamine B252, vitamine B253, vitamine B254, vitamine B255, vitamine B256, vitamine B257, vitamine B258, vitamine B259, vitamine B260, vitamine B261, vitamine B262, vitamine B263, vitamine B264, vitamine B265, vitamine B266, vitamine B267, vitamine B268, vitamine B269, vitamine B270, vitamine B271, vitamine B272, vitamine B273, vitamine B274, vitamine B275, vitamine B276, vitamine B277, vitamine B278, vitamine B279, vitamine B280, vitamine B281, vitamine B282, vitamine B283, vitamine B284, vitamine B285, vitamine B286, vitamine B287, vitamine B288, vitamine B289, vitamine B290, vitamine B291, vitamine B292, vitamine B293, vitamine B294, vitamine B295, vitamine B296, vitamine B297, vitamine B298, vitamine B299, vitamine B300, vitamine B301, vitamine B302, vitamine B303, vitamine B304, vitamine B305, vitamine B306, vitamine B307, vitamine B308, vitamine B309, vitamine B310, vitamine B311, vitamine B312, vitamine B313, vitamine B314, vitamine B315, vitamine B316, vitamine B317, vitamine B318, vitamine B319, vitamine B320, vitamine B321, vitamine B322, vitamine B323, vitamine B324, vitamine B325, vitamine B326, vitamine B327, vitamine B328, vitamine B329, vitamine B330, vitamine B331, vitamine B332, vitamine B333, vitamine B334, vitamine B335, vitamine B336, vitamine B337, vitamine B338, vitamine B339, vitamine B340, vitamine B341, vitamine B342, vitamine B343, vitamine B344, vitamine B345, vitamine B346, vitamine B347, vitamine B348, vitamine B349, vitamine B350, vitamine B351, vitamine B352, vitamine B353, vitamine B354, vitamine B355, vitamine B356, vitamine B357, vitamine B358, vitamine B359, vitamine B360, vitamine B361, vitamine B362, vitamine B363, vitamine B364, vitamine B365, vitamine B366, vitamine B367, vitamine B368, vitamine B369, vitamine B370, vitamine B371, vitamine B372, vitamine B373, vitamine B374, vitamine B375, vitamine B376, vitamine B377, vitamine B378, vitamine B379, vitamine B380, vitamine B381, vitamine B382, vitamine B383, vitamine B384, vitamine B385, vitamine B386, vitamine B387, vitamine B388, vitamine B389, vitamine B390, vitamine B391, vitamine B392, vitamine B393, vitamine B394, vitamine B395, vitamine B396, vitamine B397, vitamine B398, vitamine B399, vitamine B400, vitamine B401, vitamine B402, vitamine B403, vitamine B404, vitamine B405, vitamine B406, vitamine B407, vitamine B408, vitamine B409, vitamine B410, vitamine B411, vitamine B412, vitamine B413, vitamine B414, vitamine B415, vitamine B416, vitamine B417, vitamine B418, vitamine B419, vitamine B420, vitamine B421, vitamine B422, vitamine B423, vitamine B424, vitamine B425, vitamine B426, vitamine B427, vitamine B428, vitamine B429, vitamine B430, vitamine B431, vitamine B432, vitamine B433, vitamine B434, vitamine B435, vitamine B436, vitamine B437, vitamine B438, vitamine B439, vitamine B440, vitamine B441, vitamine B442, vitamine B443, vitamine B444, vitamine B445, vitamine B446, vitamine B447, vitamine B448, vitamine B449, vitamine B450, vitamine B451, vitamine B452, vitamine B453, vitamine B454, vitamine B455, vitamine B456, vitamine B457, vitamine B458, vitamine B459, vitamine B460, vitamine B461, vitamine B462, vitamine B463, vitamine B464, vitamine B465, vitamine B466, vitamine B467, vitamine B468, vitamine B469, vitamine B470, vitamine B471, vitamine B472, vitamine B473, vitamine B474, vitamine B475, vitamine B476, vitamine B477, vitamine B478, vitamine B479, vitamine B480, vitamine B481, vitamine B482, vitamine B483, vitamine B484, vitamine B485, vitamine B486, vitamine B487, vitamine B488, vitamine B489, vitamine B490, vitamine B491, vitamine B492, vitamine B493, vitamine B494, vitamine B495, vitamine B496, vitamine B497, vitamine B498, vitamine B499, vitamine B500, vitamine B501, vitamine B502, vitamine B503, vitamine B504, vitamine B505, vitamine B506, vitamine B507, vitamine B508, vitamine B509, vitamine B510, vitamine B511, vitamine B512, vitamine B513, vitamine B514, vitamine B515, vitamine B516, vitamine B517, vitamine B518, vitamine B519, vitamine B520, vitamine B521, vitamine B522, vitamine B523, vitamine B524, vitamine B525, vitamine B526, vitamine B527, vitamine B528, vitamine B529, vitamine B530, vitamine B531, vitamine B532, vitamine B533, vitamine B534, vitamine B535, vitamine B536, vitamine B537, vitamine B538, vitamine B539, vitamine B540, vitamine B541, vitamine B542, vitamine B543, vitamine B544, vitamine B545, vitamine B546, vitamine B547, vitamine B548, vitamine B549, vitamine B550, vitamine B551, vitamine B552, vitamine B553, vitamine B554, vitamine B555, vitamine B556, vitamine B557, vitamine B558, vitamine B559, vitamine B560, vitamine B561, vitamine B562, vitamine B563, vitamine B564, vitamine B565, vitamine B566, vitamine B567, vitamine B568, vitamine B569, vitamine B570, vitamine B571, vitamine B572, vitamine B573, vitamine B574, vitamine B575, vitamine B576, vitamine B577, vitamine B578, vitamine B579, vitamine B580, vitamine B581, vitamine B582, vitamine B583, vitamine B584, vitamine B585, vitamine B586, vitamine B587, vitamine B588, vitamine B589, vitamine B590, vitamine B591, vitamine B592, vitamine B593, vitamine B594, vitamine B595, vitamine B596, vitamine B597, vitamine B598, vitamine B599, vitamine B600, vitamine B601, vitamine B602, vitamine B603, vitamine B604, vitamine B605, vitamine B606, vitamine B607, vitamine B608, vitamine B609, vitamine B610, vitamine B611, vitamine B612, vitamine B613, vitamine B614, vitamine B615, vitamine B616, vitamine B617, vitamine B618, vitamine B619, vitamine B620, vitamine B621, vitamine B622, vitamine B623, vitamine B624, vitamine B625, vitamine B626, vitamine B627, vitamine B628, vitamine B629, vitamine B630, vitamine B631, vitamine B632, vitamine B633, vitamine B634, vitamine B635, vitamine B636, vitamine B637, vitamine B638, vitamine B639, vitamine B640, vitamine B641, vitamine B642, vitamine B643, vitamine B644, vitamine B645, vitamine B646, vitamine B647, vitamine B648, vitamine B649, vitamine B650, vitamine B651, vitamine B652, vitamine B653, vitamine B654, vitamine B655, vitamine B656, vitamine B657, vitamine B658, vitamine B659, vitamine B660, vitamine B661, vitamine B662, vitamine B663, vitamine B664, vitamine B665, vitamine B666, vitamine B667, vitamine B668, vitamine B669, vitamine B670, vitamine B671, vitamine B672, vitamine B673, vitamine B674, vitamine B675, vitamine B676, vitamine B677, vitamine B678, vitamine B679, vitamine B680, vitamine B681, vitamine B682, vitamine B683, vitamine B684, vitamine B685, vitamine B686, vitamine B687, vitamine B688, vitamine B689, vitamine B690, vitamine B691, vitamine B692, vitamine B693, vitamine B694, vitamine B695, vitamine B696, vitamine B697, vitamine B698, vitamine B699, vitamine B700, vitamine B701, vitamine B702, vitamine B703, vitamine B704, vitamine B705, vitamine B706, vitamine B707, vitamine B708, vitamine B709, vitamine B710, vitamine B711, vitamine B712, vitamine B713, vitamine B714, vitamine B715, vitamine B716, vitamine B717, vitamine B718, vitamine B719, vitamine B720, vitamine B721, vitamine B722, vitamine B723, vitamine B724, vitamine B725, vitamine B726, vitamine B727, vitamine B728, vitamine B729, vitamine B730, vitamine B731, vitamine B732, vitamine B733, vitamine B734, vitamine B735, vitamine B736, vitamine B737, vitamine B738, vitamine B739, vitamine B740, vitamine B741, vitamine B742, vitamine B743, vitamine B744, vitamine B745, vitamine B746, vitamine B747, vitamine B748, vitamine B749, vitamine B750, vitamine B751, vitamine B752, vitamine B753, vitamine B754, vitamine B755, vitamine B756, vitamine B757, vitamine B758, vitamine B759, vitamine B760, vitamine B761, vitamine B762, vitamine B763, vitamine B764, vitamine B765, vitamine B766, vitamine B767, vitamine B768, vitamine B769, vitamine B770, vitamine B771, vitamine B772, vitamine B773, vitamine B774, vitamine B775, vitamine B776, vitamine B777, vitamine B778, vitamine B779, vitamine B780, vitamine B781, vitamine B782, vitamine B783, vitamine B784, vitamine B785, vitamine B786, vitamine B787, vitamine B788, vitamine B789, vitamine B790, vitamine B791, vitamine B792, vitamine B793, vitamine B794, vitamine B795, vitamine B796, vitamine B797, vitamine B798, vitamine B799, vitamine B800, vitamine B801, vitamine B802, vitamine B803, vitamine B804, vitamine B805, vitamine B806, vitamine B807, vitamine B808, vitamine B809, vitamine B810, vitamine B811, vitamine B812, vitamine B813, vitamine B814, vitamine B815, vitamine B816, vitamine B817, vitamine B818, vitamine B819, vitamine B820, vitamine B821, vitamine B822, vitamine B823, vitamine B824, vitamine B825, vitamine B826, vitamine B827, vitamine B828, vitamine B829, vitamine B830, vitamine B831, vitamine B832, vitamine B833, vitamine B834, vitamine B835, vitamine B836, vitamine B837, vitamine B838, vitamine B839, vitamine B840, vitamine B841, vitamine B842, vitamine B843, vitamine B844, vitamine B845, vitamine B846, vitamine B847, vitamine B848, vitamine B849, vitamine B850, vitamine B851, vitamine B852, vitamine B853, vitamine B854, vitamine B855, vitamine B856, vitamine B857, vitamine B858, vitamine B859, vitamine B860, vitamine B861, vitamine B862, vitamine B863, vitamine B864, vitamine B865, vitamine B866, vitamine B867, vitamine B868, vitamine B869, vitamine B870, vitamine B871, vitamine B872, vitamine B873, vitamine B874, vitamine B875, vitamine B876, vitamine B877, vitamine B878, vitamine B879, vitamine B880, vitamine B881, vitamine B882, vitamine B883, vitamine B884, vitamine B885, vitamine B886, vitamine B887, vitamine B888, vitamine B889, vitamine B890, vitamine B891, vitamine B892, vitamine B893, vitamine B894, vitamine B895, vitamine B896, vitamine B897, vitamine B898, vitamine B899, vitamine B900, vitamine B901, vitamine B902, vitamine B903, vitamine B904, vitamine B905, vitamine B906, vitamine B907, vitamine B908, vitamine B909, vitamine B910, vitamine B911, vitamine B912, vitamine B913, vitamine B914, vitamine B915, vitamine B916, vitamine B917, vitamine B918, vitamine B919, vitamine B920, vitamine B921, vitamine B922, vitamine B923, vitamine B924, vitamine B925, vitamine B926, vitamine B927, vitamine B928, vitamine B929, vitamine B930, vitamine B931, vitamine B932, vitamine B933, vitamine B934, vitamine B935, vitamine B936, vitamine B937, vitamine B938, vitamine B939, vitamine B940, vitamine B941, vitamine B942, vitamine B943, vitamine B944, vitamine B945, vitamine B946, vitamine B947, vitamine B948, vitamine B949, vitamine B950, vitamine B951, vitamine B952, vitamine B953, vitamine B954, vitamine B955, vitamine B956, vitamine B957, vitamine B958, vitamine B959, vitamine B960, vitamine B961, vitamine B962, vitamine B963, vitamine B964, vitamine B965, vitamine B966, vitamine B967, vitamine B968, vitamine B969, vitamine B970, vitamine B971, vitamine B972, vitamine B973, vitamine B974, vitamine B975, vitamine B976, vitamine B977, vitamine B978, vitamine B979, vitamine B980, vitamine B981, vitamine B982, vitamine B983, vitamine B984, vitamine B985, vitamine B986, vitamine B987, vitamine B988, vitamine B989, vitamine B990, vitamine B991, vitamine B992, vitamine B993, vitamine B994, vitamine B995, vitamine B996, vitamine B997, vitamine B998, vitamine B999, vitamine B1000, vitamine B1001, vitamine B1002, vitamine B1003, vitamine B1004, vitamine B1005, vitamine B1006, vitamine B1007, vitamine B1008, vitamine B1009, vitamine B1010, vitamine B1011, vitamine B1012, vitamine B1013, vitamine B1014, vitamine B1015, vitamine B1016, vitamine B1017, vitamine B1018, vitamine B1019, vitamine B1020, vitamine B1021, vitamine B1022, vitamine B1023, vitamine B1024, vitamine B1025, vitamine B1026, vitamine B1027, vitamine B1028, vitamine B1029, vitamine B1030, vitamine B1031, vitamine B1032, vitamine B1033, vitamine B1034, vitamine B1035, vitamine B1036, vitamine B1037, vitamine B1038, vitamine B1039, vitamine B1040, vitamine B1041, vitamine B1042, vitamine B1043, vitamine B1044, vitamine B1045, vitamine B1046, vitamine B1047, vitamine B1048, vitamine B1049, vitamine B1050, vitamine B1051, vitamine B1052, vitamine B1053, vitamine B1054, vitamine B1055, vitamine B1056, vitamine B1057, vitamine B1058, vitamine B1059, vitamine B1060, vitamine B1061, vitamine B1062, vitamine B1063, vitamine B1064, vitamine B1065, vitamine B1066, vitamine B1067, vitamine B1068, vitamine B1069, vitamine B1070, vitamine B1071, vitamine B1072, vitamine B1073, vitamine B1074, vitamine B1075, vitamine B1076, vitamine B1077, vitamine B1078, vitamine B1079, vitamine B1080, vitamine B1081, vitamine B1082, vitamine B1083, vitamine B1084, vitamine B1085, vitamine B1086, vitamine B1087, vitamine B1088, vitamine B1089, vitamine B1090, vitamine B1091, vitamine B1092, vitamine B1093, vitamine B1094, vitamine B1095, vitamine B1096, vitamine B1097, vitamine B1098, vitamine B1099, vitamine B1100, vitamine B1101, vitamine B1102, vitamine B1103, vitamine B1104, vitamine B1105, vitamine B1106, vitamine B1107, vitamine B1108, vitamine B1109, vitamine B1110, vitamine B1111, vitamine B1112, vitamine B1113, vitamine B1114, vitamine B1115, vitamine B1116, vitamine B1117, vitamine B1118, vitamine B1119, vitamine B1120, vitamine B1121, vitamine B1122, vitamine B1123, vitamine B1124, vitamine B1125, vitamine B1126, vitamine B1127, vitamine B1128, vitamine B1129, vitamine B1130, vitamine B1131, vitamine B1132, vitamine B1133, vitamine B1134, vitamine B1135, vitamine B1136, vitamine B1137, vitamine B1138, vitamine B1139, vitamine B1140, vitamine B1141, vitamine B1142, vitamine B1143, vitamine B1144, vitamine B1145, vitamine B1146, vitamine B1147, vitamine B1148, vitamine B1149, vitamine B1150, vitamine B1151, vitamine B1152, vitamine B1153, vitamine B1154, vitamine B1155, vitamine B1156, vitamine B1157, vitamine B1158, vitamine B1159, vitamine B1160, vitamine B1161, vitamine B1162, vitamine B1163, vitamine B1164, vitamine B1165, vitamine B1166, vitamine B1167, vitamine B1168, vitamine B1169, vitamine B1170, vitamine B1171, vitamine B1172, vitamine B1173, vitamine B1174, vitamine B1175, vitamine B1176, vitamine B1177, vitamine B1178, vitamine B1179, vitamine B1180, vitamine B1181, vitamine B1182, vitamine B1183, vitamine B1184, vitamine B1185, vitamine B1186, vitamine B1187, vit

Docteur MIKOÙ Abdelhaq

Diplômé de la faculté de
Médecine de Toulouse
Spécialiste en
Endocrinologie - Diabète
Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol
- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- SFD Société Francophone du Diabète
- EASD Association Européenne pour l'Etude du Diabète
- MGSD Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca, le

22.10.2023

الدكتور ميكو عبد الحق

خريج كلية الطب ببوردو

اختصاصي في

أمراض الغدد، مرض السكر

السمنة وأمراض الكوليستروول
بالموعد

Dr. M. Boubker KHAFFAF
Laboratoire d'Analyses Médicales Y.A.
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
22 26 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Cholestrol - Triglycéride
Acide urique
Transaminases
Bilirubine
TSH, T4, T3
Vit D3

Dr MIKOÙ A.
ENDOCRINOLOGIE DIABÈTE
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASA
Tél. : 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74

39، شارع رحال المسكنى - الطابق (2) - الدار البيضاء - الهاتف (عيادة): 05 22 31 16 30 - هاتف وفاكس : 05 22 31 06 74 -
39, Bd Rahal El Meskini - 2^{ème} étage - Casablanca - Tél. : 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail:famillemikou@gmail.com - INPE:091113076



مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA
BIOCHIMIE-HEMATOLOGIE-MICROBIOLOGIE-IMMUNOLOGIE-HORMONOLOGIE

Laboratoire Autorisé N°: 26050

Dr. Amal EL KHAFIF

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Patente : 31606078-IF : 53000550-CNSS : 2064872-ICE : 001540529000093

FACTURE N° : 231000081

Casablanca le 02-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija

Demande N°: 2310020108

Date de l'examen : 02-10-2023

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Clé	Clé	Total
PS	Prélèvement	E10	E	10.00 MAD
B147	Transaminases P (TGP)	B50	B	50.00 MAD
B146	Transaminases O (TGO)	B50	B	50.00 MAD
B100	Acide urique sanguin	B30	B	30.00 MAD
B103	Bilirubine (Totale Directe et Indirecte)	B70	B	70.00 MAD
B106	Cholestérol total	B30	B	30.00 MAD
B118	Glycémie	B30	B	30.00 MAD
B119	Hémoglobine glycosylée	B100	B	100.00 MAD
B216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B	80.00 MAD
B134	Triglycérides	B50	B	50.00 MAD
B164	T S H ultra sensible	B250	B	250.00 MAD
B135	Urée	B30	B	30.00 MAD
B439	Vitamine D	B450	B	450.00 MAD
B205	Clearance: de la créatinine	B50	B	50.00 MAD
BB100	Créatinine	B0	B	0.00 MAD
	Bilirubine Directe	B0	B	0.00 MAD
	Bilirubine Indirecte	B0	B	0.00 MAD
	Diurèse des 24 heures (litres)	B0	B	0.00 MAD
B170	Créatinine	B30	B	gratuit
			Total	1280.00 MAD

INPE

093003440

Total des B : 1270

Total dossier: 1280.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA

Dr EL KHAFIF Amal

Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54

Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca

775 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

تاریخ اجراء التحاليل

غير قابل للتغير

أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة: 18:30-7:30/السبت: 14:00-7:30 أخذ العينات بالموعد

Horaire continu : du lundi au vendredi : 7h30-18h30/Samedi : 7h30-14h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N°52-54 Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi -Casablanca-
Tél : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 E-mail : laboyafa@hotmail.com



مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA
BIOCHIMIE-HEMATOLOGIE-MICROBIOLOGIE-IMMUNOLOGIE-HORMONOLOGIE

Dr. Amal KHAFIF

د. نمال الخفيف زمباتي

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Patente : 31606078-IF : 53000550-CNSS : 2064872-ICE : 001540529000093

mille deux cent quatre-vingts dirhams

تاريخ إجراء التحاليل

غير قبل التغير

أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة: 07:30-18:30/السبت: 07:30-14:00 اخذ العينات بالموعد

Horaire continu : du lundi au vendredi : 7h30-18h30/Samedi : 7h30-14h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hamimadi N°52-54 Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi -Casablanca-
Tél : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 E-mail : laboyaifa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 03-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija Ep Benbkir

Code Patient 1710240114 Référence : 2310020108

Prescripteur : Dr MIKOU ABDELHAQ

Page : 1/7

HEMATOCYTOLOGIE

Hémogramme

14-09-2022

Hématies :	4.00	M/mm ³	(4.00-5.30)	4.09
Hémoglobine :	11.8	g/dL	(12.5-15.5)	12.0
Hématocrite :	34.6	%	(37.0-46.0)	36.8
-VGM :	86.5	fL	(80.0-95.0)	90.0
-TCMH :	29.5	pg	(28.0-32.0)	29.3
-CCMH :	34.1	g/dL	(30.0-35.0)	32.6
Leucocytes :	6 050	/mm ³	(4 000-10 000)	6 720
Polynucléaires Neutrophiles :	50.3	%	(40.0-75.0)	52.0
Soit:	3 043	/mm ³	(2 000-7 500)	3 494
Polynucléaires Eosinophiles :	2.6	%	(1.0-4.0)	2.4
Soit:	157	/mm ³	(100-400)	161
Polynucléaires Basophiles :	0.5	%	(0.0-1.0)	0.3
Soit:	30	/mm ³	(0-100)	20
Lymphocytes :	38.3	%	(20.0-45.0)	38.2
Soit:	2 317	/mm ³	(1 500-4 000)	2 567
Monocytes :	8.3	%	(2.0-8.0)	7.1
Soit:	502	/mm ³	(200-800)	477
Plaquettes :	332 000	/mm ³	(160 000-350 000)	343 000
(Cytométrie en flux XT2000Sysmex)				
IDP	11.1	fL	(9.0-14.0)	11.4
VPM	9.4	fL	(8.0-12.0)	9.3
P-RGC	21.7	%	(12.0-35.0)	20.7

Frottis sanguin:

Anémie

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA

Dr EL KHAIF Amal

Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54
Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Validé par : Dr Amal EL KHAIF

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE
Dr. Amal El Khafif Ramdani

د.أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste
Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 03-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija Ep Benbkir


Code Patient 1710240114 Référence : 2310020108

Prescripteur : Dr MIKOU ABDELHAQ

Page : 3/7

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Glycémie à jeun
(Hexokinase G6PD-H Cobas C311)




Urée
(Enzymatique Cobas C311)

14-09-2022
0.26 g/l
4.33 mmol/l (0.20-0.50)
(3.33-8.33) 0.22

Créatininé
(Cinétique Cobas C311)

14-09-2022
5.4 mg/L
47.8 μmol/L (5.0-11.0)
(44.3-97.4) 4.7



Acide Urique
(Cinétique Cobas C311)

14-09-2022
51.10 mg/l
304.05 μmol/L (24.00-57.00)
(142.80-339.15) 48.20

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAFFI Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
Tél. : 05 22 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Validé par : Dr Amal EL KHAFFI

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyaafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د.أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023

Édition : 03-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija Ep Benbkir

Code Patient 1710240114 Référence : 2310020108

Prescripteur : Dr MIKOU ABDELHAQ

Page : 4/7

HbA1c

(HPLC-TOSOH)


- <6:Niveau non diabétique
- <7:Équilibré
- >8:Action à entreprendre

7.7 %

(4.0-6.0)

8.7

14-09-2022



Cholestérol total

(colorimétrique Cobas C311)


2.38 g/L

6.16 mmol/L

(1.54-2.01)

2.49

14-09-2022



Triglycérides

(Enzymatique Cobas C311)

1.00 g/l

1.14 mmol/l

(<1.50)

1.70

14-09-2022

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
 Dr EL KHAFIF Amal
 Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
 Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
 Tel: 05 22 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Validé par : Dr Amal EL KHAFIF

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyaifa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د.أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023


Edition : 03-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija Ep Benbkir

Code Patient 1710240114 Référence : 2310020108

Prescripteur : Dr MIKOU ABDELHAQ

Page : 5/7



Transaminases GPT (ALAT)
(Cinétique Cobas C311)

17.9 UI/L (7.0-35.0)

14-09-2022

13.7

Transaminases GOT (ASAT)
(Cinétique Cobas C311)

19.6 UI/L (10.0-35.0)

14-09-2022

18.7

Bilirubine totale
(Diazoréaction Cobas C311)

3.26 mg/l (5.54 μmol/l) (<8.80) (<14.96)

Bilirubine conjuguée (directe)
(Diazoréaction Cobas C311)

1.25 mg/l (2.13 μmol/l) (<3.00) (<5.10)

Bilirubine libre (indirecte)

2.01 mg/L (3.42 μmol/L) (<7.00) (<11.90)

'Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA'

Dr EL KHAFFI Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
Tél. 05 22 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Validé par : Dr Amal EL KHAFFI
Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يafa للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Yafa

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د.أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 03-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija Ep Benbkir

Code Patient 1710240114 Référence : 2310020108

Prescripteur : Dr MIKOU ABDELHAQ

Page : 2/7

BIOCHIMIE URINAIRE

Diurèse des 24h
Sous réserve d'un bon recueil des urines

2.16 litres / 24h

14-09-2022

3.25

Créatinine urinaire

615.1 mg/l

(280.0-2 170.0)

14-09-2022

253.0

Créatinine urinaire de 24h
(Dosage cinétique Cobas C311)

1 329 mg / 24h
117.0 mmol/24H

(24.6-191.0)
(740-1 570)
(65.1-138.2)

822

Clairance de la créatinine mesurée
(DFG)

170.86 ml/min

(>60.00)

14-09-2022

121.66

Interprétation:
-Insuffisance rénale modérée : 30 - 60 mL/min
-Insuffisance rénale sévère : 15 - 30 mL/min
-En attente de dialyse prochaine: 10-15 mL/min
-En cours de dialyse: <10 mL/min

Laboratoire d'Analyses Médicales Yafa

Dr EL KHAIF Amal

Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54

Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca

22 75 86 77 64 05 22 76 84 39

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Validé par : Dr Amal EL KHAIF

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubarka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

د. أمال الخفيف رمضانى

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 03-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija Ep Benbkir

Code Patient 1710240114 Référence : 2310020108

Prescripteur : Dr MIKOU ABDELHAQ

Page : 7/7

VITAMINES

25-OH-Vitamine D (D2+D3)

(Roche Cobas e411)

Interprétation:

	ng/ml
Déficience :	<=20
Insuffisance :	21-29
Suffisance :	>=30

26.62 ng/ml

66.6 nmol/l

nmol/l

<=50
52.5-72.50
>=75

14-09-2022

33.92

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA

Dr EL KHAFIF Amal

Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54

Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca

22 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

د. أمال الخفيف رمضانى

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 03-10-2023

Mme MAZOUZE Khadija Ep Benbkir

Code Patient 1710240114 Référence : 2310020108

Prescripteur : Dr MIKOU ABDELHAQ

Page : 6/7

BILAN ENDOCRINIEN

Bilan thyroïdien

14-09-2022


TSH-Thyréostimuline
(ECLIA Cobas e411)

1.01 mUI/L (0.27-4.20)

1.01

Nouveau-né 0-3 jours	5.17-14.6 µIU/ml
Nouveau-né 4-30 jours	0.43-16.1 µIU/ml
Bébé 2-12 mois	0.62-8.05 µIU/ml
Enfant 2-6 ans	0.54-4.53 µIU/ml
Enfant 7-11 ans	0.66-4.14 µIU/ml
Adolescent 12-19 ans	0.53-3.59 µIU/ml
Adulte	0.27-4.2 µIU/ml

• Antériorité : TSH-Thyréostimuline (mUI/L)



Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAFFI Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39

Validé par : Dr Amal EL KHAFFI
Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com