

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0031730

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1535

Société : 180445

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Maareufi Abderrazak

Date de naissance : 01/01/1936

Adresse : Rue Mahmoud Tbour Ouedra 10

Tél. : 0524 24 11 11

Total des frais engagés : 250,00 + 580,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr EL ASRI Halima
Ophtalmologue
59, Bd. Zarakaoui Casablanca
Résidence Les Fleurs

Cachet du médecin :

Date de consultation : 06/01/2023

Nom et prénom du malade : Maareufi Abderrazak Age :

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Glaucome C. Simple

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 21/01/2023

Signature de l'adhérent(e) : 

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 06 OCT 2023 | | 2 | 250 HT | Dr El ASQ Hawa Dr. Cyprien Nkole 59. Rue de la Résidence Lycée Fidèle |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|---|----------|-----------------------|
| PHARMACIE HADJ TAZI Dr. Tazi Mouna 101 Rue Imam Kastalani Habous Casablanca Tel : 06 22 30 53 89 | 06/10/23 | 580,20 |

ANALYSES - RADIGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Cœfficients | Montant des Honoraires |
|---|------|-----------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | CŒFFICIENT DES TRAVAUX |
|--|--|------------------|-------------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ODF PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE | | | |
| | H | 25533412 | 21433552 | MONTANTS DES SOINS |
| | D | 00000000 | 00000000 | |
| | | 00000000 | 00000000 | |
| | | 35533411 | 11433553 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| [Création, remont, adjonction] | Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession | | | |
| | H | 25533412 | 21433552 | DATE DU DEVIS |
| | D | 00000000 | 00000000 | |
| | | 00000000 | 00000000 | |
| | | 35533411 | 11433553 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS | VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION | | | |

Docteur EL ASRI Halima

OPHTHALMOLOGUE

Maladies et Chirurgie des Yeux

Laser - Angiographie

ex. Chef de Service à

l'Hopital de Mohammadia

الدكتورة العسري حلية

اختصاصية في امراض وجراحة العيون

ليزر - صور الشرايين

رئيسة مصلحة سابقا

بمستشفى المحمدية

Casablanca; le : 06 OCT. 2023

97.20 x 3

YAAZOUFI Absence go.K

(5)

1) Xo.R. 500 mg (3)

agle 1a sin / en continu

95,20 x 3

en h.

2) Xo.R. 500 mg (3)

agle 1e matin 8h.

en continu.

— Control 500 mg

590, 20 A min



Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide



Tab: A A 0
Exp: 01
01
P.P.V: 95 DH 20

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bétabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître

• notice avant

ez avoir besoin de la

interrogez votre

onnellement prescrit. onnes. Il pourrait leur mes sont identiques

devient grave ou si rables non veuillez informer votre

nicament est Xola® Collyre tice, il sera appelé Xola®

Si vous oubliez d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Si vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prévue, installez-la dès que vous vous souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide



Tab: A A 0
Exp: 01
01
P.P.V: 95 DH 20

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bétabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître

• notice avant

ez avoir besoin de la

interrogez votre

onnellement prescrit. onnes. Il pourrait leur mes sont identiques

devient grave ou si rables non veuillez informer votre

nicament est Xola® Collyre tice, il sera appelé Xola®

Si vous oubliez d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Si vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prévue, installez-la dès que vous vous souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide



Tab: A A 0
Exp: 01
01
P.P.V: 95 DH 20

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bétabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître

• notice avant

ez avoir besoin de la

interrogez votre

onnellement prescrit. onnes. Il pourrait leur mes sont identiques

evient grave ou si rables non ueuillez informer votre

icament est Xola® Collyre tice, il sera appelé Xola®

Si vous oubliez d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Si vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prévue, installez-la dès que vous vous souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Xalatan™

latanoprost

50 microgrammes/ml collyre en solution



-- LAPROPHAN --

PPV: 98DH20

PAA122423

038

Veuillez lire attentivement cette notice pour vous. Même si vous avez déjà utilisé ce médicament, il pourra être nécessaire de le relire.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Il pourra leur expliquer ce que Xalatan fait et comment il pourra leur aider.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.



6 118001 120482

Utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes. Si vous avez déjà utilisé ce médicament ou un médicament similaire, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Il pourra leur expliquer ce que Xalatan fait et comment il pourra leur aider.

Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

- 1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan
- 3. Comment utiliser Xalatan
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
- 5. Comment conserver Xalatan
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé ?

Xalatan fait partie d'un groupe de médicaments connus sous le nom d'analogues de prostaglandines. Xalatan favorise l'écoulement du liquide contenu dans l'œil vers la circulation sanguine.

Il est utilisé pour traiter des maladies connues sous les noms de **glaucome à angle ouvert** et d'**hypertension oculaire**. Ces deux maladies sont associées à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et peuvent affecter votre

vue. Xalatan peut aider à réduire l'augmentation de la pression oculaire et le glaucome chez les enfants et les bébés de tous âges.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan ?

Il est important de savoir que Xalatan peut causer des effets indésirables chez les femmes adultes (y compris les personnes âgées) et chez l'enfant, de la naissance



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Xalatan™

latanoprost

50 microgrammes/ml collyre en solution



-- LAPROPHAN --

PPV: 98DH20

PAA122423

038

Veuillez lire attentivement cette notice pour vous. Même si vous avez déjà utilisé ce médicament, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez acheté ce médicament, il pourrait leur être utile.
- Si vous ressentez des effets indésirables.



6 118001 120482

Utilisez ce médicament car elle contient des informations importantes. Si vous avez déjà utilisé ce médicament ou un médicament similaire, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

Si vous avez

ce médicament, le médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien, a été prescrit à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Ils sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, au médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

- 1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan
- 3. Comment utiliser Xalatan
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
- 5. Comment conserver Xalatan
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé ?

Xalatan fait partie d'un groupe de médicaments connus sous le nom d'analogues de prostaglandines. Xalatan favorise l'écoulement du liquide contenu dans l'œil vers la circulation sanguine.

Il est utilisé pour traiter des maladies connues sous les noms de **glaucome à angle ouvert** et d'**hypertension oculaire**. Ces deux maladies sont associées à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et peuvent affecter votre

vue. Xalatan peut également réduire l'augmentation de la pression oculaire et le glaucome chez les enfants et les bébés de tous âges.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan ?

Il est important de lire cette notice et de la comprendre avant d'utiliser Xalatan. Xalatan peut être utilisé chez les femmes adultes (y compris les personnes âgées) et chez l'enfant, de la naissance



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Xalatan™

latanoprost

50 microgrammes/ml collyre en solution



-- LAPROPHAN --

PPV: 98DH20

PAA122423

038

Veuillez lire attentivement cette notice pour vous. Même si vous avez déjà utilisé ce médicament, il pourra être nécessaire de le relire.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Il pourra leur expliquer ce que Xalatan fait et comment il pourra leur aider.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.



6 118001 120482

Utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes. Si vous avez déjà utilisé ce médicament, nous vous conseillons de le relire.

Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Il pourra leur expliquer ce que Xalatan fait et comment il pourra leur aider.

Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, le médicin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

- 1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan
- 3. Comment utiliser Xalatan
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
- 5. Comment conserver Xalatan
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé ?

Xalatan fait partie d'un groupe de médicaments connus sous le nom d'analogues de prostaglandines. Xalatan favorise l'écoulement du liquide contenu dans l'œil vers la circulation sanguine.

Il est utilisé pour traiter des maladies connues sous les noms de **glaucome à angle ouvert** et d'**hypertension oculaire**. Ces deux maladies sont associées à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et peuvent affecter votre

vue. Xalatan peut aider à réduire l'augmentation de la pression oculaire et le glaucome chez les enfants et les bébés de tous âges.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan ?

Il est important de savoir que Xalatan peut causer des effets indésirables chez les femmes adultes (y compris les personnes âgées) et chez l'enfant, de la naissance