

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M23- 020284

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1214 Société : 180718
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : EL OIADI Azzou2
Date de naissance : 01.01.1950
Adresse : Derb el widad - hay hassani casa.
Tél. : 2665669112 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 11.10.2019
Nom et prénom du malade : A. Azzou2 Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : C.E. Pneumonie
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11.10.13		4	30,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL BOULBAJ Houdu Belkacem 580, Bd Ibn Sina Dens Li Vieux Hay Hassani - CASABLANCA Tel : 05 22 90 32 97	11.10.13	45,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			CCEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Hamza JABIR
Oncologue Radiothérapeute

Lauréat de la faculté de Médecine de Casablanca
Ancien Médecin de l'institut Gustave-Roussy à Paris
Diplôme de radiothérapie des cancers
ORL université Paris sud



Radiothérapie
Curiothérapie
Chimiothérapie
Soins Palliatifs

الدكتور حمزة جابر
أخصائي في تشخيص وعلاج الأورام

خريج كلية الطب بالدار البيضاء
طبيب سابق بمعهد كوستاف روسي
دبلوم العلاج بالأشعة لسرطان الأذن
والأنف والحنجرة - كلية باريس

Casablanca, le : 11 octobre 2023

LOT 211462
EXP 04/2024
PPV 52.80D

Mr. EL OIRDI AZZOUZ

27.6x8 220

1/ Dolee 100 1000 mg 4/5 par 3 mois

2/ COTIPRED 20 MG COMPRIME SECABLE EFFERVESCENT

3 cp par le matin avant petit déjeuner

3/ GAVICON 500 / 267 MG / MG SUSPENSION BUvable

1 cas x 2 par jour

4/ OEDES 20 MG GELULE

1 gel par jour le soir

5/ prospan sirop:

1 cas x 3 par jour

6/ Biofine vein

49.60 1 app x 2/3

7/ Zantrone 1000000

8/ 100 mg 1/3 par 3 mois

dr.jabir.hamza@gmail.com

05 22 86 55 68 / 06 61 80 17 08

إقامة رياض عبد المومن. 445A, رقم 14, الطابق الثالث - شارع عبد المومن - الدار البيضاء
Résidence Ryad Abdelmoumen, 445A, N°14, 3ème étage - Bd. Abdelmoumen - Casablanca

PHARMACIE AL BOUSTANE
Houaida BELHCHELINE
580 Bd Ibn
Hay Hassani - CASABLANCA
Tél : 05 22 86 55 68

PROSPAN Sirop 100 ml

PPV : 30.00 DH



Fabriqué par : **\$MB**

SMB TECHNOLOGY S.A.

39 rue du Parc Industriel,

B-6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE, Belgique.

6 118001 320103



Remboursable

1

2

3

غافيسكون مزيج معلق للشرب في قارور
150 ملل
التركيبية:
الجبنيت الصوديوم 10 غ
بيكربونات البوتاسيوم 2 غ
السواغات: كافك.ل جرعة واحدة من 00

قلقة السواغات ذات
التأثير الملحوظ
بار هيدروكسيبترولات
المكثف و البرويل.
دواعي الإستعمال:
يوفر غافيسكون
ألفاس تعاطية سريعة
تتوم طويلا. ضد حرقة
المعدة و عسر الهضم.
طريقة الاستعمال:
عن طريق الفم.

Soulever ici.
Ne pas enlever.

e 150ml

خالى من السكر

DISPONIBLE EN PHARMACIE
UNIQUEMENT

غافيسكون ادفانس

GAVISCON

ADVANCE

GOÛT ANIS

SOULAGEMENT RAPIDE ET PUISSANT

• حرقة المعدة واضر الهضم
• Brûlures d'estomac & indigestion
• تركيبة بقوة اضافية
• Formule extra puissante
• Effet Longue Durée
• تتوم طويلا

نكهة اليانسون

بحرك جيداً قبل الشرب.

لا تتركوه في متناول الأطفال.

يتم التخزين في درجة حرارة تقل عن 30 مئوية.

لا يجب الحفظ على القارورة لمدة تزيد عن 6 أشهر بعد الفتح.

Bien agiter avant usage. Ne pas réfrigérer.

Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant titulaire de licence au Royaume Uni:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Hull, HU8 7DS.

Gaviscon Advance, l'épée et le cercle sont des marques de commerce.

Utiliser dans les 6 mois après ouverture.

AMM N° 08R1/2020 DMP/21/NRQd

PPV: 48 DH 40

BN ADW870
DOM 07/2022
EXP 07/2024

3122756

DICLO PHARMA 5® (DICLOFENAC SODIQUE)

COMPOSITION

Spécialités	Diclo pharma 5® 75 mg injectables	Diclo p 50 mg c gastro-
Composants		
Diclofenac sodique	75 mg	50 mg
Excipients	q.s	

A14721



INDICATIONS

Maladies rhumatismales à localisation articulaire.
Rhumatismes à localisation articulaire.

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être administré aux patients souffrant de pathologies gastro-intestinales, de grossesse, d'allaitement ou en cours de traitement par anticoagulants.

Comme d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut éviter l'administration d'autres médicaments synthétiques, ont prés.

De plus, il est contre-indiqué chez les enfants de moins de 15 ans.

EFFETS INDESIRABLES

Surtout au début du traitement, on peut observer des effets indésirables : diarrhées, flatulences. Si des troubles plus graves surviennent, consulter un médecin.

Rarement, on aura des manifestations cutanées et/ou réactions anaphylactiques. Quelquefois, on a enregistré des effets indésirables : asthénie, éblouissements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent survenir : une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hépatite (anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme. Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de phénomènes collatéraux locaux et transitoires (brûlures, ténésme).

POSOLOGIE

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour. Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner).

Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de 50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer aux comprimés ou aux suppositoires.

PRESENTATIONS

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.

Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.

Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Liste II

A19452
FXT 12

LABORATOIRES
PHARMA 5
مختبرات فارما 5

Laboratoires PHARMA 5 - Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

DICLO PHARMA 5® (DICLOFENAC SODIQUE)

COMPOSITION

Spécialités	Diclo pharma 5® 75 mg injectables	Diclo p 50 mg c gastro-
Composants		
Diclofenac sodique	75 mg	50 mg
Excipients	q.s	

INDICATIONS

Maladies rhumatismales à localisation
rhumatismales à localisation

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être administré
entériques, de grossesse, ou en cours de traitement

Comme d'autres anti-inflammatoires
qui, après administration d'un

synthétase, ont prés
De plus, il est contre-indiqué

Enfant de moins de 15 ans
EFFETS INDESIRABLES

Surtout au début du traitement
diarrhées, flatulences.

Si des troubles plus graves
un médecin.

Rarement, on aura des manifestations
et/ou réactions anaphylactiques.

Quelquefois, on a enregistré des
asthénie, éblouissements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent
une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hémo-

anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme.
Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de
phénomènes collatéraux locaux et transitoires (brûlures, ténésme).

POSOLOGIE

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour.
Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une
réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner)

Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de
50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer
aux comprimés ou aux suppositoires.

PRESENTATIONS

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.

Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.

Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

LISTE II

A19452
FXT 12

LABORATOIRES
PHARMA 5
مختبرات

Laboratoires PHARMA 5 - Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

6 118000 090274
Diclo Pharma 5® 100mg
Boite de 10 suppositoires

10
+ ST
les gastro-
moposée
z les sujets
ystagline
ite aiguë.
Diclofenac,
les comprimés
s que nausées,
faudra consulter
es asthmatiques
tabilité, insomnie,
nes périphériques,
énie, thrombopénie,
ne, thrombopénie,

27,50

DICLO PHARMA 5® (DICLOFENAC SODIQUE)

COMPOSITION

Spécialités	Diclo pharma 5® 75 mg injectables	Diclo p 50 mg c gastro-
Composants		
Diclofenac sodique	75 mg	50 mg
Excipients	q.s	

INDICATIONS

Maladies rhumatismales à localisation
rhumatismales à localisation

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être administré
entériques, de grossesse, ou en cours de traitement

Comme d'autres anti-inflammatoires
qui, après administration d'un

synthétase, ont prés
De plus, il est contre-indiqué

Enfant de moins de 15 ans
EFFETS INDESIRABLES

Surtout au début du traitement
diarrhées, flatulences.

Si des troubles plus graves
un médecin.

Rarement, on aura des manifestations
et/ou réactions anaphylactiques.

Quelquefois, on a enregistré des
asthénie, éblouissements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent
une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hémo-

anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme.
Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de
phénomènes collatéraux locaux et transitoires (brûlures, ténésme).

POSOLOGIE

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour.
Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une
réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner)

Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de
50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer
aux comprimés ou aux suppositoires.

PRESENTATIONS

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.

Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.

Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

LISTE II

A19452
FXT 12

LABORATOIRES
PHARMA 5
مختبرات

Laboratoires PHARMA 5 - Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

6 118000 090274
Diclo Pharma 5® 100mg
Boite de 10 suppositoires

10
+ ST
les sujets
stagline
ite aiguë.
Diclofenac,
les comprimés
s que nausées,
faudra consulter
es asthmatiques
tabilité, insomnie,
nes périphériques,
énie, thrombopénie,
ne, thrombopénie,

27,50

DICLO PHARMA 5® (DICLOFENAC SODIQUE)

COMPOSITION

Spécialités	Diclo pharma 5® 75 mg injectables	Diclo p 50 mg c gastro-
Composants		
Diclofenac sodique	75 mg	50 mg
Excipients	q.s	

INDICATIONS

Maladies rhumatismales à localisation
rhumatismales à localisation

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être administré
entériques, de grossesse, ou en cours de traitement

Comme d'autres anti-inflammatoires
qui, après administration d'un

synthétase, ont prés
De plus, il est contre-indiqué

Enfant de moins de 15 ans
EFFETS INDESIRABLES

Surtout au début du traitement
diarrhées, flatulences.

Si des troubles plus graves
un médecin.

Rarement, on aura des manifestations
et/ou réactions anaphylactiques.

Quelquefois, on a enregistré des
asthénie, éblouissements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent
une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hémo-

anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme.
Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de
phénomènes collatéraux locaux et transitoires (brûlures, ténésme).

POSOLOGIE

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour.
Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une
réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner)

Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de
50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer
aux comprimés ou aux suppositoires.

PRESENTATIONS

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.

Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.

Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

LISTE II

A19452
FXT 12

LABORATOIRES
PHARMA 5
مختبرات

Laboratoires PHARMA 5 - Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

6 118000 090274
Diclo Pharma 5® 100mg
Boite de 10 suppositoires

10
+ ST
les gastro-
moposée
z les sujets
ystagline
ite aiguë.
Diclofenac,
les comprimés
s que nausées,
faudra consulter
es asthmatiques
tabilité, insomnie,
nes périphériques,
énie, thrombopénie,
ne, thrombopénie,

27,50

Laboratoires PH

DICLO PHARMA 5® (DICLOFENAC SODIQUE)

COMPOSITION

Spécialités	Diclo pharma 5® 75 mg injectables	Diclo p 50 mg c gastro-
Composants		
Diclofenac sodique	75 mg	50 mg
Excipients	q.s	

INDICATIONS

Maladies rhumatismales à localisation
rhumatismales à localisation

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être administré
entériques, de grossesse, ou en cours de traitement

Comme d'autres anti-inflammatoires
qui, après administration d'un

synthétase, ont prés
De plus, il est contre-indiqué

Enfant de moins de 15 ans
EFFETS INDESIRABLES

Surtout au début du traitement
diarrhées, flatulences.

Si des troubles plus graves
un médecin.

Rarement, on aura des manifestations
et/ou réactions anaphylactiques.

Quelquefois, on a enregistré des
asthénie, éblouissements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent
une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hémo-

anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme.
Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de
phénomènes collatéraux locaux et transitoires (brûlures, ténésme).

POSOLOGIE

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour.
Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une
réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner)

Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de
50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer
aux comprimés ou aux suppositoires.

PRESENTATIONS

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.

Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.

Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

LISTE II

A19452
FXT 12

LABORATOIRES
PHARMA 5
مختبرات

Laboratoires PHARMA 5 - Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

6 118000 090274
Diclo Pharma 5® 100mg
Boite de 10 suppositoires

10
+ ST
les sujets
stagline
ite aiguë.
Diclofenac,
les comprimés
s que nausées,
faudra consulter
es asthmatiques
tabilité, insomnie,
nes périphériques,
énie, thrombopénie,
ne érythème exsudatif multiforme.

27,50

DICLO PHARMA 5® (DICLOFENAC SODIQUE)

COMPOSITION

Spécialités	Diclo pharma 5® 75 mg injectables	Diclo p 50 mg c gastro-
Composants		
Diclofenac sodique	75 mg	50 mg
Excipients	q.s	

INDICATIONS

Maladies rhumatismales à localisation
rhumatismales à localisation

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être administré
entériques, de grossesse, ou en cours de traitement

Comme d'autres anti-inflammatoires
qui, après administration d'un

synthétase, ont prés
De plus, il est contre-indiqué

Enfant de moins de 15 ans
EFFETS INDESIRABLES

Surtout au début du traitement
diarrhées, flatulences.

Si des troubles plus graves
un médecin.

Rarement, on aura des manifestations
et/ou réactions anaphylactiques.

Quelquefois, on a enregistré des
asthénie, éblouissements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent
une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hémo-

anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme.
Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de
phénomènes collatéraux locaux et transitoires (brûlures, ténésme).

POSOLOGIE

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour.
Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une
réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner)

Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de
50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer
aux comprimés ou aux suppositoires.

PRESENTATIONS

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.

Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.

Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

LISTE II

A19452
FXT 12

LABORATOIRES
PHARMA 5
مختبرات

Laboratoires PHARMA 5 - Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

6 118000 090274
Diclo Pharma 5® 100mg
Boîte de 10 suppositoires

10
+ ST
les sujets
stagiaire
ite aiguë.
Diclofenac,
les comprimés
s que nausées,
faudra consulter
es asthmatiques
tabilité, insomnie,
nes périphériques,
énie, thrombopénie,
ne érythème exsudatif multiforme.

27,50

DICLO PHARMA 5® (DICLOFENAC SODIQUE)

COMPOSITION

Spécialités	Diclo pharma 5® 75 mg injectables	Diclo p 50 mg c gastro-
Composants		
Diclofenac sodique	75 mg	50 mg
Excipients	q.s	

INDICATIONS

Maladies rhumatismales à localisation
rhumatismales à localisation

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être administré
entériques, de grossesse, ou en cours de traitement

Comme d'autres anti-inflammatoires
qui, après administration d'un

synthétase, ont prés
De plus, il est contre-indiqué

Enfant de moins de 15 ans
EFFETS INDESIRABLES

Surtout au début du traitement
diarrhées, flatulences.

Si des troubles plus graves
un médecin.

Rarement, on aura des manifestations
et/ou réactions anaphylactiques.

Quelquefois, on a enregistré des
asthénie, éblouissements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent
une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hémo

anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme.
Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de

POSOLOGIE

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour.
Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une

réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner)
Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de
50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer
aux comprimés ou aux suppositoires.

PRESENTATIONS

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.
Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.
Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

LISTE II

A19452
FXT 12

LABORATOIRES
PHARMA 5
مختبرات

Laboratoires PHARMA 5 - Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

6 118000 090274
Diclo Pharma 5® 100mg
Boîte de 10 suppositoires



Cotipred® 20 mg

Prednisolone

COMPOSITION :

Prednisolone (Sous forme métasulfobenzoate sodique)

Excipient q.s.p.

Excipients à effet notoire : lactose, sorbitol (contenu dans

PRESENTATION :

Boîte de 20 comprimés solubles effervescents avec b

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies où il est utilisé p

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- la plupart des infections, - certaines maladies virales en évolution (hépatites, s, herpès, varicelle, zona), - certains troubles mentaux non traités, - vaccination par des vaccins vivants, - allergie à l'un des constituants.

Ce médicament **NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE**, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions)

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladie du côlon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment antécédents de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison de maladies parasitaires.

PENDANT LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel. Tenir compte de la teneur en sodium (51 mg par comprimé).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN et notamment des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque : astémizole, bépridil, erythromycine en injection intra-veineuse, halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sultopride, vincamine.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

GROSSESSE : Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

ALLAITEMENT : L'allaitement est à éviter pendant le traitement en raison du passage dans le lait maternel.

Posologie, mode d'emploi,
contre indications, excipients à effet
notoire : voir notice

PPV : 40DH00

PER : 02/26

LOT : M383

boru s.a.
82, Allée des Casanovas - An Sebba - Casablanca
Tél : 021 22 22 22 - Pharmacie Responsable

20 mg
imprimé.