

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23- 0024791

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

181905

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1502

Société : RAM,

Actif

Pensionné(e)

Autre : deceale

Nom & Prénom : HABID El Ferhat

Date de naissance : 01.11.53

Adresse : Lot Y Seadq II sidi Jaâfar Casablanca

Tél. : 0661 137251

Total des frais engagés : 17.82,00 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



27/11/12 3

Nom et prénom du malade : HABID Rachida Age:

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Nature de la maladie : Arthrose

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 27/11/12 3

Signature de l'adhérent(e) :

El Ferhat



## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/10/23	5		300 DH	<p><b>Dr Said RAMY</b>  <b>RHUMATOLOGUE</b>          89, Rue Omar Sloui, Casablanca          Tel: 0522 26 68 78          INPE: 091118794</p>

Cachet du pharmacien  
ou du pharmaciste

## **EXÉCUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du pharmacien ou du pharmacie	Date	Montant de la Facture
Pharmacie AL AADIL - DOURBA en Pharmacie Marissa N°43 Sous le Gouvernement ABLA, Qalat	29/10/2023	14.82,00

*Photo U*  
Al Ad  
anate  
ré: n.

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et Signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	O
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram shows a circular arrangement of 24 numbered circles (1-8) around a central circle. The numbers are arranged in four concentric layers: outermost layer (1), second layer (2), third layer (3), and innermost layer (4). Arrows indicate a clockwise direction for the outer layers and a counter-clockwise direction for the inner layers.

(Création, remont, adionction)

Fonctionnel. Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVISÉ

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**DOCTEUR SAÏD RAMY**

**Spécialiste**

Diplômé de la faculté de Médecine de Clermont Ferrand (France)

Ancien interne et assistant des Hôpitaux de France

Enseignant à la haute Ecole de Kinésithérapie (H.E.K)

**Rhumatalogue**

Maladie des Os, Articulations, Muscles et  
Colonnes vertébrales  
Radiologie Osseuse



**الدكتور سعيد الرامي**

(اختصاصي)

خريج كلية الطب بلندن بشهادة فخرية فرنسا

طبيب معتمد سابقاً بمستشفيات فرنسا

أستاذ بالجامعة الفرنسية

للتدريس الطبي

**لأمراض الروماتيزم**

المهام الفحصي، المضلل

المعودة الفقري ، للجلد

للعنصر بالأشعة

Casablanca, le 27/10/2013

1<sup>er</sup> HABID

RAESİDA

- Daflam 500 mg  
12x50x04

S.V.

S.V.

up nat et m

2 nis

- Lasilin 600 mg  
2x60x02

up le nat

- Flenton 1 g  
95,02x02

S.V.

S.V.

egel 1 g

20x5

1 83-X04

= 1482,00

Dr Said RAMY  
RHEUMATOLOGUE  
39, Rue Omar Slaoui, Casablanca  
TEL: 0522 26 68 78  
INPE: 091118794

زنقة عمر السلاوي الطابق الثاني رقم 6 المركب التجاري - برباط الدار البيضاء - المغرب - تلفون: 0522 26 68 78

39, Rue Omar Slaoui 2 ème étage N°6 Centre Commercial Taofik - Casablanca - Tél/Fax : 05 22 26 68 78

E-mail : saidram@hotmail.fr

Pharmacie AL ADARISSI  
Dr en Pharmacie  
AL ADARISSA N°49 Lotissement  
Boulevard Oued Had  
Casablanca 201080

# daflon® 500 mg

comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES/BIOFLAVONOÏDES-code ATC : C05CA53: système cardiovasculaire

Ce médicament est un vasoconstricteur (il augmente le tonus des veines) et un vaso-protector (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatience du prima-débutus) et dans le traitement des symptômes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIME PELLICULE ?

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### Avertissements et précautions

#### Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

#### Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

• Évitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

• La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 500 mg, comprimé pelliculé.

### Enfants

Sans objet.

## AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

## DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS

Sans objet

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de DAFLON pendant la grossesse.

### Allaitemt

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet

## DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé contient

Sans objet

## 3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Insuffisance veineuse : La dose recommandée est de 2 comprimés par jour : soit 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

Crise hémorroïdaire : la dose recommandée est de 6 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 4 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Consultez immédiatement un professionnel de santé.

Les données concernant les effets indésirables peuvent varier.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

La fréquence des effets indésirables utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte p. ex. 9/10 personnes)
- fréquent (affecte 1 à 11 %)
- peu fréquent (affecte 1 %)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs)
- très rare (affecte moins de 1 %)
- fréquence inconnue (le fréquence)

Ils peuvent inclure :

• Fréquent : diarrhée, dyspepsie

• Peu fréquent : colite.

• Rare : sensations vertigineuses.

• Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### CE QUE CONTIENT DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

\* Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée ..... 500,000 mg

Correspondant à :

Diosmine 90 pour cent ..... 450,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hespéridine 10 pour cent ..... 50,000 mg

Humidité moyenne ..... 20,000 mg

Pour un comprimé pelliculé :

\* Les autres composants sont :

Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc.

Pelliculage : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromélose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

## QUEST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés pelliculés.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019



SERVIER MAROC

Imm. ZEVACO, Lot FATH 4

Bd Abdellah Boutaleb

20180 Casablanca

## Conseil d'éducation sanitaire :

### Troubles de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo ...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisent la circulation sanguine.

### Hémorroïdes

Boire 1,5 à 2 L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (Fruits, légumes verts, céréales complètes).

Evitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épiciés.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

# daflon® 500 mg

comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES/BIOFLAVONOÏDES-code ATC : C05CA53: système cardiovasculaire

Ce médicament est un vasoconstricteur (il augmente le tonus des veines) et un vaso-protector (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatience du prima-débutus) et dans le traitement des symptômes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIME PELLICULE ?

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### Avertissements et précautions

#### Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

#### Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

• Évitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

• La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 500 mg, comprimé pelliculé.

### Enfants

Sans objet.

## AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

## DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS

Sans objet

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de DAFLON pendant la grossesse.

### Allaitemt

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet

## DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé contient

Sans objet

## 3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Insuffisance veineuse : La dose recommandée est de 2 comprimés par jour : soit 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

Crise hémorroïdaire : la dose recommandée est de 6 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 4 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Consultez immédiatement un professionnel de santé.

Les données concernant les effets indésirables peuvent varier.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

La fréquence des effets indésirables utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte p. ex. 9/10 personnes)
- fréquent (affecte 1 à 11 %)
- peu fréquent (affecte 1 %)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs)
- très rare (affecte moins de 1 %)
- fréquence inconnue (le fréquence)

Ils peuvent inclure :

• Fréquent : diarrhée, dyspepsie

• Peu fréquent : colite.

• Rare : sensations vertigineuses.

• Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### CE QUE CONTIENT DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

\* Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée ..... 500,000 mg

Correspondant à :

Diosmine 90 pour cent ..... 450,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hespéridine 10 pour cent ..... 50,000 mg

Humidité moyenne ..... 20,000 mg

Pour un comprimé pelliculé :

\* Les autres composants sont :

Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc.

Pelliculage : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromollose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

## QUEST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés pelliculés.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019



SERVIER MAROC

Imm. ZEVACO, Lot FATH 4

Bd Abdellah Boutaleb

20180 Casablanca

## Conseil d'éducation sanitaire :

Troubles de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo ...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisent la circulation sanguine.

## Hémorroïdes

Boire 1,5 à 2 L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (Fruits, légumes verts, céréales complètes)

Evitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épiciés.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

# daflon® 500 mg

comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES/BIOFLAVONOÏDES-code ATC : C05CA53: système cardiovasculaire

Ce médicament est un vasoconstricteur (il augmente le tonus des veines) et un vaso-protector (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatience du prima-débutus) et dans le traitement des symptômes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIME PELLICULE ?

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, Avertissements et précautions

### Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

### Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

• Évitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

• La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 500 mg, comprimé pelliculé.

### Enfants

Sans objet.

## AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

## DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS

Sans objet

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de DAFLON pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet

## DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé contient

Sans objet

## 3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Insuffisance veineuse : La dose recommandée est de 2 comprimés par jour : soit 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

Crise hémorroïdaire : la dose recommandée est de 6 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 4 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Consultez immédiatement un professionnel de santé.

Les données concernant les effets secondaires peuvent varier.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

La fréquence des effets indésirables utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte p. ex. 9/10 personnes)
- fréquent (affecte 1 à 11/100 personnes)
- peu fréquent (affecte 1/100 à 1/10 000 personnes)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs)
- très rare (affecte moins de 1/10 000 utilisateurs)
- fréquence inconnue (le rapport n'a pas été fait)

Ils peuvent inclure :

- Fréquent : diarrhée, dyspepsie, nausées, vomissements.
- Peu fréquent : colite.
- Rare : sensations vertigineuses, étourdissements.
- Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### CE QUE CONTIENT DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

\* Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée ..... 500,000 mg

Correspondant à :

Diosmine 90 pour cent ..... 450,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hespéridine 10 pour cent ..... 50,000 mg

Humidité moyenne ..... 20,000 mg

Pour un comprimé pelliculé :

\* Les autres composants sont :

Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc.

Pelliculage : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromélose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

## QUEST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés pelliculés.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019



SERVIER MAROC

Imm. ZEVACO, Lot FATH 4

Bd Abdellah Boutaleb

20180 Casablanca

### Conseil d'éducation sanitaire :

Troubles de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo ...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisent la circulation sanguine.

### Hémorroïdes

Boire 1,5 à 2 L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (Fruits, légumes verts, céréales complètes)

Évitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épiciés.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

# daflon® 500 mg

comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS

### QUELLES CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES/BIOFLAVONOÏDES-code ATC : C05CA53: système cardiovasculaire

Ce médicament est un vasoconstricteur (il augmente le tonus des veines) et un vaso-protector (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatience du prima-débutus) et dans le traitement des symptômes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE

### PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIME PELLICULE ?

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### Avertissements et précautions

#### Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

#### Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

• Évitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

• La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 500 mg, comprimé pelliculé.

### Enfants

Sans objet.

## AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

## DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET

### BOISSONS

Sans objet.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de DAFLON pendant la grossesse.

### Allaitemt

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet

## DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé contient

Sans objet

## 3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Insuffisance veineuse : La dose recommandée est de 2 comprimés par jour : soit 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

Crise hémorroïdaire : la dose recommandée est de 6 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 4 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Consultez immédiatement un professionnel de santé.

Les données concernant les effets indésirables peuvent varier.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 500 mg, sans que cela vous ait causé de symptômes, n'aurez dû

Sans objet

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

La fréquence des effets indésirables utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte p. ex. 9/10 personnes)
- fréquent (affecte 1 à 11/10 personnes)
- peu fréquent (affecte 1/10 à 1/100 personnes)
- rare (affecte 1/100 à 1/1000 personnes)
- très rare (affecte moins de 1/1000 personnes)
- fréquence inconnue (le rapport n'a pas été fait)

Ils peuvent inclure :

• Fréquent : diarrhée, dyspepsie

• Peu fréquent : colite.

• Rare : sensations vertigineuses.

• Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### CE QUE CONTIENT DAFLON 500 MG, COMPRIME PELLICULE ?

\* Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée ..... 500,000 mg

Correspondant à :

Diosmine 90 pour cent ..... 450,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hespéridine 10 pour cent ..... 50,000 mg

Humidité moyenne ..... 20,000 mg

Pour un comprimé pelliculé :

\* Les autres composants sont :

Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc.

Pelliculage : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromélose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

## QUEST-CE QUE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés pelliculés.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019



SERVIER MAROC

Imm. ZEVACO, Lot FATH 4

Bd Abdellah Boutaleb

20180 Casablanca

### Conseil d'éducation sanitaire :

Troubles de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo ...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisent la circulation sanguine.

### Hémorroïdes

Boire 1,5 à 2 L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (Fruits, légumes verts, céréales complètes)

Evitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épiciés.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

# Lasilix® 40 mg 20 mg/2 ml

mide

entièrement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Avant d'utiliser ce médicament, veuillez lire attentivement les informations importantes sur votre traitement.  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien ou à votre médecin.

Si vous avez été prescrit ce médicament par un autre professionnel de la santé, il est recommandé que vous le preniez toujours comme il a été prescrit. N'arrêtez pas de prendre ce médicament sans consulter votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des symptômes identiques à ceux décrits dans cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

SANOI

O



is risque chez

LASILIX 40 MG  
20CP SEC  
P.P.V : 34DH60  
L01 : 28/04  
PER.01/2027  
6 1180000060468

0 mg comprimés :  
amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

20 mg/2 ml :  
chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

## Présentations

40 mg : comprimés sécables doses à 40 mg ; boîte de 20.

20 mg/2 ml : solution injectable,  
de 2 ml ; boîte de 1.

## EL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Le médicament est indiqué dans le traitement des symptômes d'origine cardiaque ou rénale, et dans les cas d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium, tel que la furosemide.

Il est indiqué dans les cas suivants :

cas cardiaques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque, hypertension sévère (élévation importante de la tension artérielle), insuffisance cardiaque, rénale, cirrhotique (rétenzione de se), insuffisance rénale du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX, et utilisé en réanimation pédiatrique.

CON !

Les cas ne pas utiliser ce médicament  
lorsqu'il existe une sensibilité connue au médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

SCAS.

Le cas d'alteration de la fonction rénale est de 1 à 2 mg/kg de joules par jour par voie

# Lasilix® 40 mg 20 mg/2 ml

mide



entièrement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Avant d'utiliser ce médicament, veuillez lire attentivement les informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre pharmacien.

Si vous avez été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Si cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

## INDICATION DU MÉDICAMENT

Indication :  
0 mg comprimés :

amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

10 mg/2 ml :

chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Présentations :

0 mg : comprimés sécables doses à 40 mg ; boîte de 20.

0 mg/2 ml : solution injectable,

de 2 ml ; boîte de 1.

## EL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Indication :  
Le médicament est indiqué dans le traitement des symptômes d'origine cardiaque ou rénale, et dans les symptômes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium, tel que la furosemide.

Indication :  
Le médicament est indiquée dans les cas suivants :

cas cardioliques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque, hypertension sévère (élévation importante de la tension artérielle), insuffisance cardiaque, rénale, cirrhotique (rétenzione de se), insuffisance du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX, et utilisé en réanimation pédiatrique.

CONTRAINDITIONS !

Les cas ne pas utiliser ce médicament  
lament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :



possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

**IPP®**  
Omeprazole 20 mg  
Boîte de 28 gélules

**PPV : 95,00 DH**

6 118000 191049

**E PP A13 V FA 01**

**Lot N° : / Date Pér. :**

**Boîte de 28 gélules microgranulées gastro-résistantes**

**Dr Maria MAFTOUH**  
Pharmacien Responsable

augmentation de diarrhées infectieuses. Si vous avez des problèmes hépatiques IPP favorise le développement bactérien intragastrique par diminution de l'acidité du suc gastrique. La prise d'un inhibiteur de la pompe qui IPP à 20 mg en particulier sur une supérieure à un an, peut également réduire le risque de fracture de la hanche, des vertébrées. Prévenez votre médecin ou soigneur d'ostéoporose. Où si vous corticoïdes (qui peuvent augmenter d'ostéoporose). Procédures d'emploi :  
- Sujet âgé : aucun ajustement nécessaire.  
- Insuffisance rénale ou hépatique : de la posologie n'est pas nécessaire.  
- En cas d'ulcère gastrique il est recommandé de vérifier la benignité de la lésion avant de prendre l'inhibiteur de la pompe. En cas de doute demander l'avis de votre pharmacien.

**Suivi régulier, ne pas le porter de sacs.**  
- Interactions avec d'autres médicaments : Contre-indiquées : les précautions d'emploi doivent informer votre médecin ou pharmacien. Lorsqu'un des médicaments suivants : ratiopharm, atazanavir, taclizopid, millepertuis, warfarine, clostazol.

Nécessaires : les interactions avec les aliments. Les gelées peuvent entraîner interactions avec les prothèses dentaires.

Interactions avec les médicaments : IPP peut augmenter la grossesse au cours de la grossesse. L'omniprime est excrété dans le lait maternel mais n'a probablement pas d'effets sur l'enfant si il est utilisé à doses thérapeutiques sans effet secondaire.

Effets sur l'aptitude à conduire des machines : IPP 20 mg n'est pas susceptible d'effets sur l'aptitude à conduire des machines, secondaires qu'il étudiera visuels, vous ne devez pas utiliser des machines.

Ce médicament contient des substances présentant une importante syndrome de malabsorption ou un syndrome de galactose-oxalate, et peut provoquer des troubles digestifs. Ce médicament contient du sucre et peut provoquer des réactions allergiques.

**Comment prendre IPP ?**  
- Utiliser la pompe à prototines. Respecter strictement la posologie prescrite par le médecin. IPP 20 mg est administré par voie orale, pendant 4 à 8 semaines.

- Il est recommandé de prendre IPP 20 mg soit 1 gélule / jour pendant 4 semaines à la même heure, tous les jours, avec demi-verre d'eau. Les gélules n'ont pas de croques.

**Comment prendre IPP ?**  
- Utiliser la pompe à prototines. Respecter strictement la posologie prescrite par le médecin. IPP 20 mg est administré par voie orale, pendant 4 à 6 semaines.

- Césophagites et reflux : IPP 20 mg soit 1 gélule / jour pendant 4 semaines à la même heure, tous les jours, avec demi-verre d'eau. Les gélules n'ont pas de croques.

**Adultes :**  
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux.  
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques et duodénaux.  
- En association avec des antibiotiques appropriés pour éradication de Helicobacter pylori dans la maladie ulcéruseuse gastroduodenale.  
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.  
- Traitement de l'oesophagite par reflux.

**Enfants :**  
- Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien symptomatique.  
- Traitement des ulcères gastriques, traitement de la maladie du syndrome de Zollinger-Ellison.

**Population pédiatrique :**  
**Enfants à partir d'un an et > 10 kg :**  
- Traitement de l'oesophagite par reflux.

**Enfants de moins de 1 an et adolescents :**  
- Traitement symptomatique connue à l'Omepzazole ou à l'un des comprimés.

**Hypersensibilité à un autre inhibiteur de la pompe à prototines.**  
Co-administration avec neflavir (utilisé pour traiter infection par le VIH).  
**Précautions :**  
- IPP 20 mg peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent il faut informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :  
- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.  
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.  
- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.  
- Vous souffrez de diarrhée persistante, car l'Omepzazole a été associé à une faiblesse dans les selles noires (teneur de sang).

Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre IPP 20 mg. La

**IPP®**  
20 mg Gélules

Omeprazole 20 mg

Boîte de 7,14,28 et 56 gélules

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez jamais à quelqu'un else, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui faire du mal. Identifiez-vous à la pharmacie, parlez-en à un autre pharmacien dans cette officine, parlez-en à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est ce que l'IPP® et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'IPP® ?
- Comment prendre l'IPP® ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver l'IPP® ?
- Informations supplémentaires

1. Qu'est ce que l'IPP® et dans quel cas est-il utilisé ?  
L'IPP® est un inhibiteur sélectif de la pompe à proton (H+K+-ATPase) de la cellule pariétale gastrique. Il diminue la sécrétion d'acide dans le stomac, quelque soit la nature de la stimulation.

**Adultes :**  
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux.  
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques et duodénaux.  
- En association avec des antibiotiques appropriés pour éradication de Helicobacter pylori dans la maladie ulcéruseuse gastroduodenale.  
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.  
- Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien symptomatique de 4 ans et adolescents.

**Population pédiatrique :**  
**Enfants à partir d'un an et > 10 kg :**  
- Traitement symptomatique de l'oesophagite par reflux.

**Enfants < 1 an et adolescents :**  
- Hypersensibilité connue à l'Omepzazole ou à l'autre inhibiteur de la pompe à prototines.

**Co-administration avec neflavir (utilisé pour traiter infection par le VIH).**  
**Précautions :**  
- IPP 20 mg peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent il faut informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :  
- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.  
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

**Si vous avez des selles noires (teneur de sang), car l'Omepzazole a été associé à une faiblesse dans les selles noires (teneur de sang).**

Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre l'IPP 20 mg. La

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

**IPP®**  
Omeprazole 20 mg  
Boîte de 28 gélules

plus de 10 kg peuvent prendre l'IPP 20 mg. La

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

**IPP®**  
Omeprazole 20 mg  
Boîte de 28 gélules microgranulées gastro-résistantes

plus de 10 kg peuvent prendre l'IPP 20 mg. La

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

**IPP®**  
Omeprazole 20 mg  
Boîte de 28 gélules microgranulées gastro-résistantes

plus de 10 kg peuvent prendre l'IPP 20 mg. La

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

**IPP®**  
Omeprazole 20 mg  
Boîte de 28 gélules

plus de 10 kg peuvent prendre l'IPP 20 mg. La

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

**IPP®**  
Omeprazole 20 mg  
Boîte de 28 gélules microgranulées gastro-résistantes

plus de 10 kg peuvent prendre l'IPP 20 mg. La

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

**IPP®**  
Omeprazole 20 mg  
Boîte de 28 gélules microgranulées gastro-résistantes

plus de 10 kg peuvent prendre l'IPP 20 mg. La

possologie dépendra du poids du patient et de la posologie décidera de la dose à administrer et prévention des ulcères.

le  
Tot:  
DLC:

F293H  
10/2025

P.P.C : 183,00 DH

Par cette action :  
Collagène® de I à :


- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA 1

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans le cartilage, mais aussi

LA 1

La silice joue un rôle à la fois dans la réparation et le renouvellement du cartilage. Dans le cartilage nous trouvons en particulier, les chondroblastes et les chondrocytes.



Flex-Tonic est une synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.

# Flex-Tonic

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, où éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

## DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

## COLLAGÈNE DE TYPE II

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif. Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

## CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA  
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE  
9, rue Rahal Meekni - FES

le  
Tot:  
DLC:

F293H  
10/2025

P.P.C : 183,00 DH

Par cette action :  
Collagène® de I à :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA 1

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans le cartilage, mais aussi

LA 1

La silice joue un rôle à la fois dans le tissu le plus réparateur et dans le cartilage nous trouvons en particulier, les chondroblastes et les chondrocytes.

#### CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, où éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

#### DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

#### COLLAGÈNE DE TYPE II


Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif. Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

#### CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA  
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE  
9, rue Rahai Meskini - FES



le  
Tot:  
DLC:

F293H  
10/2025

P.P.C : 183,00 DH

Par cette action :  
Collagène® de I à :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA 1

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans le cartilage, mais aussi

LA 1

La silice joue un rôle à la fois dans le tissu le plus réparateur et dans le cartilage nous trouvons en particulier, les chondroblastes et les chondrocytes.

#### CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, où éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

#### DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

#### COLLAGÈNE DE TYPE II


Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif. Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

#### CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA  
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE  
9, rue Rahai Meskini - FES



le  
Tot:  
DLC:

F293H  
10/2025

P.P.C : 183,00 DH

Par cette action :  
Collagène® de I à :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans le cartilage, mais aussi

LA

La silice joue un rôle à la fois dans le tissu le plus réparateur et dans le cartilage nous trouvons en particulier, les chondroblastes et les chondrocytes.

#### **CONSEILS D'UTILISATION :**

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, où éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

#### **DUREE RECOMMANDÉE :**

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

#### **COLLAGÈNE DE TYPE II**

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif. Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

#### **CAS PARTICULIERS :**

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA  
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE  
9, rue Rahai Meskini - FES