

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M23-0022119

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4961 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : Belem Kadem Mohamed
 Date de naissance :
 Adresse :
 Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. EL YOUNSI MUSTAP
 Hepato Gastro Entéro
 203, Boulevard Zerktouni
 Tél: 0522 36 01 80/77
 Fax: 0522 36 01 74
 Gsm: 0662 77 74 1*

Date de consultation : 25/10/2019

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : De l'insuline

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances: De l'insuline

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/10/23	C	2	Carte	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

05/10/23 419,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient



COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE


H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION



[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CABINET HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

DOCTEUR MUSTAPHA EL YOUNSI

Diplômé de la faculté de médecine de Paris
Diplômé universitaire des hépatites virales
Ancien attaché des hôpitaux de pitié-salpêtrière beaujon, Bichat - Paris
Membre de la société française de gastro-entérologie
Fibroscopie • Coloscopie • Protocologie • Ph-métrie oesophagienne
Echographie • CPRE + Sphinctérotomie

Melle BELEMKADEM Khawla

Casablanca le, 05/10/2023



29,00
Zyrdol 500

1 comprimé, matin et soir (pendant 05 jour)



65,00
ultralevure gellule

1 comprimé, matin et soir (pendant 02 mois)

PHARMACIE CHAOU
AHMIDA Mohamed
497, Bd. El Fida - Casablanca
Tél : 05 22 28 08 21
INPE : 092018357 - ICE : 001448390000087

T = 419.60

Dr. EL YOUNSI MUSTAP
Hepato Gastro Entero
203, Boulevard Zerk
Tél: 0522 36 01 80
Fax: 0522 36 01 7
Gsm: 0623 77 74 4

1

mol par dose.

ULTRA-LEVURE® 250mg

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745

Gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745 lyophilisé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

- Si vous êtes allergique à *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous êtes allergique aux autres levures,
- Si vous êtes porteur d'un cathéter veineux central,
- Patients immunodéfectifs ou hospitalisés (en raison d'un état grave).

Faites attention avec ULTRA-LEVURE 250mg gélules ou poudre

- Puisqu'une diarrhée peut causer une perte importante d'eau et d'électrolytes,
- Si vous mélangez ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable à un liquide susceptible d'être porté à une température de plus de 50°C,
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la notice de ces médicaments.

En cas de :

- Température supérieure à 38°C,
- Douleurs fortes au niveau du ventre,
- Présence de sang dans les selles,
- Vomissements associés à la diarrhée,
- Persistance de la diarrhée au-delà de trois jours.

• *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 pourrait donner des résultats faussés.

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est contre-indiquée en cas de déficience immunitaire (par ex. infections par le VIH, transplantation d'organes, leucémies, tumeurs avancées, radiothérapie, chimiothérapie, traitement de longue durée et hautement dosé par cortisone).
- Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus vous concerne.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

La prise de médicaments contre les infections dues à des champignons annule l'effet d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme enceinte pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme allaitante pendant l'allaitement.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de diminution de la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines.

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Les doses habituelles sont les suivantes :

Adulte : 2-4 gélules ou 2-4 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Enfant : 2 gélules ou 2 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Gélules : avaler les gélules avec un peu d'eau.

Sachets-doses : diluer la poudre dans un verre d'eau.

Durée de traitement

Adulte : prévention des récurrences ou rechute de diarrhée à *Clostridium difficile*.

Enfant : Traitement de la diarrhée en complément à la réhydratation orale. N'arrêtez pas prématurément votre traitement car votre diarrhée pourrait persister.

Si vous avez pris plus d'ULTRA-LEVURE gélules ou poudre

Si vous avez utilisé ou pris trop d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison et de toxicologie de votre région. Cependant, ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de surdosage.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 250mg gélules

Dans ce cas, vous pouvez prendre la dose oubliée à la prise suivante. Ne prenez pas de double dose.

Lot :
مجموعة

Fab :
صنع

EXP :
صلاح لغاية

1176

BIOCODEX

12 2022

MAROC PPV 65.10 DH

12 2025

ULTRA-LEVURE 250 mg,
20 gélules



choc anaphylactique.

• **thoraciques et médiastinales**

Très rares (< 1/10.000) : dyspnée (respiration difficile).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares (< 1/10.000) : prurit (démangeaisons), exanthème (éruption cutanée), urticaire (démangeaisons à respirer). Dans ce cas arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Affections gastro-intestinales

Très rares (< 1/10.000) : constipation, épigastralgies (douleurs abdominales), météorisme abdominal ont été observés lors d'études cliniques.

ULTRA-LEVURE[®] 250mg

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745

Gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745 lyophilisé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

- Si vous êtes allergique à *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous êtes allergique aux autres levures,
- Si vous êtes porteur d'un cathéter veineux central,
- Patients immunodéfectifs ou hospitalisés (en raison d'un état grave).

Faites attention avec ULTRA-LEVURE 250mg gélules ou poudre

- Puisqu'une diarrhée peut causer une perte importante d'eau et d'électrolytes,
- Si vous mélangez ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable à un liquide susceptible d'être porté à une température de plus de 50°C,
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la notice de ces médicaments.

En cas de :

- Température supérieure à 38°C,
- Douleurs fortes au niveau du ventre,
- Présence de sang dans les selles,
- Vomissements associés à la diarrhée,
- Persistance de la diarrhée au-delà de trois jours.

• *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 pourrait donner des résultats faussés.

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est contre-indiquée en cas de déficience immunitaire (par ex. infections par le VIH, transplantation d'organes, leucémies, tumeurs avancées, radiothérapie, traitement de longue durée et hautement dosé par cortisone).
- Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus vous concerne.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

La prise de médicaments contre les infections dues à des champignons annule l'effet d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme enceinte pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme allaitante pendant l'allaitement.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de dépendance ou d'abus, ni d'interférence avec l'utilisation de machines.

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Les doses habituelles sont les suivantes :

Adulte : 2-4 gélules ou 2-4 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Enfant : 2 gélules ou 2 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Gélules : avaler les gélules avec un peu d'eau.

Sachets-doses : diluer la poudre dans un verre d'eau.

Durée de traitement

Adulte : prévention des récurrences ou rechute de diarrhée à *Clostridium difficile*.

Enfant : Traitement de la diarrhée en complément à la réhydratation orale. N'arrêtez pas prématurément votre traitement car votre diarrhée pourrait persister.

Si vous avez pris plus d'ULTRA-LEVURE gélules ou poudre

Si vous avez utilisé ou pris trop d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison et de toxicologie de votre région. Cependant, ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de dépendance ou d'abus, ni d'interférence avec l'utilisation de machines.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 250mg gélules

Dans ce cas, vous pouvez prendre la dose oubliée à la prise suivante. Ne prenez pas de double dose.

Lot :

مجموعة

Fab :

صنع

EXP :

صلاح لغاية

1176

BIOCODEX

12 2022

MAROC PPV 65.10 DH

12 2025

ULTRA-LEVURE 250 mg,
20 gélules



choc anaphylactique.

• **thoraciques et médiastinales**

Très rares (< 1/10.000) : dyspnée (respiration difficile).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares (< 1/10.000) : prurit (démangeaisons), exanthème (éruption cutanée), urticaire (démangeaisons à respirer). Dans ce cas arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Affections gastro-intestinales

Très rares (< 1/10.000) : constipation, épigastralgies (douleurs abdominales), météorisme abdominal ont été observés lors d'études cliniques.

ULTRA-LEVURE[®] 250mg

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745

Gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745 lyophilisé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

- Si vous êtes allergique à *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous êtes allergique aux autres levures,
- Si vous êtes porteur d'un cathéter veineux central,
- Patients immunodéfectifs ou hospitalisés (en raison d'un état grave).

Faites attention avec ULTRA-LEVURE 250mg gélules ou poudre

- Puisqu'une diarrhée peut causer une perte importante d'eau et d'électrolytes,
- Si vous mélangez ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ou susceptible d'être porté à une température de plus de 50°C,
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la notice de ces médicaments.

En cas de :

- Température supérieure à 38°C,
- Douleurs fortes au niveau du ventre,
- Présence de sang dans les selles,
- Vomissements associés à la diarrhée,
- Persistance de la diarrhée au-delà de trois jours.

• *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 pourrait donner des résultats faussés.

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est contre-indiqué en cas de déficience immunitaire (par ex. infections par le VIH, transplantation d'organes, leucémies, tumeurs avancées, radiothérapie, traitement de longue durée et hautement dosé par cortisone).
- Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus vous concerne.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

La prise de médicaments contre les infections dues à des champignons annule l'effet d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme enceinte pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme allaitante pendant l'allaitement.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de dépendance ou d'abus, ni d'interférence avec l'utilisation de machines.

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Les doses habituelles sont les suivantes :

Adulte : 2-4 gélules ou 2-4 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Enfant : 2 gélules ou 2 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Gélules : avaler les gélules avec un peu d'eau.

Sachets-doses : diluer la poudre dans un verre d'eau.

Durée de traitement

Adulte : prévention des récurrences ou rechute de diarrhée à *Clostridium difficile*.

Enfant : Traitement de la diarrhée en complément à la réhydratation orale. N'arrêtez pas prématurément votre traitement car votre diarrhée pourrait persister.

Si vous avez pris plus d'ULTRA-LEVURE gélules ou poudre

Si vous avez utilisé ou pris trop d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison et de toxicologie de votre région. Cependant, ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de dépendance ou d'abus, ni d'interférence avec l'utilisation de machines.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 250mg gélules

Dans ce cas, vous pouvez prendre la dose oubliée à la prise suivante. Ne prenez pas de double dose.

Lot :

مجموعة

Fab :

صنع

EXP :

صلاح لغاية

1176

BIOCODEX

12 2022

MAROC PPV 65.10 DH

12 2025

ULTRA-LEVURE 250 mg,
20 gélules



choc anaphylactique.

• **thoraciques et médiastinales**

Très rares (< 1/10.000) : dyspnée (respiration difficile).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares (< 1/10.000) : prurit (démangeaisons), exanthème (éruption cutanée), urticaire (boutons rouges), œdème (gonflement), larynx avec difficultés importantes à respirer). Dans ce cas arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Affections gastro-intestinales

Très rares (< 1/10.000) : constipation, épigastralgies (douleurs abdominales), météorisme abdominal ont été observés lors d'études cliniques.

ULTRA-LEVURE® 250mg

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745

Gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745 lyophilisé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

- Si vous êtes allergique à *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous êtes allergique aux autres levures,
- Si vous êtes porteur d'un cathéter veineux central,
- Patients immunodéfectifs ou hospitalisés (en raison d'un état grave).

Faites attention avec ULTRA-LEVURE 250mg gélules ou poudre

- Puisqu'une diarrhée peut causer une perte importante d'eau et d'électrolytes,
- Si vous mélangez ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable à un liquide susceptible d'être porté à une température de plus de 50°C,
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la notice de ces médicaments.

En cas de :

- Température supérieure à 38°C,
- Douleurs fortes au niveau du ventre,
- Présence de sang dans les selles,
- Vomissements associés à la diarrhée,
- Persistance de la diarrhée au-delà de trois jours.

• *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 pourrait donner des résultats faussés.

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est contre-indiquée chez les personnes souffrant d'une déficience immunitaire (par ex. infections par le VIH, transplantation d'organes, leucémies, tumeurs avancées, radiothérapie, traitement de longue durée et hautement dosé par cortisone).
- Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus vous concerne.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

La prise de médicaments contre les infections dues à des champignons annule l'effet d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme enceinte pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme allaitante pendant l'allaitement.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de diminution de la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines.

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Les doses habituelles sont les suivantes :

Adulte : 2-4 gélules ou 2-4 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Enfant : 2 gélules ou 2 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Gélules : avaler les gélules avec un peu d'eau.

Sachets-doses : diluer la poudre dans un verre d'eau.

Durée de traitement

Adulte : prévention des récurrences ou rechute de diarrhée à *Clostridium difficile*.

Enfant : Traitement de la diarrhée en complément à la réhydratation orale. N'arrêtez pas prématurément votre traitement car votre diarrhée pourrait persister.

Si vous avez pris plus d'ULTRA-LEVURE gélules ou poudre

Si vous avez utilisé ou pris trop d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison et de toxicologie de votre région. Cependant, ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de surdosage.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 250mg gélules

Dans ce cas, vous pouvez prendre la dose oubliée à la prise suivante. Ne prenez pas de double dose.

Lot :
مجموعة

Fab :
صنع

EXP :
صلاح لغاية

1176

BIOCODEX

12 2022

MAROC PPV 65.10 DH

12 2025

ULTRA-LEVURE 250 mg,
20 gélules



choc anaphylactique.

• **thoraciques et médiastinales**

Très rares (< 1/10.000) : dyspnée (respiration difficile).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares (< 1/10.000) : prurit (démangeaisons), exanthème (éruption cutanée), œdème (gonflement), urticaire (boutons rouges), larynx avec difficultés importantes à respirer). Dans ce cas arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Affections gastro-intestinales

Très rares (< 1/10.000) : constipation, épigastralgies (douleurs abdominales), météorisme abdominal ont été observés lors d'études cliniques.

ULTRA-LEVURE[®] 250mg

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745

Gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745 lyophilisé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

- Si vous êtes allergique à *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous êtes allergique aux autres levures,
- Si vous êtes porteur d'un cathéter veineux central,
- Patients immunodéfectifs ou hospitalisés (en raison d'un état avancé).

Faites attention avec ULTRA-LEVURE 250mg gélules ou poudre

- Puisqu'une diarrhée peut causer une perte importante d'eau et d'électrolytes,
- Si vous mélangez ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable à un liquide susceptible d'être porté à une température de plus de 50°C,
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la notice de ces médicaments.

En cas de :

- Température supérieure à 38°C,
- Douleurs fortes au niveau du ventre,
- Présence de sang dans les selles,
- Vomissements associés à la diarrhée,
- Persistance de la diarrhée au-delà de trois jours.

• *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 pourrait donner des résultats faussés.

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est contre-indiquée en cas de déficience immunitaire (par ex. infections par le VIH, transplantation d'organes, leucémies, tumeurs avancées, radiothérapie, chimiothérapie, traitement de longue durée et hautement dosé par cortisone).
- Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus vous concerne.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

La prise de médicaments contre les infections dues à des champignons annule l'effet d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme enceinte pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme allaitante pendant l'allaitement.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable n'affecte pas la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Les doses habituelles sont les suivantes :

Adulte : 2-4 gélules ou 2-4 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Enfant : 2 gélules ou 2 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Gélules : avaler les gélules avec un peu d'eau.

Sachets-doses : diluer la poudre dans un verre d'eau.

Durée de traitement

Adulte : prévention des récurrences ou rechute de diarrhée à *Clostridium difficile*.

Enfant : Traitement de la diarrhée en complément à la réhydratation orale. N'arrêtez pas prématurément votre traitement car votre diarrhée pourrait persister.

Si vous avez pris plus d'ULTRA-LEVURE gélules ou poudre

Si vous avez utilisé ou pris trop d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison et de toxicologie de votre région. Cependant, ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable n'est pas toxique.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 250mg gélules

Dans ce cas, vous pouvez prendre la dose oubliée à la prise suivante. Ne prenez pas de double dose.

Lot :
مجموعة

Fab :
صنع

EXP :
صلاح لغاية

1176

BIOCODEX

12 2022

MAROC PPV 65.10 DH

12 2025

ULTRA-LEVURE 250 mg,
20 gélules



choc anaphylactique.

• **thoraciques et médiastinales**

Très rares (< 1/10.000) : dyspnée (respiration difficile).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares (< 1/10.000) : prurit (démangeaisons), exanthème (éruption cutanée), urticaire (démangeaisons à respirer). Dans ce cas arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Affections gastro-intestinales

Très rares (< 1/10.000) : constipation, épigastralgies (douleurs abdominales), météorisme abdominal ont été observés lors d'études cliniques.

ULTRA-LEVURE[®] 250mg

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745

Gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745 lyophilisé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

- Si vous êtes allergique à *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous êtes allergique aux autres levures,
- Si vous êtes porteur d'un cathéter veineux central,
- Patients immunodéfectifs ou hospitalisés (en raison d'un état grave).

Faites attention avec ULTRA-LEVURE 250mg gélules ou poudre

- Puisqu'une diarrhée peut causer une perte importante d'eau et d'électrolytes,
- Si vous mélangez ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable à un liquide susceptible d'être porté à une température de plus de 50°C,
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la notice de ces médicaments.

En cas de :

- Température supérieure à 38°C,
- Douleurs fortes au niveau du ventre,
- Présence de sang dans les selles,
- Vomissements associés à la diarrhée,
- Persistance de la diarrhée au-delà de trois jours.

• *Saccharomyces boulardii* CNCM 1-745 pourrait donner des résultats faussés.

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est contre-indiquée en cas de déficience immunitaire (par ex. infections par le VIH, transplantation d'organes, leucémies, tumeurs avancées, radiothérapie, chimiothérapie, traitement de longue durée et hautement dosé par cortisone).
- Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus vous concerne.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

La prise de médicaments contre les infections dues à des champignons annule l'effet d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme enceinte pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement

L'effet de ce médicament n'étant pas étudié chez la femme allaitante pendant l'allaitement.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de diminution de la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines.

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

ULTRA-LEVURE 250 mg poudre pour suspension buvable

En cas d'usage fréquent ou prolongé (à partir de 2 semaines),

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) êtes diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose, décomposez le fructose, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Les doses habituelles sont les suivantes :

Adulte : 2-4 gélules ou 2-4 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Enfant : 2 gélules ou 2 sachets-doses par jour, en 2 prises.

Gélules : avaler les gélules avec un peu d'eau.

Sachets-doses : diluer la poudre dans un verre d'eau.

Durée de traitement

Adulte : prévention des récurrences ou rechute de diarrhée à *Clostridium difficile*.

Enfant : Traitement de la diarrhée en complément à la réhydratation orale. N'arrêtez pas prématurément votre traitement car votre diarrhée pourrait persister.

Si vous avez pris plus d'ULTRA-LEVURE gélules ou poudre

Si vous avez utilisé ou pris trop d'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison et de toxicologie de votre région. Cependant, ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ne présente pas de risque de surdosage.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 250mg gélules

Dans ce cas, vous pouvez prendre la dose oubliée à la prise suivante. Ne prenez pas de double dose.

Lot :
مجموعة

Fab :
صنع

EXP :
صلاح لغاية

1176

BIOCODEX

12 2022

MAROC PPV 65.10 DH

12 2025

ULTRA-LEVURE 250 mg,
20 gélules



choc anaphylactique.

• **thoraciques et médiastinales**

Très rares (< 1/10.000) : dyspnée (respiration difficile).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares (< 1/10.000) : prurit (démangeaisons), exanthème (éruption cutanée), urticaire (démangeaisons à respirer). Dans ce cas arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Affections gastro-intestinales

Très rares (< 1/10.000) : constipation, épigastralgies (douleurs abdominales), météorisme abdominal ont été observés lors d'études cliniques.