

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES RÉMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0008809

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

*18/11/2023*

Matricule : <b>560</b>	Société : <b>R.A.M</b>	
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :
Nom & Prénom : <b>ABAKIL HAFID</b>		
Date de naissance : <b>1 - 07 - 1943</b>		
Adresse : <b>LOT. BNI - YAKHLEF N° 49</b>		
<b>Rue ALGHOFRAINE MOHAMMEDIA</b>		
Tél. : <b>Idem</b>	Total des frais engagés : <b>877,90</b>	Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : **16 / 10 / 2023**  
Nom et prénom du malade : **Bouzid Fatima** Age : **1952**

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : **H.I.A - Diabète - Gonite -**

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Mohammedia** Le : **30 / 10 / 2023**

Signature de l'adhérent(e) :



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16.10.23	Ce	1	150	Dr. Farid ZKHARI 5. Av de la Marche Verte Rikhlif - Mohammedia 5 23 33 54 44

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/10/23	37,30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
<i>Medical Diagnostic Center Nohammedia</i> RDC 60F CE Bellahchif Centre Nohammedia Tél: 05 23 33 78 38 Fax: 05 23 33 78 22	16/06/13	b. 2200	320.00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **[Création, remont, adjonction]**

The diagram illustrates a dental arch with numbered teeth (1 through 8) on both the upper and lower arches. A coordinate system is overlaid, with the vertical axis labeled 'H' at the top and the horizontal axis labeled 'D' on the left and 'G' on the right. The teeth are arranged in a symmetrical pattern, with numbers indicating their position relative to the midline and the arch.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Farid ZEGHARI

Médecine Générale  
Echographie

Maphar  
Bd Alkima N° 6, QI.  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Tenoretic 50mg/12,5mg  
CP pelli b30

P.P.V : 65,40 DH  
5 118001 182350

الدكتور فريد الزغاري

الطب العام  
فحص بالأمواج

Ben Yakhlef, le

15.10.23

بني يخلف، في

9 Rue Bouzid

Fatma

3x65,000

TENORETIC 50/12,5 (N=5)

3x31,25 1g le matin x

240 mg x 200

1x / i x 03 mls

Ex do 18/08  
GlucoPHAGE

16,20 0 - 1 - 0

Voltaren 8

4071 90

— 1 - 0 - 1 a la veille

Dr. Farid ZEGHARI  
5. AV. de la Marche Verte  
Ben Yakhlef - Mohammedia  
Tel. : 05 23 33 54 44

5, Avenue de la marche verte (ex RT 101)

Ben Yakhlef - Mohammedia

Tél. : 05 23 33 54 44

5, شارع المسيرة الخضراء (سابقاً طريق 101)

بني يخلف - المحمدية

05 23 33 54 44

**GLUCOPHAGE® 500 mg, comprimé pelliculé – Boîte de 50.**  
**GLUCOPHAGE® 850 mg, comprimé pelliculé – Boîtes de 30 et de 60.**  
**GLUCOPHAGE® 1000 mg, comprimé pelliculé – Boîte de 30.**  
**(Metformine)**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

**1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A10BA02

GLUCOPHAGE® contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. GLUCOPHAGE® aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de GLUCOPHAGE® à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. GLUCOPHAGE® est associé à une stabilité pondérale et à une moindre perte de poids.

GLUCOPHAGE® est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes peuvent prendre GLUCOPHAGE® seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avaler ou de l'inhalation).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre GLUCOPHAGE® seul ou avec l'insuline.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?**

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6
- si vous avez des problèmes hépatiques
- si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale

• si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hypoglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risques d'acidose lactique – ci-dessous») ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhibante

• si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée prolongée ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)

• si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de déshydratation qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)

• si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine avec des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport d'oxygène au cœur qui peut entraîner une mort subite (mort cardiaque). Ceci peut entraîner un manque d'apport d'oxygène au cœur qui peut entraîner une mort subite (mort cardiaque).

• si vous consommez beaucoup d'alcool

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

**Veuillez à demander conseil à votre médecin si :**

• vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait produire de contrasté à base d'iode dans votre circulation sanguine

• vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre GLUCOPHAGE® un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

**Avertissements et précautions**

**Risque d'acidose lactique**

GLUCOPHAGE® peut provoquer un effet indésirable rare mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir « Informations complémentaires ci-dessous»), de problèmes au foie et toutes autres affections médicamenteuses lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aigües sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre GLUCOPHAGE® pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (peu importante de liquides corporels) tels des vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre GLUCOPHAGE® et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique car cette affection peut entraîner un coma. Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital.

Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre GLUCOPHAGE® au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par GLUCOPHAGE®.

GLUCOPHAGE® à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez GLUCOPHAGE® en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les métilglidazines), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par GLUCOPHAGE®, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et si votre fonction rénale s'est déteriorée.

**Enfants et adolescents**

Sans objet

**Autres médicaments et GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé**

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre GLUCOPHAGE® avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par GLUCOPHAGE®.

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de GLUCOPHAGE®. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques)
- des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, comme l'ibuprofène et le célecoxib)

• certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et le « angiotensin II »)

• les 2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la

modifie la quantité de GLUCOPHAGE® dans le sang, en particulier si le réduit (comme le verapamil, la nifédipine, la cimétidine, le niféthoprine, le vandetanib, l'isavuconazole, le crizotinib et l'olaparib) pour traiter le diabète

• illicite avec de l'alcool

ssive d'alcool pendant la prise de GLUCOPHAGE®, car cela peut causer (voir la rubrique « Avertissements et précautions »).

et le ralentissement

é enceinte ou planifiez une grossesse, parlez-en à votre médecin au sujet de votre traitement ou le suivi de votre glycémie.

hande si vous allezez votre enfant ou si vous avez l'intention de le

**Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines**

GLUCOPHAGE® à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Ceci signifie qu'il n'aura pas d'effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, faites particulièrement attention si vous prenez GLUCOPHAGE® avec d'autres médicaments contre le diabète qui peuvent, eux, provoquer une hypoglycémie (comme les sulfamides

20,80

**GLUCOPHAGE® 500 mg, comprimé pelliculé – Boîte de 50.**  
**GLUCOPHAGE® 850 mg, comprimé pelliculé – Boîtes de 30 et de 60.**  
**GLUCOPHAGE® 1000 mg, comprimé pelliculé – Boîte de 30.**  
**(Metformine)**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

**1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A10BA02

GLUCOPHAGE® contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard.

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. GLUCOPHAGE® aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de GLUCOPHAGE® à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. GLUCOPHAGE® est associé à une stabilité pondérale et à une moindre perte de poids.

GLUCOPHAGE® est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients adultes pourront prendre GLUCOPHAGE® seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avaler ou de l'inhalation).

Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre GLUCOPHAGE® seul ou avec l'insuline.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé ?**

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6

- si vous avez des problèmes hépatiques

- si vous souffrez d'une détérioration sévère de la fonction rénale

- si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hypoglycémie sévère (taux élevé de glucose dans le sang), des nausées, des vomissements, une diarrhée, une perte de poids rapide, une acidose lactique (voir « Risques d'acidose lactique - ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang ce qui peut conduire à un pré-coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une somnolence ou si votre haleine présente une odeur fruitée inhibante

- si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée prolongée ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)

- si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de déshydratation qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)

- si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine avec des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport d'oxygène et peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »)

- si vous consommez beaucoup d'alcool

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

**Veuillez à demander conseil à votre médecin si :**

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait produire de contrasté à base d'iode dans votre circulation sanguine

- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devrez peut-être prendre GLUCOPHAGE® un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

**Avertissements et précautions**

**Risque d'acidose lactique**

GLUCOPHAGE® peut provoquer un effet indésirable rare mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir « Informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicamenteuses lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aigües sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre GLUCOPHAGE® pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (peu importante de liquides corporels) tels des vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre GLUCOPHAGE® et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital.

Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre GLUCOPHAGE® au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre votre traitement par GLUCOPHAGE®.

GLUCOPHAGE® à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez GLUCOPHAGE® en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les métilglidazines), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par GLUCOPHAGE®, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et si votre fonction rénale s'est déteriorée.

**Enfants et adolescents**

Sans objet

**Autres médicaments et GLUCOPHAGE®, comprimé pelliculé**

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre GLUCOPHAGE® avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par GLUCOPHAGE®.

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de GLUCOPHAGE®. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques)
- des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le célocoxib)
- certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et le « angiotensine II »)
- les 2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la

modifie la quantité de GLUCOPHAGE® dans le sang, en particulier si le réduit (comme le verapamil, la nifamipicline, la cimétidine, le niféthoprine, le vandetanib, l'isavuconazole, le crizotinib et l'olaparib) pour traiter le diabète

• illicite avec de l'alcool

ssive d'alcool pendant la prise de GLUCOPHAGE®, car cela peut causer (voir la rubrique « Avertissements et précautions »).

et le ralentissement

é enceinte ou planifiez une grossesse, parlez-en à votre médecin au sujet de votre traitement ou le suivi de votre glycémie.

hande si vous allezez votre enfant ou si vous avez l'intention de le

**Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines**

GLUCOPHAGE® à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Ceci signifie qu'il n'aura pas d'effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, faites particulièrement attention si vous prenez GLUCOPHAGE® avec d'autres médicaments contre le diabète qui peuvent, eux, provoquer une hypoglycémie (comme les sulfamides

20,80







Docteur Farid ZEGHARI

Médecine Générale  
Echographie

الدكتور فريد الزغاري

الطب العام  
فحص بالأمواج

Ben Yakhlef, le 16.10.23بني يخلف، في

Qw Bouzi ▷  
Fatma

Glycémie à jeun -

HbA1c

La. unique  
Gynéco + Plu -

LABORATOIRE d'Analyses  
Médicales LOUZIA  
RDC 60F CE Ben Yakhlef  
Centre Mohammed VI  
Tél: 05 23 33 78 78  
Fax: 05 23 33 77 22

Dr. Farid ZEGHARI  
5. AV de la Marche Verte  
Ben Yakhlef - Mohammedia  
Tel.: 05 23 33 54 44

5, Avenue de la marche verte (ex RT 101)

Ben Yakhlef - Mohammedia

Tél. : 05 23 33 54 44

5. شارع المسيرة الخضراء (سابقا طريق 101)

بني يخلف - المحمدية

الهاتف : 05 23 33 54 44

# CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

## Facture

N° facture 23-4755

Mohammedia, le 16/10/2023

Date de prélèvement 16/10/2023

Mme BOUZID Fatma

Code Acte	Designation Acte	Cotation
GLY	GLYCEMIE	30
HBA1C	Hémoglobine glyquée	90
AU	Acide Urique	30
GS1	GROUPAGE SANGUIN (1ère Détermination)	80

Total B	230
Total en dirhams	320,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois cent-vingt dirhams\*\*\*

€ fu: 65977059  
€ Cr: 0026376 8600 0076

LABORATOIRE d'Analyses  
Médicales LOUIZIA  
RDC 60F CE Ben Yakhlef  
Centre Mohammedia  
Tél: 05 23 33 78 78  
Fax: 05 23 33 77 22

LABORATOIRE d'Analyses  
Médicales LOUIZIA  
RDC 60F CE Ben Yakhlef  
Centre Mohammedia  
Tél: 05 23 33 78 78  
Fax: 05 23 33 77 22

INPE 093063717

# CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résidente au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologiste au CHU Ibn Rochd Casablanca

Du Management de Qualité de l'université de Bordeaux (France)



# مختبر الويزية لتحاليل الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب والصيدلة بالرباط

مقدمة سابقًا بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

احيائية سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو (فرنسا)

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLECULAIRE

## Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 16/10/2023



Mme BOUZID Fatma

Prélèvement du: 16/10/2023 7:58

Page : 1 / 3

## BIOCHIMIE

### GLYCEMIE

1,50 g/L  
8,25 mmol/L

-Taux normal : de 0.60 à 1.10 g/L

-Diminution de la tolérance au glucose : de 1.10 à 1.26 g/L

-Sujet diabétique: > à 1.26g/L (sur deux prélèvements distincts)



Bilan validé Biologiquement Le 16/10/2023

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1

Beni Yakhlef - Mohammedia

Email : labolouizia@gmail.com

Tél : 05 23 33 78 78

Fax : 0523337722

Urgence : 06 51 98 18 63

I.F : 45977059

ICE : 002637614000076

INPE : 093063717

# CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résidente au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologiste au CHU Ibn Rochd Casablanca

Du Management de Qualité de l'université de Bordeaux (France)



# مختبر الويزية للتحاليل الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب والصيدلة بالرباط

مقدمة سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

احيائية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

حاصلة على دبلوم تطوير الجودة من جامعة بوردو (فرنسا)

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

## Compte rendu d'analyses

Mme BOUZID Fatma

Mohamedia le : 16/10/2023

Prélèvement du: 16/10/2023 7:58

Mme BOUZID Fatma

Page : 2 / 3

## BIOCHIMIE


Hémoglobine glyquée

(Technique : HPLC D10 -Biorad )

6,80 %

interprétation des résultats selon la standardisation du NGSP

- HbA1c entre 4 et 6 % : intervalle non diabétique normale.
- HbA1c inférieur à 6.5 % : excellent équilibre glycémique (DNID)
- HbA1c inférieur à 7 % : excellent équilibre glycémique (DID).
- HbA1c supérieur à 7 % : action corrective suggérée.



LABORATOIRE d'Analyses  
LOUIZIA  
Dr. HIND EL BAYED SAKALLI  
Spécialiste en Biologie Médicale  
Bilan validé Biologiquement Le 16/10/2023

Biologie de qualité à proximité

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23 33 78 78 / Fax. 05 23 33 77 22

Tel. 05 23

# CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résidente au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologiste au CHU Ibn Rochd Casablanca

Du Management de Qualité de l'université de Bordeaux (France)



مختبر الويزية  
للتحاليل الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب والصيدلة بالرباط

مقدمة ساقبا بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

احيالية سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو (فرنسا)

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

## Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 16/10/2023


Mme BOUZID Fatma

Mme BOUZID Fatma

Page : 3 / 3

## BIOCHIMIE

Acide Urique 57,3 mg/L ( 25 - 60 )  
340,9 µmol/L ( 149 - 357 )



## IMMUNO- HEMATOLOGIE

### GROUPAGE SANGUIN (1ère Détermination)

Groupe Sanguin

B-

Rhésus

NEGATIF

Bilan validé Biologiquement Le 16/10/2023

### Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1

Beni Yakhlef - Mohammedia

Email : labolouizia@gmail.com

Tél : 05 23 33 78 78

Fax : 0523337722

Urgence : 06 51 98 18 63

I.F : 45977059

ICE : 002637614000076

INPE : 093063717