

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0042045

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2538 Société : Ret RAM

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : KACHANI MUSTAPHA

Date de naissance : 01/01/1951

Adresse : JAMILA 5 Rue 187 N°29 c/d CASA 04

Tél. : 0667028896 Total des frais engagés : 1040,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 16/10/2023

Nom et prénom du malade : KACHANI MUSTAPHA Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/11/23	C2 + ECA		350,50	 DR. QAID LAKBIR CARDIOLOGUE Angle Bd Tal'el - Rue 5 Immeuble 102 Daj Chaoui Ain Chock ALGER - Algérie - Tel. 05 22 21 10 21

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE D'ALIDA DR. ABISSI Zineb day ALOU ra II N° 161 Ain Choc Tél 05 22 50 32 33	16/10/23	740,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES												
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.												
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.												
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient									
				Coefficient des Travaux								
				Montants des Soins								
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE											
	H <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">25533412</td> <td style="padding: 5px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">00000000</td> <td style="padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">00000000</td> <td style="padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">35533411</td> <td style="padding: 5px;">11433553</td> </tr> </table> B			25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553	Coefficient des Travaux
	25533412	21433552										
	00000000	00000000										
	00000000	00000000										
	35533411	11433553										
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Montants des Soins								
				Date du Devis								
				Date de l'exécution								

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur QIYADI Lakbir

CARDIOLOGUE

Hypertension Arterielle

Echo Doppler Cardiaque et Vasculaire

Holter Tentionnel

Holter E C G

Epreuve d'Effort



الدكتور قيادي الكبير

اختصاصي في أمراض القلب والشرائين

الضغط الدموي

فحص القلب بالصدى والدوبلير

التسجيل المستمر للضغط الدموي

التسجيل المستمر لتخطيط القلب

اختبار القلب بالجهد

Casablanca, le : 16/01/23 : الدار البيضاء في:

208,0 x 3

Coreva 5/5mg



1 cp - 0 - 0

58,0 x 2

2 Cardenal 5mg



0 - 0 - 1/2

صيدلية - دار الاداغة
PHARMACIE DAR ALIDAA
Dr IDRISSE Zineb
day Al Ou ra II N° 161 Ain Chok
Tél : 05 22 21 10 20

T: 740,20

صيدلية - دار الاداغة

PHARMACIE DAR ALIDAA
Dr IDRISSE Zineb
day Al Ou ra II N° 161 Ain Chok
Tél : 05 22 21 10 20

الدكتور قيادي الكبير
اختصاصي في أمراض القلب والشرائين
Dr QIYADI Lakbir
CARDIOLOGUE

Angle Bd Tah et Rue 5, Immeuble BLANCA
Loti Dar Chaoui Ain Chok
Casablanca - Tel : 05 22 21 10 20

INPE: 09 11 91 40 3

Angle Bd TAH et Rue 5, Immeuble BLANCA, 1er étage - Lotissement Dar Chaoui, Ain Chok
Casablanca - Maroc Tel : 05 22 21 10 20 - Urgence : 06 61 11 76 74



بیراند و بریل / املو دیبین

بیراندو پریل ارجینین / املودیبین

بیراندو بریل / ارجینین / املودیپین

هیراند و پریل ارجینین / املودیپین

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لتسند إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلّم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير متوقعة.

مقطع 4 : «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»

من المعلومات من
الطبيب أو الصيدلاني أو الممرض)
5. هاهي الآثار الجانبية المحتملة
مع كافة الأدوية، من الممكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، رغم أنها لا تصيب
كل الأشخاص.
6. لاحظت حدوث ن في التأثيرات الجانبية المذكورة فيما يلي، فيجب أن تتوقف عن تناول هذا الدواء
إذا تبين أن حصولك من هذه الأعراض قد يكون خطيراً، فاستشر طبيبك على الفور:
7. شعور مفاجئ بضيق في التنفس، ألم في الصدر أو ضيق النفس أو صعوبة التنفس.

انتفاخ القولن، الوجه أو الخشن،
انتفاخ السان والحقلي يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التنفس.
• فاعلات جلدية شديدة تتضمن طلع جدي، طفح واحمرار الجلد المنتشر في جميع أنحاء الجسم،
• كدمات عديدة وكثيرة، طفح غافق، تورم، التهاب الأغشية المخاطية (متلازمة شينشيس جونسن،
• الحزاز الشام أو الفم أو عنق ذلك مع انتشار التحسسة.
• دوخة شديدة أو إحساس شديد بالأهف،
• نوبة قلبية، خرابات قلب سريعة أو غير منتظمة بشكل غير اعتيادي، ألم في الصدر،
• التهاب البنكرياس الذي قد يؤدي إلى ألم شديد في البطن والظهر مع عصور بالإسهال الشديد.
• ألم الإزلاق مع حدوث التآثرات الجانبية الشديدة للغاية إذا كان أي منها قد سبق لك مشكلة أو استمر
لمدة أطول من أسبوعين، فيجب أن تتصل بطبيبك.

[illegible]

كوفيرام، حبة إن كانت إحدى الحالات
، للقلب، أو تضيق في الشريان الكلوي

تصفية الدم
هيمون الألدوستيرون في دمك (الألدوستيرونية
النسج الحامضي)، مثل ذاب شُمامي مجموعي،
خِبالاً عنه مواد تحتوي على البوتاسيوم (لأن توازن
ملاح ضغط الدم المرتفع:

8 118001 130078

بیراند و بریل / املو دیبین

بیراند و بریل / ارجینین / املودیپین

بیراند و پرل ارجینین / املودیپین

بیراند و بریل ارجینین / املودیپین

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لتستند إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المهددة للحياة في هذه النشرة.
- مقطع 4: «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»

هذه النشرة:

- [illegible]

كوفيرام، حبة إن كانت إحدى الحالات

للقلب)، أو تضيق في الشريان الكلوي

تصفية الدم

هرمون الألدوستيرون في دمك (الأدوستيرونية)

سبيج اللحمي)، مثل ذاب خُمامي مجموعي،

لَا عَنْهُ مَوَادُّ تَحْتَوِي عَلَى الْبُوتَاسِيُومِ (الَّذِي تَوَازَنُ

بد غنة مواد تحسوي على البوناسيوم (الون توارن)

1980年 第1期

لاج ضغط الدم المرتفع:

التي تعرف أيضا باسم مجموعة سارطان - مثل

شكوا من اضطرابات كلوية ذات صلة بالسكري.

كلى، ضغط الدم، وكمية الشوارد الكهربائية في

COVERAM®

COVERAM 5mg/5mg
Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118001 130078

قد يقوم طبيبك بفحوصات منتظمة مزاجية وأموية (أشعة) سنوية.

بیراند و بریل / ارجینین / املودیپین

بیراند و بریل / ارجینین / املودیپین

بیراند و پرل ارجینین / املودیپین

بیراند و بریل ارجینین / املودیپین

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لتستند إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المهددة للحياة في هذه النشرة.
- مقطع 4: «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»

هذه النشرة:

- [illegible]

كوفيرام، حبة إن كانت إحدى الحالات

للقلب)، أو تضيق في الشريان الكلوي

تصفية الدم

هرمون الألدوستيرون في دمك (الأدوستيرونية)

سبيج اللحمي)، مثل ذاب خُمامي مجموعي،

لَا عَنْهُ مَوَادٌ تَحْتَوِي عَلَى الْيُوتَاسِيَّوْمِ (الآن توازن)

بد غنة مواد تحسوي على البوناسيوم (الون توارن)

1980年 第1期

لاج ضغط الدم المرتفع:

التي تعرف أيضا باسم مجموعة سارطان - مثل

شكوا من اضطرابات كلوية ذات صلة بالسكري

كلى، ضغط الدم، وكمية الشوارد الكهربائية في

COVERAM®

COVERLAM 5mg/5mg
Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118001 130078

قد يقوم طبيبك بفحوصات منتظمة مزاجية وألمية (ألمية) لك.

Les comprimés sécables peuvent être divisés en deux demi-doses égales.
CARDENSIEL est habituellement utilisé dans le cadre d'un traitement au long cours.

Chez l'adulte, y compris les personnes âgées :

Le traitement par bisoprolol doit être instauré à faible dose et augmenté progressivement.

Votre médecin décidera de l'augmentation de la dose à appliquer, en général selon le schéma suivant :

- 1,25 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- 2,5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- 5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
- 10 mg de bisoprolol une fois par jour en traitement d'entretien (en continu)

La dose quotidienne maximale recommandée est de 10 mg de bisoprolol.

Selon votre tolérance au médicament, votre médecin pourra également décider de prolonger l'intervalle entre les augmentations de la dose. Si votre état de santé ne s'améliore pas, votre médecin pourra décider d'augmenter la dose ou de vous prescrire un autre médicament. Si votre état de santé se détériore, votre médecin pourra décider de réduire la dose ou d'interrompre le traitement. Chez certains patients, la baisse du taux de sucre dans le sang.

Si vous avez pris plus de CARDENSIEL que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin qui décidera des mesures à prendre.

Les symptômes de surdosage peuvent être un ralentissement du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires sévères, des vertiges ou des tremblements.

Si vous oubliez de prendre CARDENSIEL :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez la dose habituelle le matin suivant.

Si vous arrêtez de prendre CARDENSIEL :

N'interrompez en aucun cas le traitement par CARDENSIEL si votre médecin ne vous a pas conseillé de le faire. Dans le cas contraire, votre état de santé pourrait se détériorer.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARDENSIEL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Afin d'éviter les réactions graves, consultez un médecin immédiatement si un effet indésirable sévère, survient brusquement ou s'aggrave rapidement.

Les effets indésirables les plus graves sont ceux touchant les fonctions cardiaques :

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- aggravation de l'insuffisance cardiaque (moins de 1 personne sur 10)
- rythme cardiaque lent ou irrégulier (moins de 1 personne sur 100)

Si vous avez des vertiges ou si vous vous sentez faible, ou encore si vous avez des difficultés à respirer, contactez votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables sont répertoriés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

Fréquent (moins de 1 personne sur 10) :

- fatigue, épuisement, vertiges, maux de tête,
- sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds
- pression artérielle basse
- troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée ou constipation,

Peu fréquent (moins de 1 personne sur 100) :

- troubles du sommeil
- dépression
- vertiges lors du passage à la position debout
- gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques
- faiblesse musculaire, crampes

Rare (moins de 1 personne sur 1000) :

- troubles de l'audition
- rhinite allergique
- diminution de la sécrétion de larmes
- inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- résultats d'analyses anormaux
- réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruptions cutanées

Vous devez immédiatement consulter votre médecin si vous présentez des réactions allergiques sévères, avant d'impliquer un gonflement au niveau du visage, du cou, de la langue, de la bouche ou de la gorge ou des difficultés respiratoires.

- troubles de l'érection
- cauchemars, hallucinations
- perte de connaissance

Très rare (moins de 1 personne sur 10 000) :

- irritation et rougeur de l'œil (conjonctivite)
 - chute des cheveux
 - apparition ou aggravation d'une affection cutanée squameuse (psoriasis) ; éruption psoriasique
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CARDENSIEL ?

Conservez le médicament à l'abri de la lumière, à température ambiante, dans son emballage d'origine.



Les comprimés sécables peuvent être divisés en deux demi-doses égales.
CARDENSIEL est habituellement utilisé dans le cadre d'un traitement au long cours.

Chez l'adulte, y compris les personnes âgées :

Le traitement par bisoprolol doit être instauré à faible dose et augmenté progressivement.

Votre médecin décidera de l'augmentation de la dose à appliquer, en général selon le schéma suivant :

- 1,25 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- 2,5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- 5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
- 10 mg de bisoprolol une fois par jour en traitement d'entretien (en continu)

La dose quotidienne maximale recommandée est de 10 mg de bisoprolol.

Selon votre tolérance au médicament, votre médecin pourra également décider de prolonger l'intervalle entre les augmentations de la dose. Si votre état s'aggrave d'entretien inférieure à 10 mg de bisoprolol peut être suffisante. Votre médecin vous indiquera la manière à suivre. Si vous devez arrêter totalement le traitement, votre médecin vous conseillera généralement de réduire progressivement la dose, faute de quoi votre état de santé pourrait se détériorer.

Si vous avez pris plus de CARDENSIEL que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin qui décidera des mesures à prendre.

Les symptômes de surdosage peuvent être un ralentissement du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires sévères, des vertiges ou des tremblements.

Si vous oubliez de prendre CARDENSIEL :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez la dose habituelle le matin suivant.

Si vous arrêtez de prendre CARDENSIEL :

N'interrompez en aucun cas le traitement par CARDENSIEL si votre médecin ne vous a pas conseillé de le faire. Dans le cas contraire, votre état de santé pourrait se détériorer.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARDENSIEL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Afin d'éviter les réactions graves, consultez un médecin immédiatement si un effet indésirable sévère, survient brusquement ou s'aggrave rapidement.

Les effets indésirables les plus graves sont ceux touchant les fonctions cardiaques :

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- aggravation de l'insuffisance cardiaque (moins de 1 personne sur 10)
- rythme cardiaque lent ou irrégulier (moins de 1 personne sur 100)

Si vous avez des vertiges ou si vous vous sentez faible, ou encore si vous avez des difficultés à respirer, contactez votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables sont répertoriés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

Fréquent (moins de 1 personne sur 10) :

- fatigue, épuisement, vertiges, maux de tête,
- sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds
- pression artérielle basse
- troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée ou constipation,

Peu fréquent (moins de 1 personne sur 100) :

- troubles du sommeil
- dépression
- vertiges lors du passage à la position debout
- gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques
- faiblesse musculaire, crampes

Rare (moins de 1 personne sur 1000) :

- troubles de l'audition
- rhinite allergique
- diminution de la sécrétion de larmes
- inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- résultats d'analyses anormaux
- réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruptions cutanées

Vous devez immédiatement consulter votre médecin si vous présentez des réactions allergiques sévères, avant d'impliquer un gonflement au niveau du visage, du cou, de la langue, de la bouche ou de la gorge ou des difficultés respiratoires.

- troubles de l'érection
- cauchemars, hallucinations
- perte de connaissance

Très rare (moins de 1 personne sur 10 000) :

- irritation et rougeur de l'œil (conjonctivite)
 - chute des cheveux
 - apparition ou aggravation d'une affection cutanée squameuse (psoriasis) ; éruption psoriasique
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CARDENSIEL ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.



CABINET DE CARDIOLOGIE DR QIYADI

Name: Kachani mustapha Cli No.:

Sex: Female

Age: 72Y

SN: 0000308

Section: CABINET DE CARDIO CaseNo.:

BedNo.:

Date: 16/10/2023 12:26:34



00:00 AC: 50HZ+DFT: 0.32HZ+EMG: 25HZ 25mm/s 10mm/mV

Frequency:	1000Hz	QTc Interval:	440ms
Sample Time:	8s	P Axis:	47.90°
HR:	97bpm	QRS Axis:	66.60°
P Interval:	96ms	T Axis:	91.90°
QRS Interval:	81ms	RV5/SV1:	1.99/1.18mV
T Interval:	192ms	RV5+SV1:	3.17mV
PR Interval:	157ms	RV1+SV5:	--
QT Interval:	347ms		

Prompt:

Total Beats 11, Normal Beats 11.

in gear Sinus mode Target rate; Cardiac electric axis normal; possible old anteroseptal MI;

الدكتور قيادي الكبير
اختصاصي في أمراض القلب والشرانين
Dr. QIYADI Lakbir
CARDIOLOGUE
Angle Bd Tah Et Rue 5 Imm Blanca
Loti Dar Chaoui Ain Chock - Etg 1
Casablanca - Tel : 05 22 21 10 20

INPE : 09 11 91 40 3

Doctor: DR QIYADI L