

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

M22- 0050341

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☒ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1483 Société : R A J  
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : KHAIRI NEZHA Veuve CHERKAoui  
 Date de naissance : 03/08/1961  
 Adresse : Residence Rio BRSidi Abderahmane  
 apt 3222 A - Diable Casa  
 Tél. : 0662242640 Total des frais engagés : 385,70. Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Rachid KHETTAB  
Pneumologue - Casablanca  
175, Rue Boukraf - Casablanca  
Tél: 05 22 45 23 75  
ICE: 00150459

Date de consultation : 27/10/2023  
 Nom et prénom du malade : M. CHERKAoui Khairi Nezha  
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
 Nature de la maladie : Affection respiratoire  
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 27/11/2023  
 Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/10/23	C1		350,00	
03/11/23	C5		G	

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	27/10/23	535,70
	03/11/2023	31,60

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
	03/11/23					250,00
	03/11/23					60,00

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Casablanca le : ..... 03/11/2023

**MME CHERKAOUI KHAIRI NEZHA**

- **Airfastec cp 10 mg**  
1 comprimé, soir 1 mois
- **Akindex adulte 0,133 g / 100 ml**  
1 cuillère, matin, midi, soir 5 jours ou drill toux sèche

37.50

  
  
Docteur Rachid EL KHETTAR  
Pneumologue  
175, Rue Boukraa - Casablanca  
Tél: 05 22 49 23 75  
ICE: 001 2045 75 23 75  
Mme. Amal EL GABBAJ BARRI  
Docteur en Pharmacie  
PHARMACIE DANTON  
47, Boulevard Bir Anzgar  
Tél: 0522 25 03 73

**Résidence Houssam Jassim**

175, Rue Boukraa, Près de l'Hôpital My Youssef - 3<sup>ème</sup> Etage - Casablanca

Tél.: 0522 49 23 75 - 0675 35 24 35

E-mail : pneumorek@gmail.com



# AKINDEX

TOUX SÈCHE

Sirop

## COMPOSITION

Pour 100 ml de sirop

**Adultes :** Bromhydrate de dextrométhorphan (DCI) ..... 0,133 g

Excipients : Benzoate de sodium, eau purifiée, arôme abricot, acide citrique monohydraté, solution de saccharose.

**Enfants :** Bromhydrate de dextrométhorphan (DCI) ..... 0,100 g

Excipients : Benzoate de sodium, eau purifiée, arôme banane, acide citrique monohydraté, solution de saccharose.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Adultes : sirop, ..... de 200 ml

Enfants : sirop, .....

## CLASSE PHARMACOLOGIQUE

ANTITUSSIF.

(R : système re...

## DANS QUEL CAS ?

Traitement de co...

## ATTENTION !

Ce médicament

• Allergie à l'un

• Insuffisance re

• Toux de l'asth

• Traitement pa

• Ce médicame

En cas de doute

## MISES EN GARDE

Mises en garde

- En cas de mal

un avis médical

- Ne traitez pas

à l'évacuation de

- Si la toux devie

- En raison de la présence de saccha

syndrome de malabsorption du glucose

**Précautions d'emploi :**

- En cas de survenue de fièvre, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, ne pas

augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consultez

votre médecin.

- N'associez pas un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique) avec cet antitussif.

- Ce médicament contient du saccharose : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre

ou de diabète.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Grossesse

Il est possible de prendre un médicament contenant du dextrométhorphan pendant votre grossesse, à condition que

cela soit pendant un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de dextrométhorphan peut entraîner des effets néfastes chez le

nouveau-né.

Il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de prendre un médicament contenant du dextrométhorphan.

## Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel.

De trop fortes doses de dextrométhorphan administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses

respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En conséquence, la prise de ce médicament est contre-indiquée

pendant l'allaitement.

## INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,

même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance notamment si vous prenez des IMAO (médicaments prescrits

au cours de certains états dépressifs).

Ce médicament contient un antitussif le dextrométhorphan. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un

autre antitussif. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

## LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

• Benzoate de sodium

• Saccharose : Adultes : 11,5 g par cuillère à soupe.

Enfants : 1,5 g par cuillère à café.

# AKINDEX

## SIROP ADULTES

AMM : 218 IMP/21/NRQ  
LOT : 23033 PER : 02/2026  
PPV : 31,50 DH

**Dr Rachid EL KHETTAR**  
**PNEUMOLOGUE - ALLERGOLOGUE**

الدكتور رشيد الخطار  
اختصاصي في أمراض الرئة والحساسية  
البالغين - الأطفال

**Cabinet d'Explorations Respiratoires**

**Pneumorek**

**Adultes - Enfants**

**MME CHERKAOUI KHAIRI NEZHA**

Casablanca le :

28/10/23

79,70

- Zithromax 500 mg  
1 cp le soir 3 jours

80,00

- abrilair sirop  
1 cam matin et soir 5 jours

297,00

- Symbicort turbuhaler 200/6 µg  
1 dose, le soir 15 jours

79,00

- OROXYL spray gorge  
1 pulv matin, soir

T = 535,70

**Dr Rachid EL KHETTAR**  
Pneumologue  
175, Rue Boukraa - Casablanca  
Tél: 05 22 49 23 75  
ICE: 00158457

**Mme. Amal EL QABBAJ BAH**  
Docteur en Pharmacie  
**PHARMACIE DANTON**  
47 Boulevard Bir Anzarane - Casablanca  
Tél 0522 25 09 78 - 0522 23 17 51  
INPE 092020312

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue soussan hrou al soussan roches  
noires casablanca  
**SYMBICORT TURBUHALER**  
Pâte p/inh  
200/6 µg  
Flacon de 120 doses  
10474 DMP 21NRD P.P.V: 297,00 DH  
6 118001 020708

PPC 79 DHS  
23707  
2025-01  
6 118002 080020 >

**Résidence Houssam Jassim**

175, Rue Boukraa, Prés de l'Hôpital My Youssef - 3<sup>ème</sup> Etage - Casablanca

Tél.: 0522 49 23 75 - 0675 35 24 35

E-mail : pneumorek@gmail.com

# ABRILAR

Solution Buve~~ment~~ alimentaire n'est pas un médicament

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### ABRILAR

Extrait de Primula veris, Extrait de Thym, Extrait de Glycyrrhiza glabra, la mélasse de caroube, Glycérine, Sorbitol, Sorbate de potassium, Eau minéralisée,

## FORME ET PRÉSENTATIONS

Solution buvale, flacon de 150 ml.

## PROPRIÉTÉS

**ABRILAR** est un sirop composé d'extraits de plantes Extrait de Primula veris , Extrait de thym , Extrait de Glycyrrhiza glabra dont les propriétés sont bénéfiques pour la gorge et les voies respiratoires.

Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte et l'enfant , en particulier lorsqu'elles surviennent le soir ou pendant la nuit.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Voie orale

### ABRILAR

2 cuillères à mesure 3 à 4 fois par jour.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser par la femme enceinte.  
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

- Bien agiter avant l'emploi.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**Complément alimentaire n'est pas un médicament**

Produit de : **SIDRA PHARMA**

Fabriquer par : **Laboratoires PMP BIOPHARMED**  
ZONE INDUSTRIELLE "ALJ" LOT 89 ,  
EL MANSOURIA BENSLIMANE

Autorisation ministère de santé n° : N° 20212103174/V1/DMP/CA/18  
Agrément ONSSA n° : CAPV.58.66.22





Pfizer

**ZITHROMAX®**

Zithromax 500 mg comprimés pelliculés  
Zithromax 200 mg/ml poudre pour suspension buvable  
Azithromycine

Informations essentielles **avant** tout début de traitement à l'enfant ce médicament car elle contient des

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter.  
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.  
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.  
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.  
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.

Dans cette

1. Ce médicament

2. Quelles

3. Comment

4. Quels son

5. Comment

6. Contient

7. Qu'est-ce

8. Zithromax

9. Zithromax

10. Zithromax

11. Zithromax

12. Zithromax

13. Zithromax

14. Zithromax

15. Zithromax

16. Zithromax

17. Zithromax

18. Zithromax

19. Zithromax

20. Zithromax

21. Zithromax

22. Zithromax

23. Zithromax

24. Zithromax

25. Zithromax

26. Zithromax

27. Zithromax

28. Zithromax

29. Zithromax

30. Zithromax

31. Zithromax

32. Zithromax

33. Zithromax

34. Zithromax

35. Zithromax

36. Zithromax

37. Zithromax

38. Zithromax

39. Zithromax

40. Zithromax

41. Zithromax

42. Zithromax

43. Zithromax

44. Zithromax

45. Zithromax

46. Zithromax

47. Zithromax

48. Zithromax

49. Zithromax

50. Zithromax

51. Zithromax

52. Zithromax

53. Zithromax

54. Zithromax

55. Zithromax

56. Zithromax

57. Zithromax

58. Zithromax

59. Zithromax

60. Zithromax

61. Zithromax

62. Zithromax

63. Zithromax

64. Zithromax

65. Zithromax

66. Zithromax

67. Zithromax

68. Zithromax

69. Zithromax

70. Zithromax

71. Zithromax

72. Zithromax

73. Zithromax

74. Zithromax

75. Zithromax

76. Zithromax

77. Zithromax

78. Zithromax

79. Zithromax

80. Zithromax

UT.AT. : 0 8 2 0 2 4

P.P.V.

LOT N° : 6 M 3 8 4 0

09366030/4

• Les autres médicaments qui permettent de réduire le taux de glucose dans le sang.  
• Les autres médicaments qui provoquent la rupture des cellules musculaires (rhabdomyolyse).  
• La chloroquine (un médicament contre le paludisme) ou une transfusion sanguine. En cas de prise concomitante de ce médicament et de Zithromax, la dose de chloroquine doit être augmentée surveillée.  
• Les anticoagulants (surtout de type coumarineux (par exemple, la warfarine)). La prise concomitante de ce médicament et de Zithromax peut entraîner une augmentation de l'effet anticoagulant de ces médicaments.  
• Zithromax ne doit pas être pris avec d'autres médicaments pouvant affecter le rythme cardiaque (voir la rubrique « Avertissements et précautions d'emploi »).  
• Zithromax avec aliments et boissons  
• Zithromax peut être pris avec ou sans nourriture. Prenez de préférence ce médicament après avoir mangé.

**Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Si vous ne vous prescrivez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Grossesse  
Cremerie il y a peu suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, votre médecin vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Ne prenez pas d'autres médicaments à base de Zithromax, car ils contiennent des sels ammoniacaux et des macrolides et ne faut pas d'autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).  
Avertissements et précautions d'emploi  
Veuillez vous adresser au médecin ou au pharmacien avant de prendre/donner à l'enfant Zithromax.  
Si vous avez ou avez déjà eu des problèmes de foie ou si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments susceptibles de causer des problèmes hépatiques (voir la rubrique « Autres médicaments et Zithromax »). Dans ce cas, la prudence est indispensable avant de débuter le traitement par Zithromax.  
Si vous êtes sous traitement ou en attente d'être traité par Zithromax (autres médicaments et Zithromax) :  
• si vous êtes sous traitement ou en attente d'être traité par Zithromax (autres médicaments et Zithromax) :  
• si vous souffrez de problèmes rénaux graves (insuffisance rénale sévère) ;  
• si vous souffrez de troubles du rythme cardiaque car Zithromax peut également causer des troubles du rythme cardiaque légers, mais dans certains cas mortels (voir la rubrique 4 « Effets secondaires possibles »).

Par conséquent, ce produit doit être utilisé avec précaution :  
• chez les patients présentant des anomalies congénitales du cœur, avec un rythme cardiaque très lent (bradycardie), des troubles du rythme cardiaque (arythmie) ou de graves problèmes cardiaques (insuffisance cardiaque grave) ;  
• chez les patients qui prennent déjà d'autres médicaments pouvant affecter le rythme cardiaque, tels que : quinidine, procainamide, doxétiline, amiodarone, sotalol (médicaments pour traiter les troubles du rythme cardiaque), cisapride (médicament contre le reflux du contenu de l'estomac dans l'œsophage), la flécaïne (médicament contre les enflures), l'érythromycine, et chloroquine (antipaludique) ;  
• chez les patients présentant de faibles concentrations de potassium et de magnésium dans le sang ;  
• chez les personnes âgées et les femmes.

Veuillez informer votre médecin si l'une des conditions suivantes se manifeste ou s'aggrave pendant le traitement par Zithromax (voir également la rubrique 4 « Effets secondaires possibles ») :  
• des réactions allergiques graves, y compris des réactions graves de la peau qui peuvent affecter d'autres organes et causer la fièvre. En cas de réaction allergique, arrêtez immédiatement de prendre Zithromax et adressez-vous à votre médecin ;  
• si des symptômes d'un dysfonctionnement du foie apparaissent comme une faiblesse soudaine et associée à une augmentation de la peau ou des muqueuses, une urticaire et une tendance à saigner ou des symptômes hépatiques (par exemple, confusion, altération de l'état de conscience ou coma). Arrêtez immédiatement de prendre Zithromax et consultez votre médecin qui vous prescrira des examens de contrôle pour évaluer l'état du foie ;  
• vomissements ou irritabilité chez les enfants d'âge préscolaire dans les 48 premiers jours de vie qui apparaissent après le premier ou le deuxième traitement par Zithromax d'une partie de l'estomac. Si vous remarquez l'un de ces symptômes chez votre enfant, consultez immédiatement le médecin qui le soigne ;  
• symptômes d'une nouvelle infection ou persistance des symptômes d'infection en cours. Cette situation pourrait être due à des bactéries insensibles à Zithromax (bactéries résistantes) ou à d'autres organismes autres que les bactéries (infections fongiques) ;

• apparition de la diarrhée, qui peut être légère, mais mortelle dans certains cas (colite fongique). La diarrhée peut survenir si vous prenez tous les antibiotiques, y compris Zithromax, et est due à l'altération de la flore bactérienne intestinale normale, ce qui permet aussi la prolifération d'une bactérie appelée Clostridium difficile. En cas de diarrhée, votre médecin surveillera attentivement parce que l'infection à Clostridium difficile peut également apparaître deux mois après la fin de la prise de ce médicament ;  
• apparition ou aggravation de la faiblesse musculaire et fatigabilité accrue, à savoir les symptômes de myasthénie grave.

**Enfants**  
Zithromax peut être utilisé chez les enfants et les adolescents.  
**Autres médicaments et Zithromax**  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez/vous avez récemment pris/vous allez prendre/vous avez récemment pris d'autres médicaments.  
Certains médicaments et d'autres médicaments peuvent avoir des effets indésirables lorsqu'ils sont pris avec Zithromax, la dose de Zithromax doit être ajustée en fonction de la dose de l'autre médicament. En cas de prise concomitante de ce médicament et de Zithromax, la dose de Zithromax doit être ajustée en fonction de la dose de l'autre médicament.

• les antibiotiques (médicaments contre l'acidité de l'estomac) : éviter de prendre un antibiotique et Zithromax simultanément ;  
• les antifongiques (médicaments contre les infections par le VIH) : en cas de prise concomitante de ce médicament et de Zithromax, la dose de Zithromax doit être ajustée en fonction de la dose de l'autre médicament ;  
• les corticostéroïdes (médicaments contre la grippe) : la prise concomitante de ce médicament et de Zithromax est déconseillée car des troubles de la circulation sanguine peuvent survenir, en particulier dans les doigts et les oreilles (crise d'érythème) ;

• Pour le traitement de l'otite moyenne aiguë chez les enfants :  
la posologie recommandée est de 10 mg/kg par jour pendant 3 jours consécutifs ou 30 mg/kg en une seule dose (voir aussi plus loin « Comment prendre le produit pour suspension buvable »).  
• Pour le traitement de la pharyngite streptococcique chez les enfants :  
la posologie recommandée est de 10 mg/kg ou 20 mg/kg, en une seule administration et pendant 3 jours consécutifs mais sans jamais dépasser la dose quotidienne de 500 mg.  
La dose totale maximale recommandée pour une thérapie pédiatrique est de 1 500 mg.

**Patients particuliers**  
Si vous êtes âgé et que vous souffrez d'une insuffisance hépatique ou rénale légère ou modérée, le médecin pourra vous prescrire une dose plus faible que celle recommandée ci-dessus.  
Comment prendre les comprimés  
Veuillez à vous prescrire les comprimés en entier. Prenez les comprimés avec un verre d'eau en une seule dose quotidienne. Les comprimés peuvent être pris à jeun ou après un repas. Prenez les comprimés avec un verre d'eau pour prendre le comprimé pour le traitement de la pharyngite streptococcique.

• Pour le traitement de l'otite moyenne aiguë chez les enfants :  
la posologie recommandée est de 10 mg/kg par jour pendant 3 jours consécutifs ou 30 mg/kg en une seule dose (voir aussi plus loin « Comment prendre le produit pour suspension buvable »).  
• Pour le traitement de la pharyngite streptococcique chez les enfants :  
la posologie recommandée est de 10 mg/kg ou 20 mg/kg, en une seule administration et pendant 3 jours consécutifs mais sans jamais dépasser la dose quotidienne de 500 mg.  
La dose totale maximale recommandée pour une thérapie pédiatrique est de 1 500 mg.

**Patients particuliers**  
Si vous êtes âgé et que vous souffrez d'une insuffisance hépatique ou rénale légère ou modérée, le médecin pourra vous prescrire une dose plus faible que celle recommandée ci-dessus.  
Comment prendre les comprimés  
Veuillez à vous prescrire les comprimés en entier. Prenez les comprimés avec un verre d'eau en une seule dose quotidienne. Les comprimés peuvent être pris à jeun ou après un repas. Prenez les comprimés avec un verre d'eau pour prendre le comprimé pour le traitement de la pharyngite streptococcique.

• Pour le traitement de l'otite moyenne aiguë chez les enfants :  
la posologie recommandée est de 10 mg/kg par jour pendant 3 jours consécutifs ou 30 mg/kg en une seule dose (voir aussi plus loin « Comment prendre le produit pour suspension buvable »).  
• Pour le traitement de la pharyngite streptococcique chez les enfants :  
la posologie recommandée est de 10 mg/kg ou 20 mg/kg, en une seule administration et pendant 3 jours consécutifs mais sans jamais dépasser la dose quotidienne de 500 mg.  
La dose totale maximale recommandée pour une thérapie pédiatrique est de 1 500 mg.

**Patients particuliers**  
Si vous êtes âgé et que vous souffrez d'une insuffisance hépatique ou rénale légère ou modérée, le médecin pourra vous prescrire une dose plus faible que celle recommandée ci-dessus.  
Comment prendre les comprimés  
Veuillez à vous prescrire les comprimés en entier. Prenez les comprimés avec un verre d'eau en une seule dose quotidienne. Les comprimés peuvent être pris à jeun ou après un repas. Prenez les comprimés avec un verre d'eau pour prendre le comprimé pour le traitement de la pharyngite streptococcique.

Casablanca le : ..... 03/11/2023

## Note d'honoraire

**MME CHERKAOUI KHAIRI NEZHA**

Acte	QTE	Honoraire
EFR SPIROMETRIE K30	1	600,00 Dh
Radiologie thoracique Z12	1	250,00 Dh
<b>Total</b>		<b>850,00 Dh</b>

Arrêté la présente facture à la somme de :  
huit cent cinquante dirham(s)

*Dr Rachid EL KHETTAR*  
*Pneumologue - Allergologue*  
*175, Rue Boukraa - Casablanca*  
*Tél: 05 22 49 23 75*  
*ICE: 00150152*

**Résidence Houssam Jassim**

175, Rue Boukraa, Près de l'Hôpital My Youssef - 3<sup>ème</sup> Etage - Casablanca

Tél.: 0522 49 23 75 - 0675 35 24 35

E-mail : pneumorek@gmail.com



# Cabinet Dr EL Khettar Rachid

Pneumologie allergologie somnologie  
175 rue boukraa Casablanca bourgogne  
Tel: 0522492375 0675652435




Nom : **Nezha Cherkaoui khairi**

Taille: 166 cm Age: 62 Ans Date Naissance: 03/08/1961

ID: **NezChe03081961**

Poids: 79 kg Genre: Féminin BMI: 28,7 kg/m<sup>2</sup>

Medication: Post: Salbutamol



Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref	Post	%Ref	%Pré	ZScore
CV	l	2,84	2,81	99	2,70	95	-4	
CI	l	2,42	2,46	102	2,03	84	-17	
VC	l		2,41		2,40		0	
VRE	l	0,78	0,35	44	0,67	86	91	

Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref	Post	%Ref	%Pré	ZScore
VEMS	l	2,41	2,58	107	2,61	109	1	
CVFex	l	2,85	2,76	97	2,68	94	-3	
VEMS/CVF	%	77	93		97		4	
DEP	l/s	6,16	6,42	104	6,54	106	2	
DEM25	l/s	1,30	1,79	138	2,08	159	16	
DEM50	l/s	3,68	4,15	113	4,56	124	10	
DEM75	l/s	5,40	6,31	117	6,39	118	1	
DEM 25-75	l/s	2,89	3,81	132	4,20	146	10	
tex	s		1,9		1,4		-26	

Commentaire:

*Signature*  
Dr Rachid EL KHETTAR  
Pneumologie  
175 rue Boukraa - Casablanca  
Tel: 05 22 49 23 75

Date: 03/11/2023  
Temps: 13:24

Température ambiante: 25 °C  
Pression ambiante: 1020 hPa  
Humidité ambiante: 57 %

Technicien:

Dr Rachid EL KHETTAR

PNEUMOLOGUE - ALLERGOLOGUE

Casablanca, le 03/11/2023

## Compte Rendu

Mme CHERKAOUI KHAIRI Nezha

Cœur de volume normal.

Culs de sacs libres.

Champs pulmonaire libre.

AU TOTAL

Cliché pulmonaire Normal.

Dr Rachid EL KHETTAR

Dr Rachid EL KHETTAR  
Pneumologue  
175, Rue Boukhalil  
Tél: 05 22 20 23 74  
ICE: 0015845