

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 332 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

OUAKARAM MACIKA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

9/11/2023

Nom et prénom du malade :

OUAKARAM MACIKA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Maladie de l'oreille

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :




### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9.11.2023	S		200,00	

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	09/11/23	347 Dhs

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	10/11/23	450 DH	745 DH

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G
	B
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Brahim Amzil

Médecine Générale

Cabinet Médical

173, Rue Saint Laurent

"Garage Allal" - Casablanca

Tél. : 05 22 81 29 97 - Fax : 05 22 28 74 40

الدكتور بraham Amzil

الطبيب العام

العيادة

173، زققة سان لوران

كراج عال - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 81 29 97 - الفاكس : 05 22 28 74 40

Casablanca, le .....

B. M. - 2023

الدار البيضاء في

9 - WAKARAM - Naluke  
99 el Relaveum 330

1 - gel le sr

2 - Nasper F

3 - ug. x ap my.

3 - Flagyl 500 mg

4 - Oméprazol 20 mg  
1x1 le mth en ny

5 - Boreax 20 disp  
300 mg le srt opus  
300 mg le srt opus



Dr. Brahim AMZIL  
173, Rue Saint Laurent Casablanca  
Kraj Alal - 173, Rue Saint Laurent Casablanca  
Phone: 05 22 81 29 97 - Fax: 05 22 28 74 40

# BREXIN® comprimés effervescents

Piroxicam bêta-cyclodextrine

## Composition :

Piroxicam  
(sous forme de piroxicam bêta-cyclodextrine)

Excipients (dont lactose et aspartam) q.s.p.

## Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien du groupe des oxy-NSAID

## Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 12 ans.

Traitement symptomatique au long cours :

- des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment les syndromes apparentés, tels que syndrome de Fiechter, syndrome de Reiter, arthrites douloureuses et invalidantes
- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes
- Traitement symptomatique de courte durée des polyarthrites
- rhumatismes ab.-articulaires tels que péri-arthrites
- traumatiques de l'appareil locomoteur,
- arthrites microcristallines,
- arthroses,
- radiculalgies.

## Contre-indications :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de piroxicam ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodenal en évolution, insuffisance hépatocellulaire sévère, insuffisance rénale sévère.

Enfants (moins de 15 ans).

Phénylcétonurie du fait de la présence de l'aspartam.

Femme enceinte (à partir du 6<sup>ème</sup> mois).

En association avec les anticoagulants oraux, autres AINS.

## Effets indésirables :

Les plus fréquents sont les suivants :

Effets gastro-intestinaux comme : anorexie, pesanteurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, flatulences, diarrhées, ulcères.

Réactions d'hypersensibilité : dermatologiques, respiratoires et générales.

Effets sur le système nerveux central : céphalées, somnolences et vertiges.

Réactions cutanées-muqueuses : éruption, prurit, rares cas de photosensibilisation, stomatites.

Enfant de moins de 15 ans : exceptionnelles infections graves de la peau en cas de varicelle rapportées.

## Précautions d'emploi :

Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite chronique et / ou à une polypose nasale, ont un risque de manifestation allergique lors de la prise d'aspirine et / ou d'AINS plus élevé que le reste de la population. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme.

En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'une manifestation cutanée ou muqueuse, interrompre immédiatement le traitement.

La survenue de crise d'asthme chez certains sujets peut être liée à une allergie à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué.

Ce médicament sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des antécédents digestifs.

En cas de varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

La prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les 5 premiers mois de la grossesse, et elle est contre-indiquée à partir du 6<sup>ème</sup> mois.

Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

L'attention doit être attirée chez les conducteurs et utilisateurs de machines sur la possibilité de vertiges et de somnolence.

En cas de surdosage, procéder à un transfert immédiat en milieu hospitalier.

Enfant de moins de 15 ans : lors de la varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

## Mode d'emploi et posologie :

Réservez à l'adulte. Se conformer à la prescription médicale.

Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d'eau.

Les comprimés doivent être pris au cours d'un des 3 repas.

## Formes et autres présentations :

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 et 20 comprimés effervescents

BREXIN® 20 mg - Boîte de 20 comprimés sécables

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 sachets

## Liste I (Tableau A)

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

PROMOPHARM S.A.  
Z.I. du Sahei - Had Soualem - Maroc  
S/L CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

# Omepral® promopharm 20 mg

Boîtes de 7, 14 ou 28 gélules

Oméprazole

Veuillez lire cette notice

ce médicament.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez toute information à ce sujet.
- Ce médicament n'est pas destiné à quelqu'un d'autre que vous.
- Si l'un des effets indésirables devient préoccupant dans cette notice.

## 1 - DENOMINATION

Omépral promopharm

Oméprazole

## 2 - COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Oméprazole (DCI) .....

Excipients :

Sphères de sucre (Saccharose, amidon de maïs), laurylsulfate de sodium (sol. 2.5%), phosphate disodique anhydre, mannitol (E421), hypromellose (E464), macrogol 6000, talc (E553b), polysorbate 80 (E433), dioxyde de titane (E171), copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (Eudragit L30-D55).

### Liste des excipients à effet notable :

Omépral promopharm 20 mg, gélule contient du saccharose.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## 3 - CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Code ATC: A02BC01

Omépral promopharm 20 mg, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

## 4 - INDICATIONS :

Omépral promopharm 20 mg, gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Omépral promopharm 20 mg, gélule peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (réurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## 5 - POSOLOGIE :

Les doses habituelles sont données ci-dessous.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

- La dose recommandée une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose recommandée une fois par jour.

1 partie ha

20 mg une

prende

i n'a pas é

ment cicat

saines.

omac (ulc

10 mg une

le prendr

n'a pas é

nt cicatr

3.

cère duo

0 mg ou

a fois par j

al et gastr

oïdiens) :

de 20 mg une

duodénum et

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

## Traitement et prévention des ulcères pyloriques :

- La dose recommandée est de 20 mg de deux fois par jour pendant une semaine.

• Votre médecin va vous prescrire en même temps la clarithromycine et le métronidazole.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg par jour.

• Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de la durée pendant laquelle vous prendrez le médicament.

## Enfants et adolescents :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitations acides.

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre 20 mg. La posologie dépendra du poids et de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères pyloriques :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg. La posologie dépendra du poids et de la dose correcte à administrer.

• Votre médecin prescrira à votre enfant 20 mg de l'amoxicilline et la clarithromycine.

## Posologie :

- Il est recommandé de prendre vos gélules avec de l'eau.

• Les gélules peuvent être prises avec ou sans manger.

• Elles doivent être avalées entières avec de l'eau.

• Les gélules ne doivent pas être mâchées ou broyées. La pellicule qui empêche le médicament de se décomposer est importante de ne pas déteriorer les granules.

Que faire si vous ou votre enfant avez avalé une gélule :

• Si vous ou votre enfant avez des difficultés pour avaler la gélule, ouvrir la gélule et avaler le contenu directement dans un verre d'eau non gazeuse (par exemple pomme ou ananas) ou dans du lait.

• Toujours renouer juste avant de boire le mélange immédiatement ou dans 10 minutes.

• Pour s'assurer que vous avez bu tout le contenu de la gélule, buvez un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux doivent être avalés.

## 6 - CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais ce médicament dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des ingrédients dans Omépral promopharm 20 mg.

• Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (omeprazole, lansoprazole, rabeprazole).

• Si vous prenez un médicament contenant de l'omeprazole.

Si vous avez des douleurs, parlez-en à votre pharmacien.

Si vous prenez Omépral promopharm 20 mg, gélule.

# No-Spa® Forte 80mg

## *Chlorhydrate de drotavérine*

## Comprimé

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
  - Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
  - Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que No-Spa forte comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre No-Spa forte comprimé ?
  3. Comment prendre No-Spa forte comprimé ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver No-Spa forte comprimé ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE NO-SPA FORTE COMPRIME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

No-Spa forte comprimé est un antispasmodique. Il peut être utilisé dans les situations suivantes :

- Spasmes des muscles lissés associés à des troubles d'origine biliaire : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.
  - Spasmes des muscles lissés associés à des troubles d'origine urinaire : calcul urinaire (dans les reins ou les uretères), pyélitie (inflammation du bassinet), cystite (inflammation de la vessie), ténèse vésical (tension douloureuse de la vessie avec sensation de brûlure et envie continue d'uriner).
  - Traitement d'appoint des troubles suivants :
    - spasmes des muscles lissés associés à des troubles d'origine digestive : ulcère gastrique (de l'estomac) ou ulcère

duodénal (du duodénum), inflammation de la muqueuse  
gastrique, spasmes du sphincter (anneau musculaire) du  
car " ... dans le thorax inférieur ou inférieur de  
l'estomac ".  
**NO - SPA FORTE 80MG**  
du gros  
L'effet PERMÉANT LOT 1 CP 80

s de tension »  
ies ou crampes  
**ATIRE AVANT**

**Ne prenez jamais No-Spa forte comprimé :**

- si vous êtes allergique à la drotavérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique informations supplémentaires),

• si vous avez une maladie grave du foie, des reins

**Faites attention avec No-Spa forte comprimé :**  
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre No-Spa forte comprimé.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une tension artérielle basse (hypotension).

#### **Utilisation d'autres médicaments**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'utilisation simultanée de la drotavérine et de la lévodopa entraîne une diminution de l'effet de la lévodopa, à savoir l'atténuation des symptômes de la maladie de Parkinson, ainsi qu'une accentuation de la rigidité des muscles squelettiques et les tremblements.

## Grossesse et allaitements

**Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.**

#### **Grossesse :**

es études effectuées chez l'animal gravide et celles réalisées chez la femme enceinte n'ont pas mis en évidence d'effet délétère pour le fœtus ou pour la mère. Si vous êtes enceinte, votre médecin déterminera si l'utilisation de ce médicament est pertinente pour vous.

#### **Allaitement :**

**En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée durant l'allaitement.**

#### **Fertilité :**

aucune donnée n'est disponible concernant un éventuel effet sur la fertilité chez l'homme.

## **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

L'administration de No-Spa forte comprimé aux posologies habituelles n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas

# FLAGYL® 500 mg

Métronidazole

Comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILE ?

Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques antibactériens anti-parasitaires de la famille des nitro-5-imidazolés - code ATC : J01XD01 – P01AB01

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections à germes sensibles (bactéries, parasites).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ?

N'utilisez jamais FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au méthronidazole, à un médicament de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le méthronidazole) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ; • si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten); • si le patient est un enfant âgé de moins de 6 ans (voir Avertissements et précautions).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé.

### Mises en garde et précautions d'emploi

Avant d'utiliser FLAGYL, prévenez votre médecin si vous présentez :

- des troubles neurologiques, • des troubles psychiatriques, • des troubles sanguins, • des antécédents de méningites sous méthronidazole.

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par FLAGYL :

Dès la première dose, il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et soudaine (choo-anaphylactique, œdème de Quincke), se manifestant par les symptômes suivants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées, événements, ou vertiges lors du passage en position debout (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?). Si ces symptômes surviennent, arrêtez d'utiliser ce médicament car votre vie pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.

La survenue, en début de traitement, d'une rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules, et accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose exanthématoire aiguë généralisée (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?) ; prévenez votre médecin immédiatement car cela impose l'arrêt du traitement; cette réaction va contre-indiquer toute nouvelle administration de méthronidazole seul ou associé dans un même médicament à une autre substance active.

Il faut surveiller l'apparition potentielle ou l'aggravation de troubles nerveux comme une difficulté à coordonner des mouvements, un état de confusion, des convulsions, et une difficulté pour parler, pour marcher, des tremblements, des mouvements involontaires des yeux, ainsi que d'autres manifestations au niveau des mains et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, diminution de la sensibilité du toucher. Ces troubles sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement. Il est alors important d'interrompre le traitement et de consulter immédiatement votre médecin. (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?)

Des troubles du comportement à risque pour le patient peuvent survenir dès les premières prises du traitement, notamment en cas de troubles psychiatriques antérieurs. Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?).

neutre à forte dose et/ou de contrôler régulièrement par ne.

Si vous prenez ce médicament si de ce médicament peut e (recherche de tréponèmes)

lique aiguë, y compris des cas i syndrome de Cockayne ont zole.

101.101  
01/01/2028

FLAGYL 500 mg  
CP PEL B20

P.P.V : 49DH80



S 118000 060062

Si vous êtes atteint(e) du syndrome de Cockayne, votre médecin doit également surveiller votre fonction hépatique fréquemment pendant votre traitement par méthronidazole et après le traitement.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre le méthronidazole si vous présentez les symptômes suivants :

- mal de ventre, anxiété, nausées, vomissements, fièvre, malaise, fatigue, jaunisse, urines foncées, selles de couleur mastic ou démagrénois.

### Enfants

La prise de comprimé est contre-indiquée chez les enfants âgés de moins de 6 ans car il peut avaler le comprimé de travers et s'étouffer. Il existe d'autres présentations pharmaceutiques avec cet antibiotique adaptées au jeune enfant.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLAGYL 500 mg.

### Autres médicaments et FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Prévenez en particulier votre médecin si vous prenez :

- des médicaments contenant de l'alcool en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque,
- du busulfan (préconisé dans le traitement de certaines maladies du sang et dans la préparation à la greffe de moelle),
- du disulfiram (utilisé dans la prévention des rechutes au cours de l'alcool-dépendance).

### FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Evitez la prise de boissons alcoolisées durant ce traitement en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avise à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il convient d'éviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges, confusion, hallucinations, convulsions ou troubles de la vision attachés à l'emploi de ce médicament.

### FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé contient du gluten.

Ce médicament contient une très faible teneur en gluten (provenant de l'amidon de blé) et est donc peu susceptible d'entrainer des problèmes en cas d'une maladie coeliaque.

Un comprimé ne contient pas plus de 16,43 microgrammes de gluten.

Si vous avez une allergie au blé (différente de la maladie coeliaque), vous ne devez pas prendre ce médicament (voir rubrique \* N'utilisez jamais FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé \*).

### 3. COMMENT PRENDRE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ?

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.

La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique.

À titre indicatif, la posologie usuelle est :



Gélule  
Voie orale

# Relaxium<sup>®</sup> B6

Deva  
Pharmaceutique

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin ..... 260 mg  
équivalent en Magnésium ..... 150 mg

Vitamine B6 ..... 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin ..... 520 mg  
équivalent en Magnésium ..... 300 mg

Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin ..... 650 mg  
équivalent en Magnésium ..... 375 mg

Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

## PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## CAUCIONS D'EMPLOI

Pour éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Ne pas donner à des enfants.

Conserver dans un endroit sec et frais.

B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

LAXANT

LOT : 23G571

DLUO : 07/2026

99,00DH

Laboratoires Deva Pharmaceutique  
J.OUAIDI Pharmacien Responsable

Docteur Brahim Amzil  
Médecine Générale  
Cabinet Médical  
173, Rue Saint Laurent  
"Garage Allal" - Casablanca  
Tél. : 05 22 81 29 97 - Fax : 05 22 28 74 40

الدكتور البراهيم أمزيلا  
الطب العام  
العيادة  
173، زنقة سان لوران  
كراج عال - الدار البيضاء  
الهاتف : 05 22 81 29 97 - الفاكس : 05 22 28 74 40

Casablanca, le .....

9 . M. 2003

الدار البيضاء في

1<sup>me</sup> SAKRAM. Nalika.

urine

05/05/03 -

glycémie

Chol/TG / HDL / LDL

lipase

Dr. BRAHIM AMZIL  
LABORATOIRE KINETIC  
251, Rue Al Manattha OUDDEMAN JANE  
Casablanca - GSM: 0661 57 13 48  
06 57 28 02 30 - Tel: 0522 36 74 44

173, Rue Saint Laurent Casablanca  
MEDECINE GENERALE  
DR. BRAHIM AMZIL  
Tél: 0522 81 29 97 - Fax: 0522 28 74 40

# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LABO RACINE OULAD ZIANE


251, Rue Al mahatta (Ex la croix), Derb Manjra - Casablanca

Tél : 0522 367444 – Fax : 0522 399227, GSM : 0661571348 / 0657280230

E-mail: receptionlaboracine@gmail.com

R.C: 405132, IF: 14392949, Patente: 33600088, Identifiant commun n°00035908000087

CNSS n° 9393886, Banque : Banque populaire, Compte n° 2121117348690092, INPE n°093062107



0 9 3 0 6 2 1 0 7

**Dr. Larbi BENRAMDANE**

**Pharmacien - Biogiste**

Diplômé de Lyon I – France

Professeur de la Faculté de Médecine et  
de Pharmacie de RABAT

Ancien Pharmacien spécialiste des hôpitaux  
des FAR

Bactériologie - Biochimie - Hématologie

Immunologie - Mycologie - Parasitologie

Virologie

## FACTURE 2311102007

**Mme Malika OUKARAM**

Demande N° 2311102007

Date de l'examen : 10-11-2023

### Analyses :

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Clé	Coefficient
	Vitesse de sédimentation	B	30
	Triglycérides	B	50
	NF	B	80
	LDL Dosage direct	B	50
	Cholestérol HDL	B	50
	Glycémie à jeun	B	30
	Cholestérol	B	30
	Acide Urique	B	30
	ASAT (transaminase TGO)	B	50
	ALAT (transaminase TGP)	B	50
PSA	Prélèvement sang	E	25

**TOTAL DOSSIER : 450**

**Arrêtée la présente facture à la somme de : 745 DH**

مختبر التحاليل الطبية  
LABO RACINE OULAD ZIANE  
251, Rue Al Mahatta Derb Manjra  
Casablanca - GSM: 0661 57 13 48  
06 57 28 02 30 - Tel: 0522 36 74 44

**Docteur Larbi BENRAMDANE**

**Pharmacien - Biologiste**

Diplômé de Lyon 1 - France

Ancien Professeur de la faculté de médecine  
et de Pharmacie de RABAT

Ancien Pharmacien spécialiste des hôpitaux des FAR



**الدكتور العربي بنرمضان**

**صيدلي - إحيائي**

خريج ليون 1 - فرنسا

أستاذ بكلية الطب والصيدلة

بالرباط

صيدلي سابق متخصص بمستشفيات ق.م.م

**Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie**

Exploration Biologique Spécialisée des Lithiasés et des Cristaux Urinaires التسخيص البيولوجي المتخصص في حصى الكلى و الترسيبات البولية

Page 1/4

Code Patient : 2105112001

Date de naissance : 01-01-1942

Date d'édition : 10-11-2023



INPE : 0 9 3 0 6 2 1 0 7

Mme Malika OUKARAM

Réf : 2311102007

Prescripteur : Dr Brahim AMZIL

Date/heure de prélèvement : 10-11-2023 08:37

## HEMATOLOGIE

### **NUMERATION FORMULE SANGUINE (SYSMEX XS-1000i)**

#### NUMERATION GLOBULAIRE

Hématoïdes :	<b>4.69</b>	M/mm <sup>3</sup>
Hémoglobine :	<b>13.90</b>	g/dl
Hématocrite :	<b>42.20</b>	%
VGM :	<b>90.0</b>	fL
TCMH :	<b>29.6</b>	pg
CCMH :	<b>32.9</b>	g/dl

**Normales  
(Mme 81 ans)**

**Antériorités**

**24-07-2023**

(3.84-5.12)	4.79
(12.50-15.50)	13.90
(35.00-45.00)	43.10
(83.0-97.0)	90.0
(27.5-33.2)	29.0
(31.9-35.9)	32.3

#### FORMULE LEUCOCYTAIRE

P. Neutrophiles :	<b>60.00</b>	%	<b>4 060</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>(1 600-5 900)</b>	4 810
P. Eosinophiles :	<b>1.90</b>	%	<b>130</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>(40-520)</b>	150
P. Basophiles :	<b>0.70</b>	%	<b>50</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>(0-90)</b>	40
Lymphocytes :	<b>30.30</b>	%	<b>2 050</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>(1 100-4 000)</b>	2 470
Monocytes :	<b>7.10</b>	%	<b>480</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>(170-560)</b>	540
Leucocytes :	<b>100</b>	%	<b>6 770</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>(3 800-10 000)</b>	8 010

#### NUMERATION DES PLAQUETTES

Plaquettes :	<b>304 000</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>(150 000-379 000)</b>	296 000
--------------	----------------	------------------	--------------------------	---------

مختبر التحاليل الطبية  
LABO RACINE OULAD ZIANE  
251, Rue Al Mahatta Derb Manjra  
Casablanca - GSM: 0661 57 13 48  
06 57 28 02 30 - Tél: 0522 36 74 44

**Docteur Larbi BENRAMDANE**

**Pharmacien - Biologiste**

Diplômé de Lyon 1 - France

Ancien Professeur de la faculté de médecine  
et de Pharmacie de RABAT

Ancien Pharmacien spécialiste des hôpitaux des FAR



**الدكتور العربي بن رمضان**

**صيدلي - إحيائي**

خريج ليون 1 - فرنسا

أستاذ بكلية الطب و الصيدلة

بالرباط

صيدلي سابق متخصص بمستشفيات ق.م.م

**Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie**

Exploration Biologique Spécialisée des Lithiasés et des Cristaux Urinaires التسخيص البيولوجي المتخصص في حصى الكلى والترسبات البولية

**2311102007 – Mme Malika OUKARAM**

Page 2/ 4

**Observation :**

**VITESSE DE SEDIMENTATION**

westgreen-humased 100 mix

VS 1heure :

12 mm

39

**Références :**

	Femme	Homme
<60 ans	Vs < 20mm	Vs < 15mm
>60 ans	Vs < 25mm	Vs < 20mm

**BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE**

(AUTOMATE BECKMAN COULTER AU 480)

24-07-2023

**Glycémie à jeun**

(Méthode Enzymatique-Colorimétrique)

2.58 g/L  
14.32 mmol/L

(0.70-1.10)  
(3.89-6.11)

1.93

**Acide urique**

(Méthode Enzymatique Colorimétrique)

56.92 mg/L  
338.67 µmol/L

(25.00-60.00)  
(148.75-357.00)

53.70

24-07-2023

مخبر التحاليل الحيوانية  
DA Larbi BENRAMDANE  
LABO RACINE OULAD ZIANE  
251, Rue Al Mahatta Derb Manira  
Casablanca GSM: 0661 57 13 44  
06 57 28 02 90 / Tel: 0522 36 74 44

251, Rue Al Mahatta Derb Manira - Casablanca

Tél : 05 22 36 74 44 - Fax : 05 22 39 92 27 - Mobile : 06 61 57 13 48 / 06 57 28 02 30

laboracine oulad ziane - E-mail : receptionlaboracine@gmail.com - Google : @Laboracine

**Docteur Larbi BENRAMDANE**

**Pharmacien - Biologiste**

Diplômé de Lyon 1 - France

Ancien Professeur de la faculté de médecine  
et de Pharmacie de RABAT

Ancien Pharmacien spécialiste des hôpitaux des FAR



**الدكتور العربي بنرمضان**

**صيدلي - إحيائي**

خريج ليون 1 - فرنسا

أستاذ بكلية الطب و الصيدلة

بالرباط

صيدلي سابق متخصص بمستشفيات ق.م.م

**Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie**

Exploration Biologique Spécialisée des Lithiasés et des Cristaux Urinaires التسخيص البيولوجي المتخصص في حصى الكلى والترسبات البولية

**2311102007 – Mme Malika OUKARAM**

Page 3/4

**Bilan lipidique (E.A.L)**

**Aspect du sérum :**

Normal

24-07-2023

**Triglycérides**

(Méthode Enzymatique Colorimétrique)

1.10 g/L (<<1.50)  
1.25 mmol/L (<1.71)

1.40

24-07-2023

**Cholestérol total**

(Méthode Enzymatique-Colorimétrique)

1.40 g/l (<<2.00)  
3.61 mmol/L (<5.16)

1.60

24-07-2023

**HDL-Cholestérol**

(Méthode Enzymatique-Colorimétrique)

0.53 g/L (>0.50)  
1.37 mmol/L (>1.29)

0.60

24-07-2023

**LDL-Cholestérol**

(Méthode Enzymatique-Colorimétrique)

0.65 g/L (<1.60)  
1.68 mmol/L (<4.14)

0.72

Selon les recommandations HAS 2017 :

En cas de LDL - C > 1.60 g/L (4.1 mmol/l), une modification du mode de vie est recommandée,

Suivi d'un contrôle médical, avec une prise en charge éventuelle selon le risque cardiovasculaire :

Risque faible LDL-C < 1.9 g/L

Risque modéré LDL-C < 1.3 g/L

Risque élevé LDL-C < 1.0 g/L

Risque très élevé LDL-C < 0.7 g/L

مخبر التحاليل الطبية  
LABO RACINE OULAD ZIANE  
251, Rue Al Mahatta Derb Manjra  
Casablanca - GSM : 06 61 57 13 48 / 06 57 28 02 30  
06 57 28 02 30 - Tél: 0522 36 14 42  
Dr. Larbi BENRAMDANE  
J.B.

**Docteur Larbi BENRAMDANE**

**Pharmacien - Biologiste**

Diplômé de Lyon 1 - France

Ancien Professeur de la faculté de médecine  
et de Pharmacie de RABAT

Ancien Pharmacien spécialiste des hôpitaux des FAR



**الدكتور العربي بن رمضان**

**صيدلي - إحيائي**

خريج ليون 1 - فرنسا

أستاذ بكلية الطب والصيدلة

بالرباط

صيدلي سابق متخصص بمستشفيات ق.م.م

**Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie**

Exploration Biologique Spécialisée des Lithiases et des Cristaux Urinaires التسخيص البيولوجي المتخصص في حصى الكلى و الترسيات البولية

**2311102007 – Mme Malika OUKARAM**

Page 4 / 4

## **BILAN HEPATIQUE**

24-07-2023

**Transaminases GPT (ALAT)**  
(Méthode Enzymatique-Cinétique)

24.6 UI/L (<35.0) 16.7

**Transaminases GOT (ASAT)**  
(Méthode Enzymatique-Cinétique)

16.0 UI/L (<35.0) 14.0

مخبر التحاليل الطبية  
LABO RACINE OULAD ZIANE  
251, Rue Al Mahatta Derr Manja  
Casablanca - GSM: 06 57 28 02 30 - Tel: 0522 36 74 44  
06 57 28 02 30 - Tel: 0522 36 74 44  
Dr Larbi BENRAMDANE