

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-789474

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) : 3465

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

KACHT YAMINA

Date de naissance :

01 01 1959

Adresse :

N° 2 RUE 962 SALAM AGADIR

Tél. :

06 62 11 07 48

Total des frais engagés : 20336

Dhs

Cadre réservé au Médecin

دكتور مستنصر زهير
Dr. MOUSTADRAF Zouhair
Spécialiste en Endocrinologie
'Diabétoologie et Nutrition
57, Rue de Marrakech (Q.I.) AGADIR

Cachet du médecin :

Date de consultation :

21/09/2023

Nom et prénom du malade :

KACHT YAMINA

Age : 1959

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

DYSMTHY, LOI DIF

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : AGADIR

Le : 22/09/2023

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie

N° W21-789474

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/09/2013	C		1000.00	INP : 04111145370 الدكتور مصطفى زهير Dr. MOUSTAFA ZOUHAIR Spécialiste en Endocrinologie 'Diabétologie et Nutrition 81, Rue de Marrakech (01.1) AGADIR

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie RAJAA Dr. Belkacem EL MARZOUDI N° 13 Rue Abderrahmane Ben Zidane Hay Essalam - AGADIR Tél. : 05 28 23 22 22	22/09/23	1583,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant **l'anamnèse** des soins

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
			INT: 
			COEFFICIENT DES TRAVAUX
			MONTANTS DES SOINS
			DEBUT D'EXECUTION
			FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel. Thérapeutique nécessaire à la profession

The diagram illustrates the H-B-C-D-H ring system. It consists of two fused rings: an upper five-membered ring (B, C, D, H, H) and a lower six-membered ring (B, C, D, H, H, H). The atoms are arranged as follows: the upper ring has B at the bottom, C at the top-left, D at the top, and H atoms at the top-right and bottom-right. The lower ring has B at the bottom, C at the top-left, D at the top, and H atoms at the top-right, bottom-right, and bottom. Arrows indicate electron flow: a clockwise arrow in the upper ring and a counter-clockwise arrow in the lower ring. Each atom is labeled with a number: the upper ring has B (1), C (2), D (3), H (4), and H (5); the lower ring has B (6), C (7), D (8), H (9), H (10), and H (11). The entire system is centered on a horizontal axis with arrows pointing left and right, and a vertical axis with arrows pointing up and down.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'ENTRETIEN

INTP: 

COEFFICIENT DES TRAVAILX

MONTANT DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

AN D'EXECUTIO

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

Dr. Moustadraf Zouhair

Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition

Sur Rendez-vous

الدكتور مستضف زهير

أخصائي في أمراض الغدد
داء السكري و التغذية

باطموعد

Agadir, Le :

22/09/23

Mr. Kacht Yamma

13. 10/09/23 Lenstelyrox 50mg 1cv 3mg

6. 10/09/23 Lenstelyrox 25mg 1cv 3mg

10/09/23 Algixene 100mg 1cv 2mg

32. 10/09/23 Eucabam 1-1-1

11. 10/09/23 Polipropane 100mg 1-1-1

139. 10/09/23 Dolicripte 100mg 1-1-1

13. 10/09/23 Relaxum 375mg 1cv 10mg

23. 10/09/23 Abrix 100mg 1cv 10mg

84. 10/09/23 Zetubax 100mg 1cv 10mg

26. 10/09/23 Alcantil 200mg 1cv 10mg

79. 10/09/23 CurAles 200mg 1cv 10mg

24. 10/09/23 Medacarel 100mg 1cv 10mg

RDV Le :

57. 05 28 84 82 83 - 06 24 19 11 00 . المي الصناعي، أكادير - الهاتف :

57, rue Haj Akhenouch, (Ex Rue de Marrakech) - Q.I Agadir - Tél. 05 28 84 82 83 - 06 24 19 11 00

Pharmacie RAJAA
Dr. Belkacem EL MARZOUI
N° 13 Rue Abderrahmane Ben Zidane
Haj Essalam - AGADIR
Tél. : 05 28 23 56 70

57. 05 28 84 82 83 - 06 24 19 11 00 . المي الصناعي، أكادير - الهاتف :

57, rue Haj Akhenouch, (Ex Rue de Marrakech) - Q.I Agadir - Tél. 05 28 84 82 83

32.60 Proxyl 1cs 3x)



31.60 Perogue 1unid (ap)

80.10 Xyphal 1ct x 1g

A·S
Dr MOUSTADRAF Zouhail
Endocrinologist
57, Rue Ouhaj Akhenouch (Ex Marrakech)
AGADIR - Tél: 05 28 84 82 83

183.60

Pharmacie RAJAA
Dr. Belkacem EL MARZOUI
N° 13 Rue Abderrahmane Ben Zidane
Hay Essalam - AGADIR
Tél. : 05 28 23 56 70

خلال فترة الحمل، لا يستعمل
مضاد لإفراز الغدة الدرقية في علاج فر
احتياطات الاستعمال؛ تحذيرات خاصة
تحذيرات واحتياطات

بشكل عام ، يجب أن يكون العلاج تحت مراقبة سريرية و ببولوجية من قبل الطبيب. أخبر طبيبك عن مرض قديم أو مرض حدث أثناء العلاج ، بما في ذلك: في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب ، الذبحة الصدرية ، اضطراب نظم قلبي) ، أو ارتفاع ضغط الدم ، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوى على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند المرضى الذين يعانون من التعبق الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز.

6 118001 102013
 Levothyrox® 50µg,
 Comprimés sécables B/30
 PPV: 13,40 DH

محمد بن العباس المصايبات يقصور الغ



خلال فترة الحمل، لا يستعمل
مضاد لإفراز الغدة الدرقية في علاج فر
احتياطات الاستعمال؛ تحذيرات خاصة
تحذيرات واحتياطات

شكل عام ، يجب أن يكون العلاج تحت مراقبة سريرية وبيولوجية من قبل الطبيب. أخبر طبيبك عن مرض قديم أو مرض حدث أثناء العلاج ، بما في ذلك: في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب ، الذبحة الصدرية ، اضطراب نظم قلبي) ، أو ارتفاع ضغط الدم ، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباهٍ و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوى على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند
المرضى الذين يعانون من التعبق الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز
أ. الملاكتوز (الماء، زبدة، السكر، زبدة نارنجية)

لـ خـالـلـ فـتـرـةـ عـلـاجـكـ مـعـ
ـ،ـ فـلـانـ طـبـيـكـ قـدـ طـبـ مـنـكـ
ـالـبـيـلـوـجـيـةـ الـإـضـافـيـةـ (ـقـيـاسـ
ـدـةـ الـدـرـقـيـةـ،ـ وـ إـذـاـ كـنـتـ مـصـابـ
ـ،ـ إـذـاـ كـنـتـ كـبـيرـ فـيـ السـنـ أـوـ إـذـاـ
ـسـورـ (ـمـرـسـ وـرـيـهـ سـرـرـهـ)ـ.

امتحان دسن اليأس المصابات بقصور الغ



خلال فترة الحمل، لا يستعمل
مضاد لإفراز الغدة الدرقية في علاج فر
احتياطات الاستعمال؛ تحذيرات خاصة
تحذيرات واحتياطات


شكل عام ، يجب أن يكون العلاج تحت مراقبة سريرية وبيولوجية من قبل الطبيب. أخبر طبيبك عن مرض قديم أو مرض حدث أثناء العلاج ، بما في ذلك: في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب ، الذبحة الصدرية ، اضطراب نظم قلبي) ، أو ارتفاع ضغط الدم ، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوى على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند
المرضى الذين يعانون من التعبق الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز
أ. الملاكتوز (الماء، زيت زيتون، زيت نارنجية)

لـ خـالـلـ فـتـرـةـ عـلـاجـكـ مـعـ
ـ،ـ فـلـانـ طـبـيـكـ قـدـ طـبـلـ مـنـكـ
ـالـبـيـلـوـجـيـةـ الـإـضـافـيـةـ (ـقـيـاسـ
ـدـةـ الـدـرـقـيـةـ،ـ وـ إـذـاـ كـنـتـ مـصـابـ
ـ،ـ إـذـاـ كـنـتـ كـبـيرـ فـيـ السـنـ أـوـ إـذـاـ

امحمد بن الياس المصايبات بقصور الغ



لمرض

فِي حَالَةِ مُتَلَاقِيَّةٍ

الفالية الحاد (حوث التهاب في البر الرئوي)
يشكل عام لا يجوز استعمال هذا الدواء
خلاف ذلك، في بعض الامراض القلبية
الشريان التاجي (امر اض الاوعية الدموية المرنة
واضطرابات نضم القلب)

خلال فترة الحمل، لا يستعمل أشتراك الليفوتيروكسين ودواء مضاد لإفراز الغدة الدرقية في علاج فرط التدفق. احتياطات الاستعمال؛ تذيرات خاصة تحذيرات واحتياطات

شكل عام، يجب أن يكون العلاج تحت مراقبة سريرية وبيولوجية من قبل الطبيب. اخبر طبيك عن مرض قيم أو مرض حدث أثناء العلاج، بما في ذلك: في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذمة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات). في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضي بانتباه شكل خاص.

شكل خاص . هذا الدواء يحتوى على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند المرضى الذين يانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). خالق قترة علاجك مع ، فإن طبيبك قد يطلب منك بيولوجية الإضافية (قياس الدرقية، وإذا كنت مصابة بـ ارتفاع السكر في الدم أو إذا كنت مصابة بـ ارتفاع الكوليسترول في الدم).

4. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الاثار غير المرغوبية
من جميع الادوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب
اثر جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
متاخر من قبلي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات
نظم)

نظم) علام فرط التدفق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتجاراة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال): في هذه الحالة، استشارة طبيبك، عند الـ ١٤، كآن، زنادة معدل الكالسيوم في البول (كمية

الحاله استشاره طبيه، عند الامكانيه زياده معدل الكالسيوم في البول (كميه كبيه من الكالسيوم في البول)، مرد فحص ماسهيه متحمله (فرط التحسس) العلامات و الآثار الشيوعي هى : طفح جدي، حكة، إنفاخ في الرقبه والرجل، يعويه في التنفس و احمرار.

الابرار عن ملائكته:

فِيَهُ إِذَا كُنْ لَدِيَ أَثْرٌ غَيْرُ مُرْغُوبٍ،
أَمْ)، هَذِهِ يَنْتَهِي إِلَى أَيِّ أَثْرٍ

فقط اذا كان لـ اي امر غير مرغوب،
ـ هذين ينبعان على اي امر

لمرض

في حالة متلازمة

القلبي الحاد (حدوث التهاب في البر

يشكل عام لا يجوز استعمال هذا الدو

خلاف ذلك، في بعض الأمراض القلبية

الشريان التاجي (أمر اض الأوعية الدموية المرو

واضطرابات نضم القلب

ثانية و غيرها من الأدوية

4)، قد تحدث في بضعة ساعات أو تتأخر ببضعة أيام.

تعليمات في حال نسيان جرعة واحدة أو عدة جرعات

إذا نسيت أحد ليفوتيروكس، قرص قبل القطع :

إذا غيّبت جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي

فانتك.

إذا غيّبت عدة جرعات، اتصل طبيبك.

إذا كان لديك أي أستهلاك حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد

من المعلومات من طبيبك أو الصيدلي.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

لجميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قبل القطع ، قد يسبب

أث جانبيّة، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع

متناقض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات

نظم)

علام فرط التدفق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة،

ارتفاع درارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه

الحالة، استشارة طبيبك،

عند الماء، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية

كثيرة من يوم في البول)،

مردود في مسامية متحمّلة (فرط التهيج) العلامات و

الأعراض شبيهها هي: طفح جدي، حكة، إنتفاخ في

الرقبة والوجه، انسداد في التنفس و احرار

الابال عن الاستمناء:

إذا كان لدى اثّر غير مرغوب،

هذا ينبع على أي اثّر

خلال فترة الحمل، لا يستعمل اشتراك الليفوتيروكسين و دواء مضاد لإفراز الغدة الدرقية في علاج فرط التدفق.

احتياطات الاستعمال ، تحذيرات خاصة

تحذيرات و احتياطات

يشكل عام، يجب أن يكون العلاج تحت مراقبة سريرية و ببولوجية من قبل الطبيب. اخبر طبيبك عن مرض قيم أو مرض حدث أثناء العلاج ، بما في ذلك:

في حالة الإصابة بامراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة شرائين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،

في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوى على الالاكتوز، لا ينصح استخدامه عند المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص الالاكتوز أو الجلاكتوز أو وراثية نادرة).

خلال فترة علاجك مع ، فإن طبيبك قد يطلب منك ببولوجية الإضافية (قياس الدرقية، وإذا كنت مصاب إذا كنت كبير في السن أو إذا



الأس المصابات بقصور الغدة الدرقية

هذا ينبع على أي اثّر

pevagine®

Nitrate d'Econazole

Composition :

Produits Composition	PEVAGINE® Ovule	PEVAGINE® Crème
Nitrate d'Econazole	150 mg	1 g
Excipients q.s.p	1 ovule	100 g

Propriétés :

Nitrate d'Econazole est un dérivé imidazolé à action antifongique possédant un spectre d'action extrêmement large : il est actif, *in vitro* sur pratiquement tous les champignons pathogènes ainsi que sur les bactéries gram positif.

Indications :

Pevagine est indiqué dans le pityriasis versicolor, les candidoses, les dermatophytoses de la peau glabre et des plis.

Pevagine ovules est indiqué dans le traitement des mycoses vaginales, surinfectées ou non par des bactéries.

Son activité sur les bactéries gram+ en indique l'usage en monothérapie dans les dermatomycoses surinfectées.

Contre-indications :

Hypersensibilité au nitrate d'econazole.

Effets indésirables :

Rares: sensation de brûlures, prurit et rougeur.

Posologie :

- Crème dermique :

application matin et soir en massage doux jusqu'à absorption.

- Ovules gynécologiques :

1 Ovule à introduire profondément dans le vagin.

Présentations :

- Crème dermique : tube de 30 g à 1% en nitrate d'econazole.

- Ovules gynécologiques : boîte de 3 ovules de 150mg.

Crème: A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ovules: A conserver à une température inférieure à 25°C.

31,60

PEVAGINE 1% Crème
Tube de 30g



611800090571

A 20232 FX

Zetalax DM® Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif. Les ingrédients contenus dans le microlavement garantissent le ramollissement et la lubrification de la masse fécale, ce qui permet ensuite une expulsion rapide des matières fécales.

Mode d'emploi :

- Ouvrir l'emballage
- Enlever le bouchon du microlavement et lubrifier la canule avec une goutte de produit
- Introduire délicatement la canule dans le rectum, sans presser le tube
- Appuyer à fond sur le microlavement
- Extraire la canule sans relâcher la pression sur le tube, pour ne pas aspirer à nouveau le liquide

⚠ Lire la notice avant utilisation. Conserver hors de portée des enfants.

Dispositif médical classe 1. Autorisation ministère de la santé n° : 860/16116/2016/ DMP/20/DM

Fabricant
Zeta Farmaceutici S.p.A.
Via Galvani, 10
Sandriguo (VI)
ITALY

Importé au Maroc par :
Laboratoires ITCOS
N°109 Q.I sidi ghanem
40000 MARRAKECH

Distribué au Maroc par :
MEDIPRO Pharma
100, rue Brahim Annakhai.
20370 - Casablanca -



Validité 5 ans
La date de péremption se réfère
au produit intégré,
conservé correctement.



Lot : 040
À utiliser de
préférence avant le : 05/2027

PPC : 84,50 DH

XYZALL® 5 mg, comprimé pelliculé
Dichlorhydrate de lévocétirizine
Boîtes de 14 ou de 28
Adultes et enfants à partir de 6 ans

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Antihistaminiques à usage systémique, dérivés de la pipérazine, code ATC: R06AE09

Le dichlorhydrate de lévocétirizine est la substance active de XYZALL.

XYZALL est un médicament utilisé dans le traitement de l'allergie.

XYZALL est indiqué pour le traitement des symptômes associés à :

- la rhinite allergique (incluant la rhinite allergique persistante) ;
- des démangeaisons et rougeurs (urticaire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A VOIR AVANT DE PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une allergie, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé si :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au dichlorhydrate de lévocétirizine, à l'hydroxyzine ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale) ou une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si :

Si vous êtes susceptible de ne pas pouvoir vidanger correctement (par exemple, si vous avez une lésion de la moelle épinière ou d'une augmentation de la pression intracrânienne), veuillez demander conseil à votre médecin.

Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous présentez des crises d'épilepsie, demandez conseil à votre médecin, l'utilisation de XYZALL peut entraîner une aggravation des crises.

Si vous avez prévu de faire des tests d'allergie, informez le laboratoire qui effectue le test. Vous devez arrêter de prendre XYZALL pendant au moins 48 heures avant le test, car ce médicament peut affecter les résultats de vos tests.

AVANT DE PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé

XYZALL® 5 mg
Boîte de 28 comprimés pelliculés
AMM N° 2218DMP/21/NRQDNM



6 118000 0215aa

LOT 221829 2

EXP 05 2026

PPV 30 10

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 8 à 10 jours.

1. QU'EST-CE QUE BROXYL 0,3 %, SOLUTION BUVABLE, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Mucolytiques, code ATC : R05CB06 (R: Système respiratoire).

Indications thérapeutiques :

Traitements des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques. Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BROXYL 0,3 %, SOLUTION BUVABLE?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais BROXYL 0,3 %, solution buvable:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indiqué chez le nourrisson de moins de 2 ans.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien ou votre infirmier avant de prendre BROXYL 0,3%, solution buvable édulcorée au sorbitol.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

- Des cas de réactions cutanées graves ont été signalés à l'administration d'Ambroxol. Si une éruption apparaît sur votre corps (comprise des lésions des muqueuses, par exemple au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des yeux, des organes génitaux), ne prenez BROXYL 0,3 %, solution buvable et contactez immédiatement votre médecin.
- Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif médicamenteux asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Ce médicament ne doit pas être pris par des patients présentant des problèmes rares d'intolérance au fructose (maladie héréditaire). Ce médicament contient du « parahydroxybenzoate de méthyle propyle » et peut provoquer des réactions allergiques.

En raison de la présence de sorbitol et de glycérine, ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhées).

Interactions avec d'autres Médicaments
Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez récemment pris ou pourriez prendre ce médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement et fertilité

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul saura vous conseiller.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE BROXYL 0,3 %, SOLUTION BUVABLE?

Posologie :

- Chez l'adulte : Posologie usuelle : 1 flacon de 250 ml par jour.
- Chez l'enfant : - Plus de 5 ans : 1 cuillère à soupe (50 ml) par jour.
- 2 à 5 ans : 1/2 cuillère à soupe (25 ml) par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalles réguliers.

Durée de traitement

La durée du traitement ne dépasse pas 10 jours.

Si vous avez pris plus de BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Consultez immédiatement votre médecin.

Si vous oubliez de prendre BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas nécessairement chez tous les patients.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 8 à 10 jours.

1. QU'EST-CE QUE BROXYL 0,3 %, SOLUTION BUVABLE, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Mucolytiques, code ATC : R05CB06 (R: Système respiratoire).

Indications thérapeutiques :

Traitements des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques. Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BROXYL 0,3 %, SOLUTION BUVABLE?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais BROXYL 0,3 %, solution buvable:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indiqué chez le nourrisson de moins de 2 ans.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien ou votre infirmier avant de prendre BROXYL 0,3%, solution buvable édulcorée au sorbitol.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

- Des cas de réactions cutanées graves ont été signalés à l'administration d'Ambroxol. Si une éruption apparaît sur votre corps (comprise des lésions des muqueuses, par exemple au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des yeux, des organes génitaux), ne prenez BROXYL 0,3 %, solution buvable et contactez immédiatement votre médecin.
- Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif médicamenteux asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Ce médicament ne doit pas être pris par des patients présentant des problèmes rares d'intolérance au fructose (maladie héréditaire). Ce médicament contient du « parahydroxybenzoate de méthyle propyle » et peut provoquer des réactions allergiques.

En raison de la présence de sorbitol et de glycérine, ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhées).

Interactions avec d'autres Médicaments
Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez récemment pris ou pourriez prendre ce médicament.

Sans objet.

Grossesse et allaitement et fertilité

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul saura vous conseiller.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE BROXYL

Posologie :

- Chez l'adulte : Posologie usuelle : 1 flacon de 250 ml par jour.
- Chez l'enfant : - Plus de 5 ans : 1 cuillère à soupe (50 ml) par jour.
- 2 à 5 ans : 1/2 cuillère à soupe (25 ml) par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalles réguliers.

Durée de traitement

La durée du traitement ne dépasse pas 10 jours.

Si vous avez pris plus de BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Consultez immédiatement votre médecin.

Si vous oubliez de prendre BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas nécessairement chez tous les patients.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre infirmier.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables,

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 8 à 10 jours.

1. QU'EST-CE QUE BROXYL 0,3 %, SOLUTION BUVABLE, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Mucolytiques, code ATC : R05CB06 (R: Système respiratoire).

Indications thérapeutiques :

Traitements des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques. Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BROXYL 0,3 %, SOLUTION BUVABLE?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais BROXYL 0,3 %, solution buvable:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indiqué chez le nourrisson de moins de 2 ans.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien ou votre infirmier avant de prendre BROXYL 0,3%, solution buvable édulcorée au sorbitol.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

- Des cas de réactions cutanées graves ont été signalés à l'administration d'Ambroxol. Si une éruption apparaît sur votre corps (comprise des lésions des muqueuses, par exemple au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des yeux, des organes génitaux), ne prenez BROXYL 0,3 %, solution buvable et contactez immédiatement votre médecin.
- Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif médicamenteux asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Ce médicament ne doit pas être pris par des patients présentant des problèmes rares d'intolérance au fructose (maladie héréditaire). Ce médicament contient du « parahydroxybenzoate de méthyle propyle » et peut provoquer des réactions allergiques.

En raison de la présence de sorbitol et de glycérine, ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhées).

Interactions avec d'autres Médicaments
Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez récemment pris ou pourriez prendre ce médicament.

Sans objet.

Grossesse et allaitement et fertilité

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul saura vous conseiller.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE BROXYL

Posologie :

- Chez l'adulte : Posologie usuelle : 1 flacon de 250 ml par jour.
- Chez l'enfant : - Plus de 5 ans : 1 cuillère à soupe (50 ml) par jour.
- 2 à 5 ans : 1/2 cuillère à soupe (25 ml) par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalles réguliers.

Durée de traitement

La durée du traitement ne dépasse pas 10 jours.

Si vous avez pris plus de BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Consultez immédiatement votre médecin.

Si vous oubliez de prendre BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre BROXYL 0,3 %, solution buvable :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas nécessairement chez tous les patients.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre médecin.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre infirmier.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables,

Madécassol®

Onguent et poudre

COMPOSITION :

Onguent

Extrait titré de Centella asiatica* 1g
Excipient : qsp 100g

Conserver à l'abri de la chaleur.

Poudre

Extrait titré de Centella asiatica* 2g
Excipient : qsp 100g

* Acides madécassique et asiatique, asiaticoside.

INDICATIONS : utilisé :

- En traitement local d'appoint des ulcères des jambes d'origine veineuse, au stade de bourgeonnement, après détersion et antisepsie ;
- En massage dans les cicatrices fibreuses et hypertrophiques ;
- A titre d'appoint dans les plaies chirurgicales et brûlures légère à petite étendue.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité aux composants

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Formes non adaptés à l'usage ophtalmique ;

Onguent : Eviter l'utilisation sur des lésions qui ont

Poudre : - Réservée aux lésions suintantes ;
- Ne pas utiliser sur des plaies profonde

EFFETS INDESIRABLES :

Possibilités de réactions cutanées de sensibilisation

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Détersion et désinfection de la plaie avant app


Application d'onguent ou de poudre selon les

Présentation :

- Onguent à 1% : Tubes de 10g et 30g.

- Poudre à 2% : Flacon de 10g.

58119230
C21005



Madécassol® 1%
tube 10 g



CurAler®

Solution buvable

CONSEILS D'UTILISATION :

- Le flacon est muni d'un gobelet doseur gradué.
Agiter avant utilisation.
- Enfants de 3 à 6 ans : 7,5 ml 2 fois par jour.
- Enfants de 6 à 12 ans : 10 ml 2 fois par jour.
- Adultes : 10 ml 3 à 4 fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- En cas de prise d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires, consultez votre médecin avant de prendre le produit.
- Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.
- Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources directes de chaleur.
- Doit être utilisé dans le cadre d'un mode de vie sain et d'une alimentation équilibrée.
- Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Produit par ERBOZETA SPA Strada delle Ariole, 41/43, 47894 - Chiesanuova (RSM) importé et distribué au Maroc par Thérapharm 10, rue Annakhal - 20370 Casablanca

Authorisation du Ministère de la Santé n° : 20202002384DMP/20UCA/v1

150 ml e 



CurAler®

Solution buvable

COMPOSITION :

Fructose, Miel, Eau déminéralisée, Macérats glycérinés de : Bourgeons de Cassis, Jeunes pousses de l'Eglantier, Bourgeons de Charme, de Ginkgo Biloba, l'Aulne noire, Extrait sec de feuilles d'Ortie, Extrait sec déglycérisé de racine de Régisso, Extrait sec de feuilles de Menthe poivrée, régulateur d'acidité : acide malique, conservateur : sorbate de potassium.

PROPRIÉTÉS :

CurAler® Solution buvable est à base d'un complexe de macérats glycérinés de bourgeons de Cassis, d'Eglantier, d'Aulne noire, de Ginkgo ainsi que d'autres actifs naturels qui s'associent parfaitement pour contribuer à un meilleur confort respiratoire tout en renforçant les défenses naturelles de l'organisme.

Ingrediénts	Dosage/ 40 ml
Cassis (m.g)*	1,3 g
Eglantier (m.g)*	750 mg
Charme (m.g)*	375 mg
Ginkgo (m.g)*	375 mg
Aulne noir (m.g)*	200 mg
Ortie (extrait sec)	375 mg
Régisso e.s. déglycérisé titrée <2% Acide Glycerique	200 mg
Menthe (extrait sec) titrée à 4% d'huile essentielle	200 mg 8 mg

*m.g : macérat glycériné

SANS GLUTEN - SANS LACTOSE


EZ 00.69.50



*Bien-être
respiratoire*

Flacon 150 ml

Thérapharm
LABORATOIRES


6 111261 640066

Lot : UT488
A consommer de préférence avant le : 09/2024
PPC : 79,50 DH

ALGANTIL® (IBUPROFENE)

PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS :

- Dragées à 200 mg : boîte de 20 dragées
- Comprimés effervescents à 200 mg : boîtes de 10 et 20 comprimés
- Suspension buvable pédiatrique à 2 % : flacon de 150 ml
- Suppositoires dosés à 250 mg : boîte de 10 suppositoires.

COMPOSITION :

Dragées		200 mg par dragée
Ibuprofène		q.s.p. 1 dragée
Excipient		
Comprimés effervescents		
Ibuprofène		200 mg par comprimé effervescent
Excipient		q.s.p. 1 comprimé effervescent
Suspension buvable pédiatrique		
Ibuprofène		2 g pour 100 ml
Excipient		q.s.p. 100 ml de suspension buvable
Suppositoires		
Ibuprofène		250 mg par suppositoire
Excipient		q.s.p. 1 suppositoire

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Analgesique et antipyretique.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Dragées, comprimés effervescents et suppositoires

Adultes et enfants de plus de 12 ans :

- Ce médicament contient de l'ibuprofène qui est un anti inflammatoire non stéroïdien. Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg (soit environ 12 ans) dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que :
 - Maux de tête
 - États grippaux
 - Douleurs dentaires
 - Règles dououreuses
 - Douleurs et fièvre accompagnant les syndromes O.R.L.
 - Crise de migraine légère à modérée avec ou sans aura
 - Douleurs rhumatismales
 - Douleurs traumatiques musculaires ou tendineuses
 - Douleurs post-opératoires en chirurgie dentaire

Suspension buvable pédiatrique

Elle est indiquée chez le nourrisson et l'enfant de 3 mois à 12 ans (40 kg) dans :

- Le traitement de la fièvre et/ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures
- Le traitement symptomatique de l'arthrite chronique juvénile

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de ce produit,
- Ulcère de l'estomac ou duodénum en évolution,
- Maladie grave du foie,
- Maladie grave des reins,
- Maladie grave du cœur
- Lupus érythémateux disséminé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE

MISSES EN GARDE

Adulte - Enfant de plus de 12 ans :

Chez l'adulte, ne pas dépasser la dose maximale de 1200 mg/jour.

Une dose supérieure peut provoquer des inconvenients parfois graves qui sont ceux

Nourrisson - Enfant :

En cas de douleurs et/ou fièvre, ne pas dépasser la dose maximale de 30 mg/kg/j pour les parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas :

- d'un antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un antécédent d'asthme.
- de traitement anticoagulant concomitant. Ce médicament peut entraîner des malaises et des saignements.
- d'antécédents digestifs (hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou duodénum, maladie du cœur, du foie ou du rein).
- de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : ibuprofène, vous n

contenez pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou l'aspirine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS

COMPOSANTS, Y COMPRIS L'ASPIRINE ET SES DÉRIVÉS, DE L'HÉPARINE

OU D'AUTRES MÉDICAMENTS. SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée), si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée).

L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée),

les enfants peuvent avoir des conséquences graves notamment si

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de

adaptée vous soit proposée.

ALGANTIL® 200 mg
20 comprimés effervescents

Barcode: 6 118000 032335

مختبرات الصيدلانية للشمال
ORD - 21, RUE DES OUDAYA - CASABLANCA - MAROC

PPV 26D480

Exp 05/2025
LOT 24010 ?

être

relevé.

étés sur

éillance

Doliprane® 1000mg

PARACETAMOL

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, providone K30, amidon de maïs prégelatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST -CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est recommandé de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur, il est recommandé de consulter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. Il ne doit pas être pris avec d'autres médicaments contenant du paracétamol. Ne les associez pas, sauf sur recommandation de votre médecin.

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales, est recommandé en cas de grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

PPV 14DH06
PER 04/25
LOT L1589

Doliprane® 1000 mg
PARACÉTAMOL
10 comprimés



Doliprane® 1000mg

PARACETAMOL

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, providone K30, amidon de maïs prégelatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST -CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est recommandé de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur, il est recommandé d'aller immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. Il ne doit pas être associé à d'autres médicaments contenant du paracétamol. Ne les associez pas, sauf sur recommandation de votre pharmacien ou de votre médecin.

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales, est recommandé en cas de grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

PPV 14DH06
PER 04/25
LOT L1589

Doliprane® 1000 mg
PARACÉTAMOL
10 comprimés



Doliprane® 1000mg

PARACETAMOL

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, providone K30, amidon de maïs prégelatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST -CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est recommandé de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur, il est recommandé de consulter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. Ne les associez pas, sauf sur recommandation quotidienne recommandée (cf. chapitre 5).

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales de grossesse et d'allaitement, est recommandé.

PPV 14DH06
PER 04/25
LOT L1589

Doliprane® 1000 mg
PARACÉTAMOL
10 comprimés



Relaxium[®]

B6

375 mg



1 gélule par jour

COMPLEXE RELAXANT

100 % magnésium
vitamine B₆

LOT: 220484
DLUO: 06/2025
139,00DH



146-147 Zi. Tif Mellil - Casablanca

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAJDI Pharmacien Responsable

VOIE ORALE
60 GÉLULES

Ingrediénts : oxyde magnésium marin, vitamine B6, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, maltodextrine, gélule (dioxyde de titane, gélatine).

Complément alimentaire n'est pas médicament.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Analyse moyenne	Par 1 gélule	AJR*
Magnesium	375 mg	100%
VITAMINE B 6	2 mg	100%

*Apport Journalier Recommandé.

litho Typo

375 mg
60 GÉLULES

Relaxium[®]



Relaxium® B6

375 mg



1 gélule par jour

COMPLEXE RELAXANT

100 % magnésium
vitamine B6

LOT: 220484
DLUO: 06/2025
139,00DH



146-147 Zi. Tif Mellil - Casablanca

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAJDI Pharmacien Responsable

VOIE ORALE
60 GÉLULES

Ingrediénts : oxyde magnésium marin, vitamine B6, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, maltodextrine, gélule (dioxyde de titane, gélatine).

Complément alimentaire n'est pas médicament.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Analyse moyenne	Par 1 gélule	AJR*
Magnesium	375 mg	100%
VITAMINE B 6	2 mg	100%

*Apport Journalier Recommandé.

litho Typo

375 mg
60 GÉLULES

Relaxium B6

Relaxium® B6

375 mg



1 gélule par jour

COMPLEXE RELAXANT

100 % magnésium
vitamine B6

LOT: 220484
DLUO: 06/2025
139,00DH



146-147 Zi. Tif Mellil - Casablanca

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAJDI Pharmacien Responsable

VOIE ORALE
60 GÉLULES

Ingrediénts : oxyde magnésium marin, vitamine B6, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, maltodextrine, gélule (dioxyde de titane, gélatine).

Complément alimentaire n'est pas médicament.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Analyse moyenne	Par 1 gélule	AJR*
Magnesium	375 mg	100%
VITAMINE B 6	2 mg	100%

*Apport Journalier Recommandé.

litho Typo

375 mg
60 GÉLULES

Relaxium B6

Relaxium® B6

375 mg



1 gélule par jour

COMPLEXE RELAXANT

100 % magnésium
vitamine B₆

LOT: 220484
DLUO: 06/2025
139,00DH



146-147 Zi. Tif Mellil - Casablanca

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAJDI Pharmacien Responsable

VOIE ORALE
60 GÉLULES

Ingrediénts : oxyde magnésium marin, vitamine B6, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, maltodextrine, gélule (dioxyde de titane, gélatine).

Complément alimentaire n'est pas médicament.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Analyse moyenne	Par 1 gélule	AJR*
Magnesium	375 mg	100%
VITAMINE B 6	2 mg	100%

*Apport Journalier Recommandé.

litho Typo

375 mg
60 GÉLULES

Relaxium B6



DoliGrippe®

Paracétamol - Vitamine C - Maléate de Phéniramine

Granulés pour solution buvable en sachet

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition du médicament

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :

Paracétamol	500 mg
Acide Ascorbique (Vitamine C)	200 mg
Maléate de Phéniramine	25 mg

- Composition qualitative en excipients :

Mannitol, acide citrique anhydre, povidone K 30, citrate trimagnésium anhydre, aspartame, arôme fruits rouges. Composition de l'arôme : Substances aromatisantes, Rouge Cochenille A E124, Maltodextrine, Eau, Gomme Arabique E414, Acide Ascorbique E300, Triacetine E1518, Sulfate de sodium E514.

- Excipients à effet notoire :

Aspartame, Rouge Cochenille A (E124).

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

DoliGrippe® granulés pour solution buvable en sachet, fait partie d'un groupe de médicaments appelés AUTRES MEDICAMENTS DU RHUME EN ASSOCIATION.

DoliGrippe®, granulés pour solution buvable en sachet, agit en exerçant 3 actions pharmacologiques :

- Une action antihistaminique qui permet de réduire les rhinorrhées et les larmes aux phénomènes spasmodiques tels que les éternuements en salve.
- Une action antalgique antipyétique permettant une séduction de la fièvre.
- Une compensation en acide ascorbique de l'organisme.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhi de l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans :

- De l'écoulement nasal clair et des larmoiements,
- Des éternuements,
- Des maux de tête et/ou fièvre.

Posologie

Reservé à l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

1 sachet à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures minimum, sans

Mode d'administration :

Voie orale.

Les sachets doivent être pris dans une quantité suffisante d'eau, froide.

Au cours des états grippaux, il est préférable de prendre ce médicament

Durée du traitement :

La durée maximale du traitement est de 5 jours.

Fréquence d'administration :

En cas d'insuffisance rénale, (clairance à la créatinine inférieure à moins 8 heures).

Contre-indications

Ne prenez jamais DoliGrippe®, granulés pour solution buvable en s

- Enfant de moins de 15 ans,
- En cas d'antécédent d'allergie aux constituants du produit,
- En cas de certaines formes de glaucomes (augmentation de la pr
- En cas de difficultés à uriner d'origine prostatique ou autre,
- En cas de maladie grave du foie en raison de la présence de par
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la na

Vous ne devez généralement pas utiliser ce médicament, sauf avis de l'allaitement.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE

Effets indésirables

PPV:20DH09

PER:02/25

LOT:L431

AMM N° 247/15 DMP/21/...

DoliGrippe®
PARACÉTAMOL, VITAMINE C, MALÉATE DE PHÉNIRAMINE

8 SACHETS GRANULÉS



6 118000 041566

ALGIXENE® 500 mg, boîte de 12 suppositoires

D.C.I : Naproxène

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

• Que contient cette notice :

1. Où est-ce que ALGIXENE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALGIXENE® ?
3. Comment prendre ALGIXENE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALGIXENE® ?
6. Informations supplémentaires

1. OÙ EST-CE QUE ALGIXENE® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISME NON STÉROIDIEN - code ATC : M01AE02

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- En traitement de longue durée de :
o certaines rhumatismes inflammatoires chroniques,
o certaines arthroses sévères;
- En traitement de courte durée de :
o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
o douleurs aiguës d'arthrose,
o douleurs lombaires aiguës,
o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
o douleurs et céphalées liées à un traumatisme;
• Lors des règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALGIXENE® ?

• Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants :

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants du suppositoire,
- Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
- Maladie grave du foie,
- Maladie grave des reins,
- Maladie grave du cœur,
- Inflammation ou saignements récents du rectum (contre indication liée à la voie d'administration du traitement).

Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE. AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT, PREVENIR VOTRE MÉDECIN EN CAS :

- D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains patients allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants »).
- De troubles de la coagulation, de traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaires concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,
- D'antécédents digestifs (hémorragie digestive, hernie hiatale, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
- De maladie du cœur, du foie ou du rein,
- De traitement par diurétique ou d'intervention chirurgicale récente.

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS :

• De signes d'infection, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,

• De troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,

• De signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations). ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• Autres médicaments et ALGIXENE® :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre ALGIXENE® :

• Aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,

• Anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlodipine

• Lithium

• Méthotrexate

• Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

• Certains antidiépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

• Pemetrexed

• Ciclosporine, tacrolimus

• Déférasirox

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le naproxène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (incluant les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Lisez attentivement la notice des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine

• ALGIXENE®, comprimé avec des aliments et boissons :

Sans objet.

- Grossesse et allaITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin et/ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 12 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé qu'en cas des conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

• Effets sur la capacité de conduire et l'utilisation des machines :
Dans de rares cas, l'usage de ce médicament peut entraîner vertiges, somnolence et troubles de la vision.

• Informations importantes concernant certains composants de ALGIXENE® :
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ALGIXENE® ?

Posologie

La posologie est de 1 suppositoire à 500 mg par jour.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez, auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Voie rectale

Le choix de cette voie d'administration n'est déterminé que par la commodité d'administration de ce médicament.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Durée du traitement

L'utilisation de cette voie d'administration doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale surajoutée aux risques par voie générale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

• Si vous avez plus pris de ALGIXENE® que vous n'auriez dû :

• En cas d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

• Si vous oubliez de prendre ALGIXENE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALGIXENE® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

• Peuvent survenir des réactions allergiques :

o Cutanées : éruption sur la peau, démangeaisons, urticaire, aggravation d'urticaire chronique,

o Respiratoires : crise d'asthme, gêne respiratoire notamment chez les sujets allergiques à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires non stéroïdiens,

o Générals : très rarement, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), choc allergique.

• Peuvent également survenir :

o Une hémorragie digestive (voir rubrique « Mises en garde spéciales »). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée,

o Une réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV,

o Exceptionnellement, un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

• Au cours du traitement, il est possible que surviennent également :

o Des troubles digestifs : nausées, vomissements, ballonnements, diarrhée, constipation, maux d'estomac, gêne gastro-intestinale, plus rarement une inflammation de l'intestin,

o Des maux de tête, des vertiges, une somnolence, des insomnies, des bourdonnements d'oreille, des troubles de la vue ou de la concentration, de l'hypertension, une chute des cheveux, de l'œdème.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

• Des cas d'ulcère gastrique, de perforation et obstruction gastro-intestinale, d'inflammation de la bouche avec ulcération (stomatite), d'infection pulmonaire, de méningite, d'atteintes rénales et d'hépatites ont pu être observés.

• Quelques modifications biologiques peuvent nécessiter éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.

Des effets locaux (brûlures rectales, douleurs, démangeaisons rectales), liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée. Il faut interrompre le traitement par suppositoire et avertir votre médecin.

Déclarations des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et Centre de Déclaration des Effets Indésirables (CADI) : www.caom.ma.

En signalant d'informations

5. COMMENT

• Tenir hors de la portée des enfants.

- Conserver ce médicament dans un endroit sec.

- Ne pas utiliser sur les blisters.

- Ne jetez pas les suppositoires.

- Demandez à un pharmacien.

plus. Ces mesures

6. INFORMATIONS

• Que contient ce médicament :

- La substance active : Naproxène ...

- Les autres éléments actifs : Glycérines ...

- Forme pharmaceutique : Suppositoire

- Nom et adresse du laboratoire : Laboratoire ...

- Lot / Lot 149 -

- Province de ...

- La dernière date d'expérimentation : Août 2018.

- Conditionnement : Tableau C (1)

LOT : 06422024
FER : 09/2027
PPV : 10.30 DH

ALGIXENE® 500
12 Suppositoires



6 118000 230052

mg.

ché au Maroc ;

IMP. AJDR

1206601

ALGIXENE® 500 mg, boîte de 12 suppositoires

D.C.I : Naproxène

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

• Que contient cette notice :

1. Où est-ce que ALGIXENE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALGIXENE® ?
3. Comment prendre ALGIXENE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALGIXENE® ?
6. Informations supplémentaires

1. OÙ EST-CE QUE ALGIXENE® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISME NON STÉROIDIEN - code ATC : M01AE02

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- En traitement de longue durée de :
o certaines rhumatismes inflammatoires chroniques,
o certaines arthroses sévères;
- En traitement de courte durée de :
o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
o douleurs aiguës d'arthrose,
o douleurs lombaires aiguës,
o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
o douleurs et céphalées liées à un traumatisme;
• Lors des règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALGIXENE® ?

• Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants :

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
• Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
• Antécédent d'allergie à l'un des constituants du suppositoire,
• Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
• Ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
• Maladie grave du foie,
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Inflammation ou saignements récents du rectum (contre indication liée à la voie d'administration du traitement).

Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE. AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT, PREVENIR VOTRE MÉDECIN EN CAS :

- D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains patients allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants »),
• De troubles de la coagulation, de traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaires concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,

• D'antécédents digestifs (hémorragie digestive, hernie hiatale, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
• De maladie du cœur, du foie ou du rein,

• De traitement par diurétique ou d'intervention chirurgicale récente.

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

• De signes d'infection, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,
• De troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,

• De signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations). ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• Autres médicaments et ALGIXENE® :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre ALGIXENE® :

• Aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
• Céphalosporines

• Anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlodipine

• Lithium

• Méthotrexate

• Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

• Certains antidiépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

• Pemetrexed

• Ciclosporine, tacrolimus

• Déférasirox

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le naproxène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (incluant les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Lisez attentivement la notice des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine

• ALGIXENE®, comprimé avec des aliments et boissons :

Sans objet.

- Grossesse et allaITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 12 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé qu'en cas des conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

• Effets sur la capacité de conduire et l'utilisation des machines :
Dans de rares cas, l'usage de ce médicament peut entraîner vertiges, somnolence et troubles de la vision.

• Informations importantes concernant certains composants de ALGIXENE® :
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ALGIXENE® ?

Posologie

La posologie est de 1 suppositoire à 500 mg par jour.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez, auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Voie rectale

Le choix de cette voie d'administration n'est déterminé que par la commodité d'administration de ce médicament.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Durée du traitement

L'utilisation de cette voie d'administration doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale surajoutée aux risques par voie générale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

• Si vous avez plus pris de ALGIXENE® que vous n'auriez dû :

• En cas d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

• Si vous oubliez de prendre ALGIXENE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALGIXENE® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

• Peuvent survenir des réactions allergiques :

o Cutanées : éruption sur la peau, démangeaisons, urticaire, aggravation d'urticaire chronique.

o Respiratoires : crise d'asthme, gêne respiratoire notamment chez les sujets allergiques à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires non stéroïdiens,

o Générals : très rarement, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), choc allergique.

• Peuvent également survenir :

o Une hémorragie digestive (voir rubrique « Mises en garde spéciales »). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée,

o Une réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV,

o Exceptionnellement, un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

• Au cours du traitement, il est possible que surviennent également :

o Des troubles digestifs : nausées, vomissements, ballonnements, diarrhée, constipation, maux d'estomac, gêne gastro-intestinale, plus rarement une inflammation de l'intestin.

o Des maux de tête, des vertiges, une somnolence, des insomnies, des bourdonnements d'oreille, des troubles de la vue ou de la concentration, de l'hypertension, une chute des cheveux, l'œdème.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

• Des cas d'ulcère gastrique, de perforation et obstruction gastro-intestinale, d'inflammation de la bouche avec ulcération (stomatite), d'infection pulmonaire, de méningite, d'atteintes rénales et d'hépatites ont pu être observés.

• Quelques modifications biologiques peuvent nécessiter éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.

Des effets locaux (brûlures rectales, douleurs, démangeaisons rectales), liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée. Il faut interrompre le traitement par suppositoire et avertir votre médecin.

Déclarations des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et Centre de Déclaration des Effets Indésirables (CADI) : www.caom.ma.

En signalant d'informations

5. COMMENT

• Tenir hors de la portée des enfants.

• Ne pas utiliser sur les blisters.

• Ne jetez pas les suppositoires.

• Demandez à un adulte de les prendre.

• Ne pas utiliser plus de 3 mois.

• Cela peut entraîner une dépendance.

• Ne pas prendre plus de 10 suppositoires par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100 mg par jour.

• Ne pas prendre plus de 100

ALGIXENE® 500 mg, boîte de 12 suppositoires

D.C.I : Naproxène

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

• Que contient cette notice :

1. Où est-ce que ALGIXENE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALGIXENE® ?
3. Comment prendre ALGIXENE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALGIXENE® ?
6. Informations supplémentaires

1. OÙ EST-CE QUE ALGIXENE® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISME NON STÉROIDIEN - code ATC : M01AE02

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- En traitement de longue durée de :
o certaines rhumatismes inflammatoires chroniques,
o certaines arthroses sévères;
- En traitement de courte durée de :
o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
o douleurs aiguës d'arthrose,
o douleurs lombaires aiguës,
o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
o douleurs et céphalées liées à un traumatisme;
• Lors des règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALGIXENE® ?

• Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants :

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
• Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
• Antécédent d'allergie à l'un des constituants du suppositoire,
• Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
• Ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
• Maladie grave du foie,
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Inflammation ou saignements récents du rectum (contre indication liée à la voie d'administration du traitement).

Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE. AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT, PREVENIR VOTRE MÉDECIN EN CAS :

- D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains patients allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants »),
• De troubles de la coagulation, de traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaires concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,

• D'antécédents digestifs (hémorragie digestive, hernie hiatale, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
• De maladie du cœur, du foie ou du rein,

• De traitement par diurétique ou d'intervention chirurgicale récente.

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

• De signes d'infection, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,
• De troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,

• De signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations). ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• Autres médicaments et ALGIXENE® :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre ALGIXENE® :

• Aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
• Céphalosporines

• Anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlodipine

• Lithium

• Méthotrexate

• Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

• Certains antidiépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

• Pemetrexed

• Ciclosporine, tacrolimus

• Déférasirox

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le naproxène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (incluant les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Lisez attentivement la notice des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine

• ALGIXENE®, comprimé avec des aliments et boissons :

Sans objet.

- Grossesse et allaITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 12 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé qu'en cas des conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

• Effets sur la capacité de conduire et l'utilisation des machines :
Dans de rares cas, l'usage de ce médicament peut entraîner vertiges, somnolence et troubles de la vision.

• Informations importantes concernant certains composants de ALGIXENE® :
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ALGIXENE® ?

Posologie

La posologie est de 1 suppositoire à 500 mg par jour.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez, auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Voie rectale

Le choix de cette voie d'administration n'est déterminé que par la commodité d'administration de ce médicament.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Durée du traitement

L'utilisation de cette voie d'administration doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale surajoutée aux risques par voie générale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

• Si vous avez plus pris de ALGIXENE® que vous n'auriez dû :

• En cas d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

• Si vous oubliez de prendre ALGIXENE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALGIXENE® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

• Peuvent survenir des réactions allergiques :

o Cutanées : éruption sur la peau, démangeaisons, urticaire, aggravation d'urticaire chronique.

o Respiratoires : crise d'asthme, gêne respiratoire notamment chez les sujets allergiques à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires non stéroïdiens,

o Générals : très rarement, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), choc allergique.

• Peuvent également survenir :

o Une hémorragie digestive (voir rubrique « Mises en garde spéciales »). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée,

o Une réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV,

o Exceptionnellement, un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

• Au cours du traitement, il est possible que surviennent également :

o Des troubles digestifs : nausées, vomissements, ballonnements, diarrhée, constipation, maux d'estomac, gêne gastro-intestinale, plus rarement une inflammation de l'intestin,

o Des maux de tête, des vertiges, une somnolence, des insomnies, des bourdonnements d'oreille, des troubles de la vue ou de la concentration, de l'hypertension, une chute des cheveux, l'œdème.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

• Des cas d'ulcère gastrique, de perforation et obstruction gastro-intestinale, d'inflammation de la bouche avec ulcération (stomatite), d'infection pulmonaire, de méningite, d'atteintes rénales et d'hépatites ont pu être observés.

• Quelques modifications biologiques peuvent nécessiter éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.

Des effets locaux (brûlures rectales, douleurs, démangeaisons rectales), liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée. Il faut interrompre le traitement par suppositoire et avertir votre médecin.

Déclarations des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et Centre de Déclaration des Effets Indésirables (CADI) : www.caom.ma.

En signalant d'informations

5. COMMENT

• Tenir hors de la portée des enfants

- Conserver ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

- Ne pas utiliser les blister

- Ne jetez pas les blister

- Demandez à un pharmacien

- plus. Ces mesures

6. INFORMATIONS

• Que contient ce médicament :

- La substance active : Naproxène ...

- Les autres éléments actifs : Glycérines serif ...

- Forme pharmaceutique : Suppositoire

- Présentation : Tablette (C)

- Laboratoire : ZL - Lot 149 -

- Province de : Province de Casablanca

- La dernière date de validité : Août 2018.

- Conditionnement : Tableau C (I)

LOT : 06422024
FER : 09/2027
PPV : 10.30 DH

ALGIXENE® 500
12 Suppositoires



6 118000 230052

mg.

aché au Maroc ;

IMP. AJDR

120660101

ALGIXENE® 500 mg, boîte de 12 suppositoires

D.C.I : Naproxène

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

• Que contient cette notice :

1. Où est-ce que ALGIXENE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALGIXENE® ?
3. Comment prendre ALGIXENE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALGIXENE® ?
6. Informations supplémentaires

1. OÙ EST-CE QUE ALGIXENE® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISME NON STÉROIDIEN - code ATC : M01AE02

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- En traitement de longue durée de :
o certaines rhumatismes inflammatoires chroniques,
o certaines arthroses sévères;
- En traitement de courte durée de :
o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
o douleurs aiguës d'arthrose,
o douleurs lombaires aiguës,
o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
o douleurs et céphalées liées à un traumatisme;
• Lors des règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALGIXENE® ?

• Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants :

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
• Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
• Antécédent d'allergie à l'un des constituants du suppositoire,
• Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
• Ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
• Maladie grave du foie,
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Inflammation ou saignements récents du rectum (contre indication liée à la voie d'administration du traitement).

Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE. AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT, PREVENIR VOTRE MÉDECIN EN CAS :

- D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains patients allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants »),
• De troubles de la coagulation, de traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaires concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,

• D'antécédents digestifs (hémorragie digestive, hernie hiatale, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
• De maladie du cœur, du foie ou du rein,

• De traitement par diurétique ou d'intervention chirurgicale récente.

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

• De signes d'infection, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,
• De troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,

• De signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations). ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• Autres médicaments et ALGIXENE® :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre ALGIXENE® :

• Aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
• Céphalosporines

• Anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlodipine

• Lithium

• Méthotrexate

• Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

• Certains antidiépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

• Pemetrexed

• Ciclosporine, tacrolimus

• Déférasirox

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le naproxène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (incluant les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Lisez attentivement la notice des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine

• ALGIXENE®, comprimé avec des aliments et boissons :

Sans objet.

- Grossesse et allaITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 12 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé qu'en cas des conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

• Effets sur la capacité de conduire et l'utilisation des machines :
Dans de rares cas, l'usage de ce médicament peut entraîner vertiges, somnolence et troubles de la vision.

• Informations importantes concernant certains composants de ALGIXENE® :
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ALGIXENE® ?

Posologie

La posologie est de 1 suppositoire à 500 mg par jour.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez, auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Voie rectale

Le choix de cette voie d'administration n'est déterminé que par la commodité d'administration de ce médicament.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Durée du traitement

L'utilisation de cette voie d'administration doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale surajoutée aux risques par voie générale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

• Si vous avez plus pris de ALGIXENE® que vous n'auriez dû :

• En cas d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

• Si vous oubliez de prendre ALGIXENE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALGIXENE® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

• Peuvent survenir des réactions allergiques :

o Cutanées : éruption sur la peau, démangeaisons, urticaire, aggravation d'urticaire chronique.

o Respiratoires : crise d'asthme, gêne respiratoire notamment chez les sujets allergiques à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires non stéroïdiens,

o Générals : très rarement, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), choc allergique.

• Peuvent également survenir :

o Une hémorragie digestive (voir rubrique « Mises en garde spéciales »). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée,

o Une réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV,

o Exceptionnellement, un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

• Au cours du traitement, il est possible que surviennent également :

o Des troubles digestifs : nausées, vomissements, ballonnements, diarrhée, constipation, maux d'estomac, gêne gastro-intestinale, plus rarement une inflammation de l'intestin,

o Des maux de tête, des vertiges, une somnolence, des insomnies, des bourdonnements d'oreille, des troubles de la vue ou de la concentration, de l'hypertension, une chute des cheveux, de l'œdème.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

• Des cas d'ulcère gastrique, de perforation et obstruction gastro-intestinale, d'inflammation de la bouche avec ulcération (stomatite), d'infection pulmonaire, de méningite, d'atteintes rénales et d'hépatites ont pu être observés.

• Quelques modifications biologiques peuvent nécessiter éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.

Des effets locaux (brûlures rectales, douleurs, démangeaisons rectales), liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée. Il faut interrompre le traitement par suppositoire et avertir votre médecin.

Déclarations des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et Centre de Déclaration des Effets Indésirables (CADI) : www.caom.ma.

En signalant d'informations

5. COMMENT

• Tenir hors de la portée des enfants.

- Consservez ce médicament dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.

- Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

- Ne jetez pas les blister usagés.

- Demandez à un pharmacien de les remplacer.

plus. Ces mesures peuvent aider à empêcher les effets indésirables.

• Ne pas utiliser les blister usagés.

ALGIXENE® 500 mg, boîte de 12 suppositoires

D.C.I : Naproxène

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

• Que contient cette notice :

1. Où est-ce que ALGIXENE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALGIXENE® ?
3. Comment prendre ALGIXENE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALGIXENE® ?
6. Informations supplémentaires

1. OÙ EST-CE QUE ALGIXENE® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISME NON STÉROIDIEN - code ATC : M01AE02

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- En traitement de longue durée de :
o certaines rhumatismes inflammatoires chroniques,
o certaines arthroses sévères;
- En traitement de courte durée de :
o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
o douleurs aiguës d'arthrose,
o douleurs lombaires aiguës,
o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
o douleurs et céphalées liées à un traumatisme;
• Lors des règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALGIXENE® ?

• Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants :

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
• Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
• Antécédent d'allergie à l'un des constituants du suppositoire,
• Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
• Ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
• Maladie grave du foie,
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Inflammation ou saignements récents du rectum (contre indication liée à la voie d'administration du traitement).

Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE. AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT, PREVENIR VOTRE MÉDECIN EN CAS :

- D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains patients allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants »),
• De troubles de la coagulation, de traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaires concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,

• D'antécédents digestifs (hémorragie digestive, hernie hiatale, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
• De maladie du cœur, du foie ou du rein,

• De traitement par diurétique ou d'intervention chirurgicale récente.

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

• De signes d'infection, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,
• De troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MÉDECIN,

• De signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• D'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations). ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE,

• Autres médicaments et ALGIXENE® :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre ALGIXENE® :

• Aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
• Céphalosporines

• Anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlodipine
• Lithium

• Méthotrexate
• Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

• Certains antidiépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

• Pemetrexed

• Ciclosporine, tacrolimus

• Déférasirox

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le naproxène. Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (incluant les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Lisez attentivement la notice des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine

• ALGIXENE®, comprimé avec des aliments et boissons :

Sans objet.

- Grossesse et allaITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 12 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé qu'en cas des conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

• Effets sur la capacité de conduire et l'utilisation des machines :
Dans de rares cas, l'usage de ce médicament peut entraîner vertiges, somnolence et troubles de la vision.

• Informations importantes concernant certains composants de ALGIXENE® :
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ALGIXENE® ?

Posologie

La posologie est de 1 suppositoire à 500 mg par jour.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez, auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Voie rectale

Le choix de cette voie d'administration n'est déterminé que par la commodité d'administration de ce médicament.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Durée du traitement

L'utilisation de cette voie d'administration doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale surajoutée aux risques par voie générale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

• Si vous avez plus pris de ALGIXENE® que vous n'auriez dû :

En cas d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

• Si vous oubliez de prendre ALGIXENE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALGIXENE® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les médicaments tels que ALGIXENE® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

• Peuvent survenir des réactions allergiques :

o Cutanées : éruption sur la peau, démangeaisons, urticaire, aggravation d'urticaire chronique.

o Respiratoires : crise d'asthme, gêne respiratoire notamment chez les sujets allergiques à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires non stéroïdiens,

o Générals : très rarement, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), choc allergique.

• Peuvent également survenir :

o Une hémorragie digestive (voir rubrique « Mises en garde spéciales »). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée,

o Une réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV,

o Exceptionnellement, un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

• Au cours du traitement, il est possible que surviennent également :

o Des troubles digestifs : nausées, vomissements, ballonnements, diarrhée, constipation, maux d'estomac, gêne gastro-intestinale, plus rarement une inflammation de l'intestin,

o Des maux de tête, des vertiges, une somnolence, des insomnies, des bourdonnements d'oreille, des troubles de la vue ou de la concentration, de l'hypertension, une chute des cheveux, l'œdème.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

• Des cas d'ulcère gastrique, de perforation et obstruction gastro-intestinale, d'inflammation de la bouche avec ulcération (stomatite), d'infection pulmonaire, de méningite, d'atteintes rénales et d'hépatites ont pu être observés.

• Quelques modifications biologiques peuvent nécessiter éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.

Des effets locaux (brûlures rectales, douleurs, démangeaisons rectales), liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée. Il faut interrompre le traitement par suppositoire et avertir votre médecin.

Déclarations des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et Centre de Déclaration des Effets Indésirables (CADI) : www.caom.ma.

En signalant d'informations

5. COMMENT SE PRENDRE ALGIXENE® ?

- Tenir hors de la portée des enfants

- Ne pas utiliser sur les blisters

- Ne jetez pas les blisters

- Demandez à un adulte

plus. Ces mesures

peuvent aider à empêcher

l'ingestion par un enfant

ou une personne

qui n'a pas d'autorisation

à prendre ce médicament.

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation

• Ne jetez pas les

blisters

après leur utilisation