

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0015322

182196

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6497 Société : M. M. T.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : L. M. M. T. Y. Mohamed

Date de naissance : 18/09/1963

Adresse : B. B. T. m. l. l.

Tél. : 0666108690 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur KADI ANIS
CARDIOLOGUE
Imar Center, Rue Arrachid Med Etg 7 N°2
(Angle Av des FAR) - CASABLANCA 20110
Tél: 05 22 31 53 48

Date de consultation : 05/10/2013

Nom et prénom du malade : L. M. M. T. Y. Mohamed Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Cardiopathie ischémique

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/10/2015	5		Crédit 04/10/2015	Signature du Médecin attestant le paiement des honoraires
17/10/2015	6		300	Signature du Médecin attestant le paiement des honoraires

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Ouled Ziane Dr. Al Hicham INPE: 092047455 Bd. El Fida 1260 - Ain Chifa 3 Casablanca - Tél.: 0522 852 959 ICE: 000495400000015	10/23	5318,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Nom et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
SOCIÉTÉ MANDARIN	07.10.23	B 1010,11	1378,4000

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

		INSCRIPTION H <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 40px; vertical-align: top;">D</td> <td style="width: 50px; height: 40px; vertical-align: top;">G</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 40px; vertical-align: top;">B</td> <td style="width: 50px; height: 40px; vertical-align: top;">H</td> </tr> </table> D 25533412 21433552 G 00000000 00000000 B 00000000 00000000 H 35533411 11433553		D	G	B	H	COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION	
D	G								
B	H								
<p style="text-align: center;">[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>									
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>									
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS									
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION									

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Kadi Anis CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine de
L'université d'état Lomonossov de Moscou

Ex-interne du Centre de Recherche
Cardiovasculaire Bakulev



الدكتور قاضي أنيس أمراض القلب و الشرايين

خريج كلية الطب بجامعة
موسكو الحكومية لومونوسوف

خريج مركز أبحاث القلب
و الأوعية الدموية باكوف

Cabinet d'Explorations Cardio-Vasculaire

Casablanca, Le الدار البيضاء في

17/10/2023

MR LAMAIZI MOHAMMED

- **Micardis 40 mg**
2 comprimé, matin, pendant 6 mois
- **Coplavix 75mg/100mg**
1 comprimé, matin, pendant 6 mois
- **Cardioaspirine 100 mg**
1 comprimé, matin, après le petit déjeuner, pendant 6 mois
- **Cardensiel 2,5 mg**
1 comprimé, matin et soir, pendant 6 mois
- **Tahor 10 mg**
2 comprimé, soir, pendant 6 mois

Traitements à renouveler dans trois mois après consultation chez le médecin traitant.

5318120
Pharmacie Ouled Ziane
Dr. ASRI Ilham
INPE: 092047455
Bd. El Fida 1260 - Ain Chifa 3
Casablanca - Tel: 0522 852 959

Docteur KADI ANIS
CARDIOLOGUE
IMAN CENTER Rue Arrachid Med El Fida 7 N°2
(Angle Av. des FAR) - CASABLANCA 20110
Tel: 0522 31 53 48

URGENCE +212 6 61 41 57 72 @ cardiokad@gmail.com

IMAN CENTER Rue Arrachid Mohamed, Étage 7^{ème}, N°2 (Angle Av. des Forces Armées Royale)
CASABLANCA 20110
مركز إيمان زنقة الرشيد محمد (زاوية شارع الجيش الملكي) الطابق 7، رقم 2، الدار البيضاء 20110



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

P032001-002

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

P032001-002

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

P032001-002

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de Micardis que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

P032001-002

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de Micardis que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

P032001-002

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

P032001-002

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903



teur

l'originalité de cette notice à rendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

auriez avoir besoin de

ns, interrogez votre m votre pharmacien.

ersonnellement prescronez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques

que effet indésirable, à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné que 4.

P032001-002

Micardis® 40 mg comprimés

Telmisartan

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les **informations** à connaître avant de prendre **Micardis**
3. Comment prendre **Micardis**
4. Quels sont les **effets indésirables** éventuels
5. Comment conserver **Micardis**
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que **Micardis** et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression arté

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorothiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemmen

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle 40 mg par jour.

Si vous avez pris plus de **Micardis** que v

Si vous prenez accidentellement un



5156903

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'un mal de tête
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque héréditaire de maladie :
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac et/ou des intestins
 - des troubles de la coagulation interne (saignement aigu ou douloureux, saignement articulaire).
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux (ischémie cérébrale)
- si vous présentez une maladie :
 - si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, compris les allergies à tout médicament
 - si vous avez de la goutte.
 - si vous buvez de l'alcool ou de boissons énergétiques
 - si vous avez une maladie de la déshydrogénase (ou désoxygénase) qui peut développer une forme de maladie dans le sang en faible quantité

Pendant la prise de CoPlavix

- Vous devez avertir votre médecin :
 - si une intervention chirurgicale est programmée
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous vomissez ou dans l'intestin (selon la nature de la douleur)
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT incluant une maladie qui apparaît comme des petits caillots dans les vaisseaux, non de fatigue extrême inexplicable ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4)
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de certaines blessures, il peut être nécessaire de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- "Effets indésirables éventuels" : Votre médecin pourra vous en parler.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'un mal de tête
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque héréditaire de maladie :
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac et/ou des intestins
 - des troubles de la coagulation interne (saignement aigu ou douloureux, saignement articulaire).
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux (ischémie cérébrale)
- si vous présentez une maladie :
 - si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, compris les allergies à tout médicament
 - si vous avez de la goutte.
 - si vous buvez de l'alcool ou de boissons énergétiques
 - si vous avez une maladie de la déshydrogénase (ou désoxygénase) qui peut développer une forme de maladie dans le sang en faible quantité

Pendant la prise de CoPlavix

- Vous devez avertir votre médecin :
 - si une intervention chirurgicale est programmée
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous vomissez ou dans l'intestin (selon la nature de la douleur)
- Vous devez aussi avertir votre médecin :
 - si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT incluant une maladie de la coagulation qui apparaît comme des petits caillots dans les yeux ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4)
 - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de certaines blessures, il peut être nécessaire de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin
 - "Effets indésirables éventuels"
 - Votre médecin pourra vous donner des informations supplémentaires

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'un mal de tête
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque héréditaire de maladie :
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac et/ou des intestins
 - des troubles de la coagulation interne (saignement aigu ou douloureux, saignement articulaire).
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux (ischémie cérébrale)
- si vous présentez une maladie :
 - si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, compris les allergies à tout médicament
 - si vous avez de la goutte.
 - si vous buvez de l'alcool ou de boissons énergétiques
 - si vous avez une maladie de la déshydrogénase (ou désoxygénase) qui peut développer une forme de maladie dans le sang en faible quantité

Pendant la prise de CoPlavix

- Vous devez avertir votre médecin :
 - si une intervention chirurgicale est prévue
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous vomissez ou dans l'intestin (selon la nature de la douleur)
- Vous devez aussi avertir votre médecin :
 - si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT incluant une maladie de la coagulation qui apparaît comme des petits caillots dans les yeux ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4)
 - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de certaines blessures, il peut être nécessaire de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
 - "Effets indésirables éventuels"
 - Votre médecin pourra vous donner des informations supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'un mal de tête
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque héréditaire de maladie :
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac et/ou des intestins
 - des troubles de la coagulation interne (saignement aigu ou douloureux, saignement articulaire).
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux (ischémie cérébrale)
- si vous présentez une maladie :
 - si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, compris les allergies à tout médicament
 - si vous avez de la goutte.
 - si vous buvez de l'alcool ou de boissons énergétiques
 - si vous avez une maladie de la déshydrogénase (ou désoxygénase) qui peut développer une forme de maladie dans le sang en faible quantité

Pendant la prise de CoPlavix

- Vous devez avertir votre médecin :
 - si une intervention chirurgicale est prévue
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous vomissez ou dans l'intestin (selon la nature de la douleur)
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT incluant une maladie qui apparaît comme des petits caillots dans les vaisseaux, non de fatigue extrême inexplicable ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4)
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de certaines blessures, il peut être nécessaire de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- "Effets indésirables éventuels" : Votre médecin pourra vous en parler.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'un mal de tête
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque héréditaire de maladie :
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac et/ou des intestins
 - des troubles de la coagulation interne (saignement aigu ou douloureux, saignement articulaire).
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux (ischémie cérébrale)
- si vous présentez une maladie :
 - si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, compris les allergies à tout médicament
 - si vous avez de la goutte.
 - si vous buvez de l'alcool ou de boissons énergétiques
 - si vous avez une maladie de la déshydrogénase (ou désoxygénase) qui peut développer une forme de maladie dans le sang en faible quantité

Pendant la prise de CoPlavix

- Vous devez avertir votre médecin :
 - si une intervention chirurgicale est prévue
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous vomissez ou dans l'intestin (selon la nature de la douleur)
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT incluant une maladie qui apparaît comme des petits caillots dans les vaisseaux, non de fatigue extrême inexplicable ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4)
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de certaines blessures, il peut être nécessaire de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- "Effets indésirables éventuels" : Votre médecin pourra vous en parler.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'un mal de tête
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque héréditaire de maladie :
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac et/ou des intestins
 - des troubles de la coagulation interne (saignement aigu ou douloureux, saignement articulaire).
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux (ischémie cérébrale)
- si vous présentez une maladie :
 - si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, compris les allergies à tout médicament
 - si vous avez de la goutte.
 - si vous buvez de l'alcool ou de boissons énergétiques
 - si vous avez une maladie de la déshydrogénase (ou désoxygénase) qui peut développer une forme de maladie dans le sang en faible quantité

Pendant la prise de CoPlavix

- Vous devez avertir votre médecin :
 - si une intervention chirurgicale est prévue
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous vomissez ou dans l'intestin (selon la nature de la douleur)
- Vous devez aussi avertir votre médecin :
 - si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT incluant une maladie de la coagulation qui apparaît comme des petits caillots dans la peau, non de fatigue extrême inexplicable ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4)
 - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de certaines blessures, il peut être nécessaire de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
 - "Effets indésirables éventuels"
 - Votre médecin pourra vous donner des informations supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'un mal de tête
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse

Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin

- si vous avez un risque héréditaire de maladie :
 - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac et/ou des intestins
 - des troubles de la coagulation interne (saignement aigu ou douloureux, saignement articulaire).
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale
 - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux (ischémie cérébrale)
- si vous présentez une maladie :
 - si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, compris les allergies à tout médicament
 - si vous avez de la goutte.
 - si vous buvez de l'alcool ou de boissons énergétiques
 - si vous avez une maladie de la déshydrogénase (ou désoxygénase) qui peut développer une forme de maladie dans le sang en faible quantité

Pendant la prise de CoPlavix

- Vous devez avertir votre médecin :
 - si une intervention chirurgicale est prévue
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous vomissez ou dans l'intestin (selon la nature de la douleur)
- Vous devez aussi avertir votre médecin :
 - si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT incluant une maladie de la coagulation qui peut apparaître comme des petits caillots dans les yeux ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4)
 - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de certaines maladies, il peut être nécessaire de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin :
 - "Effets indésirables éventuels"
 - Votre médecin pourra vous donner des instructions

Cardioaspirine 100 mg/30cpls
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe la

Cardioaspirine 100 mg/30cpls
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe la

Cardioaspirine 100 mg/30cpls
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre pharmacien ou votre médecin. Il pourra décider des mesures de précaution à prendre et peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

Insuffisance cardiaque aiguë, nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

Cardiaque lent,

Pression basse,

Problèmes cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre médecin. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre pharmacien ou votre médecin. Il pourra décider des mesures de précaution à prendre et peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

Insuffisance cardiaque aiguë, nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

Cardiaque lent,

Pression basse,

Problèmes cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL. Il décidera des mesures de précaution à prendre ou prescrira un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre pharmacien ou votre médecin. Il pourra décider des mesures de précaution à prendre et peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre médecin. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

Insuffisance cardiaque aiguë, nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

Cardiaque lent,

Pression basse,

Problèmes cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL:

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre médecin. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre médecin. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

insuffisance cardiaque aiguë,

hantation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

cardiaque lent,

ritelle basse,

troubles cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques susmentionnés, informez votre médecin. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens supplémentaires.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bétabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bétabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

Insuffisance cardiaque aiguë, nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

Cardiaque lent,

Pression basse,

Problèmes cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

CARDENSIEL :

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants, indiquez-le à votre médecin avant de prendre CARDENSIEL. Il décidera des mesures de précaution à prendre. Il peut prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des examens.



طهور® 10 مغ. Atorvastatin أتورفاستاتين أقراص مغلفة

UT. AV. : 02 25 P.P.V 7.9 00
LOT N° : FW 7285

التركيب النوعي والكمي للدواء
أنيورفاستين غليس تلوكال التبيه بوازي أتورفاستين 10 مغ.
الكمادات: كربونات الالاتيبيو، طلوز بولي مهوري لاكتوكسي احادي التبيه، كوكوسمايزور مكون من الصوديوم، عنصر السوربات الـ 75-1040، مستحلب مضاف الرغوة، شمع كانديليلا، سواع كافل الفوس ملتف.

الفلة الدوائية: دواء، مخفض الكوليستيرول/يمنع وسائل الإصابة بامراض القلب والشرايين نتيجة لارتفاع ضغط الدم مصاحب لعسر الشعريدية (الدم).

حالات استعمال هذا الدواء: إن هذا الدواء يخفف كمية الكوليستيرول في الدم، ويوصى في الماءة عندما لا تتحجج الأشحة الدentine وانخفاض الوزن وتغير الحمبة الد.

كما ينصح باستعمال هذا الدواء في بعض حالات ارتفاع الكوليستيرول عندما يتبين أن الحمبة الدفانية المانعية والمتواضدة.

وينصح أيضاً باستعمال هذا الدواء في بعض حالات الارتوبيا لدواء المرضي الذين يعانون من توتر الأوعية الدموية والذين يخضعون للعلاج في إطار الوقاية الأولية لترحيمهم ثلاثة عوامل خطر الإصابة - سواء مع أو بدون وجود إفراد في

عمر العدن في الماءة.

الحالات التي يجب الانتباه فيها عن استعمال هذا الدواء: يجب انتباه الى احتفاظ هذا الدواء في عيادة الطبيب في الحالات التالية:

- الصدريات لا ينصح باستعمال دوائين مركبات الكبد (أنظر مركبات الكبد).

- الإصابة الدفانية المانعية مع ارتفاع مستويات الكبد.

- في حالة استعمال هذا الدواء كـ Ketoconazole (دايرافون) و دواء كيتوكونازول (Delavirdine) التي توصى لمعالجة بعض الإصابات الفطرية) ومع الأدوية المضادة للبروتياز Antiprotéases.

- عند الارتوبيا المرضية (ارتفاع مستويات الكبد) دوائين ديرافونين (Téthirophosfate) و دواء ديرافونين (Delavirdine) التي توصى لمعالجة المرضية المخضمة للدورة والرضانة).

- يجب شكل عام عدم استعمال هذا الدواء بـ طببكم طببكم في حالة استعماله مع دوائين آخر لمعالجة الكوليستيرول أو دوائين مخفض الكوليستيرول (أنظر تفاعل الدواء مع أدوية أخرى).

عند الشك، يادروا إلى استشارة طببكم أو الصيدلي.

محاذير خاصه:

• في حالة مانعية امراض ارتفاع الكوليستيرول المفترض، يتعين القيد بدقة بالحمبة الدفانية التي يصفها الطبيب:

• ينصح بالخصوص بالذين يعانون من ارتفاع مستويات الكبد.

• في حالة الإصابة بألم ملتهي، يادروا إلى اخبار طببكم العالج بالذرة المخفضة للألم، غير المرغوب فيها أو المزعجة.

• سبب الارتوبيا، ينصح بـ احتفاظ هذا الدواء في حالة تقصص امراض السكر الخلقي أو سوء امراض الطبلوك والمالكتوز أو نقص في الالكتوز (امراض ايسبيبة نادرة).

عند الشك، لا تتردوا في استشارة طببكم أو الصيدلي.

احتياطات عند استعمال هذا الدواء:

يجب احتفاظ هذا الدواء في عيادة الطبيب في الحالات التالية:

• عند استهلاك كميات كبيرة من الكحول أو عند تصرفة بـ مركب الكبد:

• عند الارتوبيا في العمل أو ارتفاع الرغبة.

عند الشك، لا تتردوا في استشارة طببكم أو الصيدلي.

تفاعل الدواء مع أدوية أخرى:

من أجل تفادي مخاطر تفاعلات بين دوائين طببكم أو الصيدلي يتعين عليكم اخبار طببكم ما إذا كنتم تتناولون دوائين آخر مخفض الكوليستيرول أو دوائين آخر، ينصح بالخصوص طببكم أو الصيدلي مبادرة بـ يادروا إلى اخبار طببكم العالج سبب الارتوبيا أو سبب فرورس نقص المناعة المكتسبة.

الحمل وطريق المرض:

ليس ملائم للارتوبيا في حالات الحمل، إذا اكتسبت انتك حامل العالج، يادروا إلى اخبار طببكم فهو الوحيد الذي يمكنه تتعديل العلاج ليناسب حالتك الصحية.

إن هذا الدواء يصل إلى حليب الأم، ولذلك، ينصح بعدم استعماله عند الرضاعة.

إذا رغبت في العمل أو ارتفاع المفاسد، يادروا إلى اخبار طببكم بذلك.

الحقن:

يشكل هذا الدواء عند استعماله مع تصرفة بـ مركب الكبد تغيراً جديداً في الحمبة الدفانية.

الطبية التي تشمل جرعة فحص دوائين الكبد بشكل منظم.

كما ينصح بـ احتفاظ هذا الدواء عن طريق الماء.

عند العروض والترويج التي يتعين فيها تناول الدواء:

يجب تناول هذا الدواء مرة واحدة في اليوم (سواء قبل الأكل أو شاملاً أو بعدم).

الحقن:

يشكل هذا الدواء عند استعماله مع تصرفة بـ مركب الكبد تغيراً جديداً في الحمبة الدفانية.

الطبية التي تشمل جرعة فحص دوائين الكبد بشكل منظم.

كل الأدوية غير المروج لها في هذا الدواء تتعارض مع تصرفة بـ مركب الكبد.

• بالنسبة لمعلم الحالات، ينصح لهذا الدواء عن تناوله تأثيرات مزعجة متغيرة:

• أدواء أو شخنفات تصلبة (ريلفافها في بعض الأحيان ارتفاع في الأنزيمات العضلية).

• كما ينصح بـ احتفاظ هذا الدواء في بعض الأحيان ارتفاع في الأنزيمات العضلية.

• اضطرابات جلدية (حكة، تهيج جلدي منتشر، أو سقوط شعر الرأس أو شعر البدين).

• اعراض جسمية عصبية: تقل، اضطرابات الميسنة المطرقة (اضطراب اصحاب الاطراف)، الاحساس بالدوحة، اضطرابات في الذاكرة.

• اضطرابات الكبد (ارتفاع انزيمات الكبد، التهاب الكبد، اليرقان) أو اضطرابات البكيريات (التهاب البكيريات)، ضعف الشهية، التقيؤ.

• العجز:

• الام، اضطرابات:

• في حالات استثنائية تمت ملاحظة اعراض الماء.

• اضطرابات الأوتار والاقرحة:

• اعراض ملائحة الماء.

أدوية مخفف الكوليستيرول:

• ملء 10 مل، على علبة من 14 قرص ملطف.

• ملء 10 مل، على علبة من 28 قرص ملطف.

• ملء 10 مل، على علبة من 56 قرص ملطف.

الالتحاح A الالتحاح B الالتحاح C الالتحاح D الالتحاح E الالتحاح F الالتحاح G الالتحاح H الالتحاح I الالتحاح J الالتحاح K الالتحاح L الالتحاح M الالتحاح N الالتحاح O الالتحاح P الالتحاح Q الالتحاح R الالتحاح S الالتحاح T الالتحاح U الالتحاح V الالتحاح W الالتحاح X الالتحاح Y الالتحاح Z الالتحاح

لا يعطي هذا الدواء إلا بوصفة طبية.

مخبريات فايزر - شركة مغلفة 0.5 كجم، طريق الوليدية الجديدة - المغرب

ماركة مسجلة

إذا أحسستوا بأوجاع عضلية أو حساسية عضلية مؤلمة أو ضعف عضلي، يادروا إلى استشارة طببكم لأن المشكلات العضلية يمكن أن تكون خطيرة في حالات نادرة.



طهور® 10 مغ. Atorvastatin أتورفاستاتين أقراص مغلفة

UT. AV. : 02 25 P.P.V 7.9 00
LOT N° : FW 7285

التركيب النوعي والكمي للدواء
أنيورهاستين غليس تلوكال التبيه بوازي أتورفاستاتين 10 مغ.
الكمادات: كربونات الالاتيبيو، طلوز بولي مهوري لاكتوكسي احادي التبيه، كوكوسمايزور مكون من الصوديوم، عنصر السوربات الـ 75-1040، مستحلب مضاف الرغوة، شمع كانديليلا، سواع كافل الفوس ملتف.

الفلة الدوائية: دواء، مخفض الكوليستيرول/يمنع وسائل الإصابة بامراض القلب والشرايين نتيجة لارتفاع ضغط الدم مصاحب لعسر الشعريدية (الدم).

حالات استعمال هذا الدواء: إن هذا الدواء يخفف كمية الكوليستيرول في الدم، ويوصى في الماءة عندما لا تتحم الأشحة الدنية وأنخفاض الوزن وتغير العجمة الـ كما يتضمن استعمال هذا الدواء في بعض حالات امراض ارتفاع الكوليستيرول عندما تبين أن الحمية الغذائية المتماثلة المعروفة سواء لوحدة او مع ادوية أخرى.

ويتضمن أيضاً استعمال هذا الدواء في بعض الحالات التي تبين أن الحمية الغذائية المتماثلة المعروفة سواء لوحدة او مع ادوية أخرى.

- تخفيف امراض الاردة التاجية لدى المرضى الذين يعانون من توتر الاروعية الدموية والذين يخضعون للعلاج في إطار الوقاية الاولية لترحيمهم ثلاثة عوامل خطر الإصابة - سواء مع او بدون وجود افراد في عائلة ممن يعانون من امراض الاردة التاجية.

نطلي موافقة الجهة الذاتية ضرورية.

الحالات التي يجب الانتباه فيها عن استعمال هذا الدواء:

يجب ادخال انتباه هذه الدواء في معالجة بعض حالات الاصابة بالجفون الكبد (انظر مكونات الكبد).

- الاصابة بالجفون المطرورة مع ارتفاع مستوي انيزيات الكبد.

- في حالة استعمال هذا الدواء كـ Ketoconazole (دايريلدين) ودواء كيتوكونازول (Delavirdine) التي توصى لمعالجة بعض الاصابات الفطرية) ومع الادوية المضادة للبروتياز Antiprotéases.

- عند الاردة المرضعة مع ادخال انتباه طببيك في حالة استعمال مع دواء آخر لمعالجة الكوليستيرول او دواء مخفض الكوليستيرول (انظر تفاعل الدواء مع ادوية أخرى).

عند الشك، يادروا إلى استشارة طببيكم او الصيدلي.

محاذير خاصه:

في حالة اصابة مارض ارتفاع الكوليستيرول المطرورة، يتبع التقييد بدقة بالحمية الغذائية التي يصفها الطبيب:

- يبيح في اصابة مارض ارتفاع الكوليستيرول المطرورة، بغض النظر عن طبيعة ادوية أخرى.

- في حالة اصابة بامراض قلب، يادروا إلى اخبار طببيكم المعالج بالذات، ففي امراض السكر الخلفي او مرض امراض القلب والمالكتوز او نقص في الالكتوز (امراض ايسبيبة نادرة).

عند الشك، لا تتردروا في استشارة طببيكم او الصيدلي.

احتياطات عند استعمال هذا الدواء:

يجب ادخال انتباه هذه الدواء في معالجة بعض حالات الاصابة بالجفون الكبد (انظر مكونات الكبد).

- عند استهلاك كميات كبيرة من الكحول مع ادخال انتباه طببيك في حالة اصابة بمرض كبد.

- عند الاردة المرضعة في العمل او ارضاع الرضي، يبيح بعد استعمال هذا الدواء في حالة نقص امراض القلب والمالكتوز عند الاردة المرضعة.

عند الشك، لا تتردروا في استشارة طببيكم او الصيدلي.

تفاعل الدواء عن استعمال الدواء:

يجب ادخال انتباه هذه الدواء عن ادخال انتباه طببيكم او الصيدلي مبادرة باى دواء آخر يخضعون للعلاج سبب الاصابة الفطرية او سبب فروس نقص المناعة المكتسبة.

الحمل وظرف تناول الدواء:

يبيح هذا الدواء عند استعماله مع التقييد بالحمل، اذا اكتسبت انتك حامل العامل، يادروا الى اخبار طببيكم فهو الوحيد الذي يمكنه تعدل العلاج ليناسب حالتك الصحية.

ان هذا الدواء يصلب الى حليب الارض، ولذلك، يبيح بعد استعماله تناول الدواء عند الرضاعة.

اذا رغبت في العمل او ارضاع طفلتك، يادروا إلى اخبار طببيك بذلك.

الكماتير:

حددت هذه الدارو، عند استعماله في الماءة، 10 ملغ الى 20 ملغ في اليوم، لكن، يمكن عند ضرورة رفع الجرعة الى 80 ملغ في اليوم كحد أقصى.

في كل الحالات، يبيح التقييد بشكل دقيق بوصمة الطبيب.

كثيفية وظرف تناول الدواء:

يأخذ هذا الدواء عن طريق الفم.

عدد المرات والجرعات التي يتبع فيها تناول الدواء:

يجب تناول هذا الدواء مرة واحدة في اليوم (سواء قبل الأكل او شام او بعدم).

الاعراض:

يشكل هذا الدارو عند استعماله مع التقييد بالحمل، ملاجأ يبيح موصنته لفتره جد طويلة ومرارته بانتظام، من اجل استعمال هذا الدارو استعمالاً جيداً، من الضروري الخضوع بانتظام للمراقبة.

كما يبيح بعض انيزيات الكبد بشكل منظم.

كل الاكتارات غير المرضية فيها وفها ومرارتها:

• بالنسبة لمعلم الحالات، يبيح لهذا الدارو عن تناوله مزعجة متقارنة.

• اوجاد او شخخات اصلية (رهاقها) في بعض الاحيان ارتقاء في انيزيات العضلية.

• كما يبيح ملاحة الاعراض ارثالية:

- اضطرابات احادية (دكة، قمع جلدي منتشر او سقوط شعر الرأس او شعر البدين).

- اعراض جسمية عصبية: تقل، انسنة الميسنة المطرورة (امابة انيزيات الاطراف) الاصحاس بالدوحة، اضطرابات في الذاكرة.

- اصابة الكبد (ارتفاع انيزيات الكبد، التهاب الكبد، اليرقان) او اصابة البكتيريا (التهاب البكتيريا)، ضعف الشهية، التقيؤ:

- العجز:

- الام، اسهال:

• في امراض اشتئالية تمت ملاحة الاعراض المائية:

- اصابة الارواح الضليلة:

• اذا احسستوا بوجاج عضلية او حسق عضلية، يادروا الى استشارة طببيكم لأن المشكلات العضلية يمكن ان تكون خطيرة في حالات نادرة.

شكل عدم استعمال الدارو بعد انسرام تاريخ الصلاحية الموجود على ظهر العلبة.

شكل تقديم الدارو:

مليون 10 ملغ، علىة من 14 قرص ملطف.

مليون 10 ملغ، علىة من 28 قرص ملطف.

مليون 10 ملغ، علىة من 56 قرص ملطف.

الالتحاح A الالتحاح B الالتحاح C الالتحاح D الالتحاح E الالتحاح F الالتحاح G الالتحاح H الالتحاح I الالتحاح J الالتحاح K الالتحاح L الالتحاح M الالتحاح N الالتحاح O الالتحاح P الالتحاح Q الالتحاح R الالتحاح S الالتحاح T الالتحاح U الالتحاح V الالتحاح W الالتحاح X الالتحاح Y الالتحاح Z الالتحاح

لا يعطي هذا الدارو إلا بوصمة طبية.

مخبريات فايزر - شركة مغلفة 0.5 كغم، طريق الوليدية

الجديدة - المغرب

ماركة مسجلة

Docteur Kadi Anis

CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine de
L'université d'état Lomonossov de Moscou

Ex-interne du Centre de Recherche
Cardiovasculaire Bakulev



الدكتور قاضي أنيس
أمراض القلب و الشرايين

خريج كلية الطب بجامعة
موسکو الحكومية لومونسوف

خريج مركز أبحاث القلب
و الأوعية الدموية باكولف

Cabinet d'Explorations Cardio-Vasculaire

Casablanca, Le 05/10/2023 الدار البيضاء في

Dr. Kadi Anis. DoKA Med.

- NFB + pRq.
- Cholestrol + HDL + LDL + triglycerides
- G et gém
- Mère + créatinin
- GGT + GPT.
- pSP. totHP.
- Rénal

Docteur KADI ANIS
CARDIOLOGUE
Iman Center, Rue Arrachid Med. Etg 7 N°2
Angle Av. des FAR - CASABLANCA 20110
Tél: 05 22 31 53 48

LABORATOIRE ANALYSES
MÉDICALES MANDARONA
619, Bd 41 9005 20460, Casablanca
Tél: 05 22 52 83 88
Fax: 05 22 21 92 41

Docteur KADI ANIS
CARDIOLOGUE
Iman Center, Rue Arrachid Med. Etg 7 N°2
Angle Av. des FAR - CASABLANCA 20110
Tél: 05 22 31 53 48

📞 +212 5 22 31 53 48 💫 URGENCE +212 6 61 41 57 72 @cardiokad@gmail.com

IMAN CENTER Rue Arrachid Mohamed, Étage 7^{ème}, N°2 (Angle Av. des Forces Armées Royale)
CASABLANCA 20110
مركز إيمان زنقة الرشيد محمد (زاوية شارع الجيش الملكي) الطابق 7، رقم 2، الدار البيضاء



مختبر منظرونا للتحليلات الطبية
LABORATOIRE MANDARONA
D'ANALYSES MEDICALES

Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Casablanca le 7 octobre 2023

Monsieur LAMAIZI MOHAMMED

FACTURE N°	192850
------------	--------

Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	80	
Bilan lipidique -----	B	190	
Glycémie -----	B	30	
Urée -----	B	30	
Créatinine -----	B	30	
Transaminases OT -----	B	50	
Transaminases PT -----	B	50	
PSAus total -----	B	300	
Ferritine -----	B	250	Total : B 1010

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER	1 378,40 DH
---------------	-------------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Trois Cent Soixante Dix Huit Dirhams et Quarante Centimes

LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALES MANDARONA
679, Bd Al Qods 20460 - Casablanca
Tél. : 05 22 52 83 88
Fax : 05 22 21 92 41

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347



Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste
Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 07/10/23

Prélèvement effectué à 07:51

Edition du : 07/10/23

Monsieur LAMAIZI MOHAMMED

Réf. : 23J444

Compte Rendu d'Analyses

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

(SYSMEX XS-1000i)

Normales Antériorités

10/12/21

GLOBULES ROUGES

Hématies -----:	4,10	* M/mm ³	4,5 - 5,55	4,50
Hémoglobine -----:	13,7	* g/100 ml	14 - 17	14,5
Hématocrite -----:	40	%	40 - 50	44
- V.G.M. -----:	98	* μ^3	80 - 95	98
- T.C.M.H. -----:	33	* pg	28 - 32	32
- C.C.M.H. -----:	34	g/100 ml	30 - 35	33

GLOBULES BLANCS

PLAQUETTES

Résultat -----: 225 000 /mm³ 150000 - 400000 232000



مختبر منظرونا للتحاليلات الطبية
LABORATOIRE MANDARONA
D'ANALYSES MEDICALES

Page : 5/5

Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 07/10/23

Prélèvement effectué à 07:51

Édition du : 07/10/23

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Monsieur LAMAIZI MOHAMMED

Réf. : 23J444

Compte Rendu d'Analyses

Normales

Antériorités

Ferritine ----- : 29 ng/ml 10/12/21 49

(Chimiluminescence COBAS ROCHE E411)

Valeurs usuelles en ng/ml

Enfants : A la naissance : 150 à 450 ng/ml


2 à 3 mois : 80 à 500 ng/ml

4 mois à 16 ans : 20 à 200

Femmes cycliques : 13 à 150 ng/ml

Femmes ménopausées : 30 à 400 ng/ml

Hommes : 30 à 400 ng/ml



LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALES MANDARONA

679, Bd Al Qods 20460 - Casablanca

Tél. : 05 22 52 83 88

Fax : 05 22 21 92 41

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347


Nom: Lamaizi
Prénom: Mohamed
ID: 0100682
DDN: 18-Sep-1962
Age: 61ans
Sex: M
Taille: 163cm
Poids: 68kg

RYTHME SINUS 17-Oct-2023 11:35:47
ECG NORMAL

Fréq.Card: 67 BPM
Int PR: 189 ms
Dur.QRS: 85 ms
QT/QTc: 389 / 404 ms
Axes P-R-T: 8 32 55
Moy RR: 889 ms
QTcB: 412 ms
QTcF: 404 ms

RYTHME SINUSAL
ECG NORMAL

Docteur KADI ANIS
CARDIOLOGUE
Iman Center Rue Arrachid Med Etg 7 N°2
(Angle Av des FAR) - CASABLANCA 20100
2 2 1 5 3 4 8



117320581988

Site Zero

Site # 0 App.# 0 ELI Link 4.11.6.0 Séquence # 13957 25mm/s 10mm/mV 0.05-150 Hz W