

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0033665

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 09601

Société : R.A.M. 18288D

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BATTAOUI Noureddine

Date de naissance :

01/01/1919

Adresse :

Hay HAKAM 2 Rue 82 N° 40 Casablanca

Tél. : 06-71-21-41-17

Total des frais engagés : 758,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

16/01/2019

Nom et prénom du malade :

BATTAOUI Mohamed

Age : 16 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Nature de la maladie :

Dermatos. I. psoriasis

Affection longue durée ou chronique :

ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 16/01/2019

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
07.11.2023	Cs	300 DH	Dr. Wissal Benjelloun Dermatologue 3d. 2 Mars Andalous Casablanca 0670287711	

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie ATTIOUI B. El Kheir, Rue 1, N° 1 santé : 111 111 111	07/11/23	458,60 092012335

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth (1-8 on each side) and a coordinate system. The vertical axis is labeled 'H' at the top, the horizontal axis to the left is labeled 'D', the horizontal axis to the right is labeled 'G', and the vertical axis at the bottom is labeled 'B'.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Wissal El Soussi Ait Said
Dermatologie- Vénérégologue

- Maladies de la peau, cheveux et ongles
- Maladies sexuellement transmissibles
- Dermatologie-Allergologie
- Dermatologie Esthétique
- Cosmétologie. Lasers

الدكتورة وصال السوسي آيت سعيد
إختصاصية في الأمراض الجلدية و التناسالية
- أمراض الجلد، الشعر، الأظافر
- الأمراض المنقولة جنسياً
- حساسية الجلد
- التجميل الطبي الليزر

Casablanca, le

Pharmacie ATTIOUI

Derb EL KREIM
Rue 2 Mars
N° 741
Casablanca

Chock
42

W

PPV :
LOT :
PER :

22,00

22,00 x 9
198,00

Instagyn 100

22,50 x 21 49,50
145,00

Differine 75

2 app 1/2 mol 03 mod

كريم % 0,05

LOT : 174
PER : AUT 2026
PPV : 32 DH 50

كريم % 0,05

LOT : 174
PER : AUT 2026
PPV : 32 DH 50

Dr. Wissal EL SOUSSI
Dermatologue - Vénéréologue
Bd. 2 Mars Andalous N°741,
Etage 2 - Casablanca
Tél: 05 22 87 26 81 - 06 62 86 82 81
05 22 87 26 81 - 06 62 86 82 81

✉ drelsoussiwissal@gmail.com

📞 05 22 87 26 81 / 06 62 86 82 81

📍 Bd 2 mars Andalous 3 n°741 étage 2 (croisement Bd 2 mars et Bd panoramique) Casablanca
شارع 2 مارس أندلس 3، رقم 741 الطابق الثاني الدار البيضاء (تقاطع شارع 2 مارس المنظر العام)

DIFFERINE 0,1 %
crème, tube de 30 g
AMM N° 291 DMP/21/NCV
PPV: 72,50 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura-Maroc

6 118001 070206

32,50 + 2
65,00

Diphosone Crema

4.5

(ex. 10)

peut 2 appels

1.5 APP 25% → 1 bain 1/2

leau

15,30 + 2
65,00 - 10,00

Ketoderm Crema

4.5

2 appels

peut 10 jours

peut 10 jours

Lemonin

24 Krosh

Pharmacie ATTIOUI

Derb El Kheir - Rue 1 N° 6 Ain Chock
Casablanca - Tel. 05 23 52 79 42

Pharmacie ATTIOUI

Derb El Kheir - Rue 1 N° 6 Ain Chock
Casablanca - Tel. 05 22 52 08 42

DIFFERINE 0,1 %
crème, tube de 30 g
AMM N° 291 DMP/21/NCV
PPV: 72,50 DH
Distribué par SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura-Maroc

6 118001 070206

KETODERM 2%
CREME T 10G
PER. 07.2026
P.P.V : 25DH30

6 118000 010920

Dr. Wissal EL SOUSSI
Dermatologue - Vénérologue
Bd. S. Mars Andalous 3 N°741,
Etage 2 - Casablanca
Tél : 06 62 85 97 81 - 05 27 27 26 81

ISTACYNE

Doxycycline

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte

c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, RIC ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus ir chroniques, Tréponèmes (dans la syphilis, les tétamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptosp

composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation ap

3. ATTENTION !

a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf Grossesse/All

Relatives : Pendant l'allaitement.

b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire respecter les

c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'email en cas d'administration chez l'enfant
- Troubles digestifs (nausées, épigastriques, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite,
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la position couchée et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photo-d'œrythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines

PPV :

LOT :

22,00

PER :

ISTACYNE 100 mg

10 comprimés



6 118000 180777

ISTACYNE

Doxycycline

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte

c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, RIC ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus ir chroniques, Tréponèmes (dans la syphilis, les tétamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptosp

composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation ap

3. ATTENTION !

a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf Grossesse/All

Relatives : Pendant l'allaitement.

b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire respecter les

c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'email en cas d'administration chez l'enfant
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite,
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la position couchée et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photo-d'œrythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines

PPV :

LOT :

22,00

PER :

ISTACYNE 100 mg

10 comprimés



6 118000 180777

ISTACYNE

Doxycycline

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte

c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, RIC ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus ir chroniques, Tréponèmes (dans la syphilis, les tétamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptosp

composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation ap

3. ATTENTION !

a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf Grossesse/All

Relatives : Pendant l'allaitement.

b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire respecter les

c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'email en cas d'administration chez l'enfant
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite,
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la position couchée et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photo-d'œrythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines

PPV :

LOT :

22,00

PER :

ISTACYNE 100 mg

10 comprimés



6 118000 180777

ISTACYNE

Doxycycline

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte

c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, RIC ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus ir chroniques, Tréponèmes (dans la syphilis, les tétamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptosp

composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation ap

3. ATTENTION !

a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf Grossesse/All

Relatives : Pendant l'allaitement.

b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire respecter les

c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'email en cas d'administration chez l'enfant
- Troubles digestifs (nausées, épigastriques, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite,
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la position couchée et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photo-d'œrythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines

PPV :

LOT :

22,00

PER :

ISTACYNE 100 mg
10 comprimés



6 118000 180777

ISTACYNE

Doxycycline

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline.....

Excipients.....

b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte

c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, RIC ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus ir chroniques, Tréponèmes (dans la syphilis, les tétamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptosp

composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation ap

3. ATTENTION !

a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf Grossesse/All

Relatives : Pendant l'allaitement.

b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire respecter les

c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'email en cas d'administration chez l'enfant
- Troubles digestifs (nausées, épigastriques, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite,
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la position couchée et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photo-d'œrythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines

PPV :

LOT :

22,00

PER :

ISTACYNE 100 mg

10 comprimés



6 118000 180777