

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 5123 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

FAIHE DDINE chamo

Date de naissance :

1946
Tanger

Adresse :

Tél. : 0662497026

Total des frais engagés Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

HTA

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/09/23 23	EC		300.00	Mr. ZOUBIDI M. Agrégé - Cardiologue 6, Rond Point de la Casablanca - Tel: 0222551200 Casablanca - Mob: 069.58.10.01 - INPE 0222551200
01/10/23 23	CS		0	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Laboratoire	Date	Montant de la Facture
	01/10/23	68300
	15/10/23	643120

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
	01/09/23	Echographie 800dh	
	20/09/23	Cardiologie	
	16/09/23	P 200 3000dh	

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
				
MONTANTS DES SOINS	DEBUT D'EXECUTION	FIN D'EXECUTION		
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412	21433552	
	D	00000000	00000000	
		00000000	00000000	
		35533411	11433553	
	B			
	G			
[Création, remont, adjonction]	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
MONTANTS DES SOINS	DATE DU DEVIS	DATE DE L'EXECUTION		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Centre Cardiologique
Interventionnel

ZOUBIDI MOHAMED ZINABIDIN
Professeur Agrégé

ORDONNANCE

Date : 01/09/2023

M^{me} Fatheddine Chouup

2220

1 Endoskopie



1 - 0

21800

4 Aprovel 300



1 - 0

8810

3 Cardinor 25



1 - 0 - -

3460

4 Galix 40



1 - 0 - -

232.50

5 Spiruline



2 - 0 - -

8210

6 Dre xenum 50

0 - - - 1

683.00

Centre Cardiologique Interventionnel

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain sebaâ Casablanca

Aprovel 300 mg, cp b 28
P.P.V : 218,00 DH

6 118001 080908

PPC TTC: 232,5 dhs
Production: Septembre 2022
DLC: Septembre 2025
N° de lot: R 220912

ZOUBIDI Mohamed Zinabidin
Pr. Agrégé - Cardiologue Interventionnel
67, Rond Point de Marseille Oasis
Casablanca Tel: 05 22 25 51 35
06 69 58 10 81 - INPE 0010 606

Cardioaspirine 100 mg/30cpr
Acide acétylsalicylique
P.F. : 27.70 DH
Bayer S.A.



Avant de prendre ce médicament, veuillez lire l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en
cas d'effets identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique. CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE

CARDINOR® 6,25 & 25 mg comprimés sécables (Carvédilol)

Nouvez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez une autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre

LOT : 230063
EXP : 01/2026
PPV : 88,10DH

inmez jamais à quelqu'un d'autre,
noct.
uez un effet indésirable non
otre pharmacien

et 60
et 60

CARDINOR® 25 mg

30 comprimés sécables



6 118001 101337

0,25 mg CARDINOR® 25 mg

mg/Comprimé

mg 25 mg

microcristalline, Hypromellose faiblement
de fer jaune. Silice colloïdale anhydre, Talc
comprimé sécable

2. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et bêtabloquant.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque pailler de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRÉSCRIPTION MÉDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration :

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRÉSCRIPTION MÉDICALE.

5. Contre-Indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement sévère des bronches et des poumons broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si votre cœur fonctionne très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des problèmes (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiogénique).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique)

• En même temps que certains médicaments :

- la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin),

- les antiarythmiques de la classe I (médicament cardiaque).

6. Effets indésirables

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, CARDINOR, comprimé sécable, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, les effets indésirables sont classés ci-dessous par

Très fréquent (touche plus d'un patient sur 10) :

- étourdissement, malaise de tête,
- insuffisance cardiaque,
- diminution de la tension artérielle,
- fatigue,

Fréquent (touche 1 à 10 patients sur 100) :

- bronchite, pneumonie, infection du nez et de la gorge,
- diminution du nombre de globule rouge dans le sang,
- prise de poids, augmentation du taux de cholestérol et de glucose dans le sang chez les patients diabétiques,
- dépression, trouble de l'humeur,
- modification de la vision, diminution du liquide lachrymal,
- diminution du rythme cardiaque, gonflement de certaines parties du corps importante dans le corps (rétenzione hydrique),
- sensation de vertige en position debout, perturbation froides, troubles vasculaires périphériques, augmentation de Raynaud),
- difficultés respiratoires, asthme,
- nausées, diarrhée, vomissements, ballonnements, extrémités douloureuses,
- insuffisance rénale et anomalies de la fonction rénale, circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale secondaire,
- œdème, douleur,

Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

- trouble du sommeil,
- sensation vertigineuse, perte de conscience brusque, fourmillements dans certaines parties du corps,
- trouble de la conduction cardiaque, angine de poitrine,
- réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation cutanée type psoriasis ou lichen), chute des cheveux,
- trouble de l'érection,

Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

- diminution du taux de plaquettes dans le sang,
- nez bouché,
- Troubles de la miction

Très rare (touche moins d'un patient sur 10 000) :

- diminution du taux de globule blanc dans le sang,

• réaction allergique

• augmentation des enzymes hépatiques,

• incontinence urinaire chez les femmes,

• réactions cutanées sévères (par exemple érythème, syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés appelle à une surveillance continue du rapport b

7. Mises en garde spéciales et précautions part

Adresssez-vous à votre médecin ou votre pharmacien sécable en cas :

- D'augmentation des troubles cardiaques, d'œdème (rétenzione hydrique), de difficultés respiratoires sévères, adaptation par votre médecin de votre dose de cardiaque.
- De diabète (ce médicament pouvant masquer les symptômes de ce mal).
- De maladie rénale,
- D'extrémités froides,
- De ralentissement du rythme cardiaque,
- Des réactions allergiques,
- D'angor de Prinzmetal (variété d'angine de poitrine),
- De phéochromocytome (atteinte d'une glande surrénalique),
- De troubles thyroïdiens,
- De psoriasis (maladie de peau),
- D'antécédents de taux anormalement bas de protéines de coagulation sanguine). Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez le chirurgien que vous prenez ce médicament.
- Des réactions cutanées

INEXIUM 20 mg, comprimés gastro-resistants

Notice: information du patient

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'Inexium

paramétrisation, une carte d'appartenance, dessin de traits, traits et modélisation, plan de sols et planification des travaux.

SYNTHEMEDIC
22 rue Zouhour Bnou el Aouia
Casablanca - Maroc

20 mg Cet GR

640/15DMP/21NRQ F.P.V.

esoon
mexican-to-my-compan

INexium 20 mg, comp

- Si vous avez oublié de prendre la dose quotidienne, ne prendre pas la dose oubliée.
- Ne prendre pas la moitié d'une dose pour la prendre à la dose suivante, ne prendre pas deux doses en même temps.
- Vous avez oublié de prendre.
- Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

- **Adolescents** : **Agés de 12 ans et plus**
Nécessité par intégralité.
La maladie de reflux gastro-oesophagien (RGO). Laide provoquant le lésionnel au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et troubles digestifs.
- **«La maladie de reflux gastro-oesophagien» (RGO).** Laide provoquant le lésionnel au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et troubles digestifs.
- **Ulcères de l'estomac** : Les ulcères de l'estomac sont des lésions qui sont créées par une

Personnes âgées Aucun résultat n'est nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous prenez plus de Meximil que vous n'aimez du Si vous prenez plus de Meximil que vous n'aimez du à votre médecien ou à votre pharmacien.

- Accès à la presse DIANS.
- Accès à la presse gascogne due à une tuméfaction au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).
- Poursuite du traitement d'une récidive hémarragique du ulcères avec

En ces dernières années, le déclin de la population rurale a entraîné une baisse de la densité de population dans les campagnes. Cela a entraîné une diminution de la pression sur les terres et une amélioration de la qualité des sols. Cependant, cela a également entraîné une diminution de la diversité des cultures et une diminution de la productivité agricole. De plus, la décentralisation a entraîné une diminution de l'investissement dans l'agriculture et une diminution de l'emploi dans ce secteur.

- **Adultes**
Néanmoins cette utilisation dans le traitement des affections suivantes :
quantité d'acide produite par l'estomac.
- **La maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO).** L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur.

- Pouvez boire le thé sucré immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le thé avec du sucre ou du sirop de sucre. Remuez le thé avec du sucre ou du sirop de sucre.
- Pour éteindre la soif, buvez cette boisson à la dose, lorsque vous êtes très soif. Remuez toujours le thé avec du sucre ou du sirop de sucre.

1. Qu'est-ce que l'heximel et dans quel cas est-il utilisé

- Quelle est la cause de ces problèmes pour éviter vos compromis
- Si vous avez des problèmes pour éviter vos compromis :
 - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Utilisez pas d'autres liquides.

- 2 Quelles sont les informations à conserver avant de prendre l'Inexum
- 3 Document prendre l'Inexum
- 4 Quelles sont les effets indésirables événuels
- 5 Document conserver l'Inexum
- 6 Contenu de l'emballage et autres informations

1. Quel constructeur offre une garantie de 10 ans sur les batteries de ses voitures électriques ?

- **Indication:** La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de 1000 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- **Précaution:** L'efficacité de la paracétamol peut être diminuée par l'absorption simultanée de l'acide chlorhydrique.

INEXIM
20 mg C-GR
Boite 14
640150MP21NRQ F.P.V.

razole
these genera's relationships

INEXIUM 40 mg, comp
INEXIUM 20 mg, comp

mes gastro-résistants

Notice: Information contained in this document is unclassified.

PS19300



Centre Cardiologique
Interventionnel

ZOUBIDI MOHAMED ZINABDIN

Professeur Agrégé

Coronarographie - Angioplastie - Stimulation Cardiaque

Date : 15-08-2023

M' Fat heddi ne Chaleux

277

1/ Cardiosophie

1 - 0 - 0

2 12,00 x 2 = 4 361,00

1 - 0 - 0

2/ Aprovet 300

83,80

3/ Cardimor 25

1 - 0 - 0

34,60

4/ Bokli 40

2 - 0 - 0

5,67

5/ Aldochrone 80

1/2 - 1 - 0

= 6 431,20

M 1 feu

ETT

Dr. MOHAMED ZINABDIN
Agrégé - Cardiologue Interventionnel
67, Rond Point de Marseille Oasis
Casablanca - Tél: 05.22.25.51.35
Mob: 06.69.58.10.81 - INPE 05.026955

Centre Cardiologique Interventionnel

67,Rond point de Marseille, Oasis - Casablanca - Tél.:+212 522 25 51 35 / GSM : +212 669 58 10 81
E-mail : mz_zoubidi@yahoo.fr / mz_zoubidi@centrecardiologie.com / www.centrecardiologie.com

Cardioaspirine 100 mg/30cpr
Acide acétylsalicylique
P.F. : 27.70 DH
Bayer S.A.



Avant de prendre ce médicament, veuillez lire l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en
cas d'effets identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique. CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE

APROVEL®


comprimé pelliculé
irbésartan

300 mg

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1
Ain seba Casablanca

Aprovel 300 mg, cp b 28
P.P.V : 218,00 DH



6 118 001 080908

Avant de prendre l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous pourriez avoir besoin de la relire. Une autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables s'aggrave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Aprovel et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aprovel
3. Comment prendre Aprovel
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aprovel
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE APROVEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique

Aprovel apparti

• si vous souffrez de **problèmes cardiaques** ;

• si vous recevez Aprovel pour une **atteinte rénale due au diabète**.

Dans ce cas votre médecin peut faire pratiquer des tests sanguins réguliers, en particulier pour mesurer le taux de potassium dans le sang en cas de mauvais fonctionnement des reins ;

• si vous devez subir une **intervention chirurgicale** ou une **anesthésie**.

Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte. Aprovel est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois de grossesse, car il peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'enfant à naître s'il est utilisé au cours de cette période (voir la rubrique grossesse).

Utilisation chez les enfants

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents car l'efficacité et la tolérance n'a pas encore été établie.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aprovel ne présente habituellement pas d'interaction avec d'autres médicaments.

Vous pouvez être amené à effectuer des contrôles sanguins si vous prenez

- une supplémentation en potassium,
- des sels de régime à base de potassium,
- des médicaments d'épargne potassique (tels que certains diurétiques),
- des médicaments contenant du lithium.

Si vous prenez des médicaments anti-douleurs appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens, les effets de l'irbésartan peuvent être diminués.

Aliments et boissons

APROVEL®

comprimé pelliculé
irbésartan

300 mg

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1
Ain seba Casablanca

Aprovel 300 mg, cp b 28
P.P.V : 218,00 DH



6 118 001 080908

Avant de prendre l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous pourriez avoir besoin de la relire. Une autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables s'aggrave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Aprovel et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aprovel
3. Comment prendre Aprovel
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aprovel
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE APROVEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique

Aprovel apparti

• si vous souffrez de **problèmes cardiaques** ;

• si vous recevez Aprovel pour une **atteinte rénale due au diabète**.

Dans ce cas votre médecin peut faire pratiquer des tests sanguins réguliers, en particulier pour mesurer le taux de potassium dans le sang en cas de mauvais fonctionnement des reins ;

• si vous devez subir une **intervention chirurgicale** ou une **anesthésie**.

Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte. Aprovel est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois de grossesse, car il peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'enfant à naître s'il est utilisé au cours de cette période (voir la rubrique grossesse).

Utilisation chez les enfants

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents car l'efficacité et la tolérance n'a pas encore été établie.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aprovel ne présente habituellement pas d'interaction avec d'autres médicaments.

Vous pouvez être amené à effectuer des contrôles sanguins si vous prenez

- une supplémentation en potassium,
- des sels de régime à base de potassium,
- des médicaments d'épargne potassique (tels que certains diurétiques),
- des médicaments contenant du lithium.

Si vous prenez des médicaments anti-douleurs appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens, les effets de l'irbésartan peuvent être diminués.

Aliments et boissons

CARDINOR® 6,25 & 25 mg comprimés sécables (Carvédilol)

Nouvez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
Si vous avez une autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre

LOT : 230063
EXP : 01/2026
PPV : 88,10DH

inmez jamais à quelqu'un d'autre,
noct.
uez un effet indésirable non
otre pharmacien

et 60
et 60

CARDINOR® 25 mg

30 comprimés sécables



6 118001 101337

0,25 mg CARDINOR® 25 mg

mg/Comprimé

mg 25 mg

microcristalline, Hypromellose faiblement
de fer jaune. Silice colloïdale anhydre, Talc
comprimé sécable

2. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et bêtabloquant.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque pailler de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRÉSCRIPTION MÉDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration :

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRÉSCRIPTION MÉDICALE.

5. Contre-Indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement sévère des bronches et des poumons broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si votre cœur fonctionne très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des problèmes (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiogénique).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique)

• En même temps que certains médicaments :

- la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin),

- les antiarythmiques de la classe I (médicament cardiaque).

6. Effets indésirables

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, CARDINOR, comprimé sécable, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, les effets indésirables sont classés ci-dessous par

Très fréquent (touche plus d'un patient sur 10) :

- étourdissement, malaise de tête,
- insuffisance cardiaque,
- diminution de la tension artérielle,
- fatigue,

Fréquent (touche 1 à 10 patients sur 100) :

- bronchite, pneumonie, infection du nez et de la gorge,
- diminution du nombre de globule rouge dans le sang,
- prise de poids, augmentation du taux de cholestérol et de glucose dans le sang chez les patients diabétiques,
- dépression, trouble de l'humeur,
- modification de la vision, diminution du liquide lachrymal,
- diminution du rythme cardiaque, gonflement de certaines parties du corps importante dans le corps (rétenzione hydrique),
- sensation de vertige en position debout, perturbation froides, troubles vasculaires périphériques, augmentation de Raynaud),
- difficultés respiratoires, asthme,
- nausées, diarrhée, vomissements, ballonnements, extrémités douloureuses,
- insuffisance rénale et anomalies de la fonction rénale, circulation sanguine et/ou une insuffisance rénale secondaire,
- œdème, douleur,

Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

- trouble du sommeil,
- sensation vertigineuse, perte de conscience brusque, fourmillements dans certaines parties du corps,
- trouble de la conduction cardiaque, angine de poitrine,
- réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation cutanée type psoriasis ou lichen), chute des cheveux,
- trouble de l'érection,

Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

- diminution du taux de plaquettes dans le sang,
- nez bouché,
- Troubles de la miction

Très rare (touche moins d'un patient sur 10 000) :

- diminution du taux de globule blanc dans le sang,

• réaction allergique

• augmentation des enzymes hépatiques,

• incontinence urinaire chez les femmes,

• réactions cutanées sévères (par exemple érythème, syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés appelle à une surveillance continue du rapport b

7. Mises en garde spéciales et précautions part

Adresssez-vous à votre médecin ou votre pharmacien sécable en cas :

- D'augmentation des troubles cardiaques, d'œdème (rétenzione hydrique), de difficultés respiratoires sévères, adaptation par votre médecin de votre dose de cardiaque.
- De diabète (ce médicament pouvant masquer les symptômes de ce mal).
- De maladie rénale,
- D'extrémités froides,
- De ralentissement du rythme cardiaque,
- Des réactions allergiques,
- D'angor de Prinzmetal (variété d'angine de poitrine),
- De phéochromocytome (atteinte d'une glande surrénalique),
- De troubles thyroïdiens,
- De psoriasis (maladie de peau),
- D'antécédents de taux anormalement bas de protéine de coagulation sanguine). Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez le chirurgien que vous prenez ce médicament.
- Des réactions cutanées

Lasilix® 40 mg **Lasilix® 20 mg/2 ml**

Furosémide

PER 11/2026
LOT : 223E028

LASILIX 40 MG
20CP SEC

P.P.V : 34DH60

6 190000 060468

SANOFI 

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

LASILIX 40 mg comprimés :

Furosémide 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

LASILIX 20 mg/2ml :

Furosémide 20 mg/2 ml.

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Formes pharmaceutiques et présentations

LASILIX 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

LASILIX 20 mg/2 ml : solution injectable,
ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Voie orale :

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium,
- de l'hypertension artérielle.

Voie injectable :

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiolologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
- poussées hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (*rétenzione de sel*),
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :



FORMATION DE L'UTILISATEUR

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg,

Spironolactone

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre

Le principe actif de ce médicament (la spironolactone) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle anti-dopage.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants : médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que l'amiloride, le canrénoate de potassium, l'éplérone, le triamtérine ou le potassium), médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane, certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus), médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-

Les effets suivants peuvent survenir :

- une gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme) disparaissant généralement à l'arrêt du traitement mais pouvant persister dans de rares cas.
- des troubles digestifs.
- une inflammation du foie (hépatite).
- des crampes des membres inférieurs (jambes, pieds...).
- une somnolence.
- des troubles des règles chez la femme.
- une impuissance chez l'homme.
- un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- une éruption cutanée.
- une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).
- un mauvais fonctionnement des reins.



Centre Cardiologique
Interventionnel

ZOUBIDI MOHAMED ZINABIDIN

Professeur Agrégé

ORDONNANCE

Date : 15/08/2023

Mme Fat'heddine Chama

see heel me[€] (C)
glyc o sc gly

Dr. ZOUBIDI Mohamed Zinabidi
Dr. Agrégé : Cardiologie Interventionnelle
67, Rond Point de Marseille Oasis
Casablanca - Tel: +212 522 25 51 35
Moh: 06 69 58 10 81 - INDE: 0910760F

Mme FAT'HEDDINE Chama
01-01-1946



23006 coller sur l'ordonnance

Centre Cardiologique Interventionnel

67, Rond point de Marseille, Oasis - Casablanca - Tél. : +212 5 22 25 51 35 - GSM. : +212 6 69 58 10 81 / 6 53 73 19
E-Mail : mz_zoubidi@yahoo.fr / mz_zoubidi@centrecardiologie.com / www.centrecardiologie



Centre Cardiologique
Interventionnel

ZOUBIDI MOHAMED ZINABIDIN
Professeur Agrégé
Coronarographie - Angioplastie - Stimulation Cardiaque

Casablanca 01/09/2023

COMPTE RENDU D'ECHOCARDIOGRAPHIE

Mme FATHEDDINE CHAMA

En mode bidimensionnel

- Les valves mitrale, aortique, pulmonaire, et tricuspidé sont de structure et de cinétique normales.
- Le ventricule gauche est de contractilité globale et segmentaire normale
- Les cavités droites ne sont pas dilatées.
- Il n'y a pas de défaut au niveau du septum inter-auriculaire
- Pas d'épanchement péricardique
- Il n'y a pas thrombose intracavitaire

Au doppler :

- Il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire
- Le flux mitral est normal

CONCLUSION

Echo-doppler cardiaque normal.

Mr. ZOUBIDI Mohamed Zinabidin
Pr. Agrégé - Cardiologie Interventionnelle
67, Rond Point de Marseille Oasis
Casablanca - Tel: 05.22.25.51.35
Mob: 06.69.58.10.81 - INPE: 0910269

Signature PR ZOUBIDI MOHAMED

Mr. ZOUBIDI Mohamed Zinabidin
Pr. Agrégé - Cardiologie Interventionnelle
67, Rond Point de Marseille Oasis
Casablanca - Tel: 05.22.25.51.35
Mob: 06.69.58.10.81 - INPE: 0910269

Centre Cardiologique Interventionnel

67 Rond point de Marseille, Oasis - Casablanca - Tél. : +212 5 22 25 51 35 - GSM. : +212 6 69 58 10 81 / 6 53 73 19 51
www.centrecardiologie.com

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BIOLISSASFA

BIOCHIMIE - HÉMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE -
BACTÉRIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Tél. : 05 22 65 22 93

Sans rendez-vous du Lundi au Vendredi : 07h45 - 18h30
et Samedi : 8h00 - 13h00

Dr BENZAKOUR Kenza
biolissasfa@gmail.com

FACTURE N° : 230800770

Mme FATHEDDINE Chama

Référence : 2308160029

Date de l'examen : 16-08-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses		
CN	Analyse	Clé
9105	Prélèvement sanguin	E25
B111	Créatinine	B30
B118	Glycémie	B30
B119	Hémoglobine glycosylée	B100
B131	Potassium	B30
B133	Sodium	B30
B135	Urée	B30

Total des B : 250

TOTAL DOSSIER : 300.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cents dirham .

Route El Jadida Km9 – Lot. Diar Al Menzah – Lissasfa Hay Hassani Casablanca

Tél : 05 22 65 22 93 - E-mail : Biolissasfa@gmail.com

Nº Patente : 36200084 - IF 24858272 - RC : 429382 - ICE : 001995299000048



Centre Cardiologique
Interventionnel

ZOUBIDI MOHAMED ZINABIDIN
Professeur Agrégé
Coronarographie - Angioplastie - Stimulation Cardiaque

CASABLANCA LE 01/09/2023

FACTURE N°800/2023

EXAMEN DU 01/09/2023

NOM/PRENOM : Mme FATHEDDINE CHAMA

ECHODOPPLER CARDIAQUE

800.00 DH

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE EN LETTRE A LA SOMME DE :

HUIT CENT DIRHAMS

INPE 091026955

Dr. ZOUBIDI Mohamed Zinabidin
Agrégé - Cardiologue Interventionnel
67 Rond Point de Marseille Oasis
Casablanca - Tel: 05.22.25.51.35
Fax: 05.58.10.91 - INPE: 091026955

Centre Cardiologique Interventionnel

67, Rond point de Marseille, Oasis - Casablanca - Tél. : +212 5 22 25 51 35 - GSM. : +212 6 69 58 10 81 / 6 53 73 19 51
E-Mail : mz_zoubidi@yahoo.fr / mz_zoubidi@centrecardiologie.com / www.centrecardiologie.com

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BIOLISSASFA

BIOCHIMIE – HÉMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE –
BACTÉRIOLOGIE – VIROLOGIE – PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Tél. : 05 22 65 22 93

Sans rendez-vous du Lundi au Vendredi : 07h45 - 18h30
et Samedi : 8h00 - 13h00

Dr BENZAKOUR Kenza
biolissasfa@gmail.com



Prélèvement du : 16-08-2023
Code Patient 2308160029
Edition : 18-08-2023

Mme FATHEDDINE Chama
Né(e) le : 01-01-1946 (77 ans – F)

Référence : 2308160029
Médecin :
Prélèvement du : 16-08-2023

BIOCHIMIE SANGUINE

Sodium (Na) (ARCHITECT Ci 4100)	144 mmol/L	(137-147)
Potassium (K) (ARCHITECT Ci 4100)	4.10 mmol/L	(3.60-5.30)
Urée (ARCHITECT Ci 4100)	0.30 g/L 5.00 mmol/L	(0.10-0.50) (1.67-8.33)
Créatinine (ARCHITECT Ci 4100)	7.3 mg/L 64.6 µmol/L	(<13.0) (<115.1)
Glycémie à jeun (ARCHITECT Ci 4100)	1.48 g/L 8.21 mmol/L	(0.70-1.10) (3.89-6.11)

Consensus :

- Taux normal : de 0,60 à 1,10 g/L
- Diminution de la tolérance au glucose : de 1,10 à 1,26 g/L
- Sujet diabétique : > à 1,26 (sur deux prélèvements distincts)

Hémoglobine glyquée (HbA1c) 7.20 %
(Biorad D 10)

Valeurs de référence :

Sujet normoglycémique : 4,00 à 6,00 % de l'hémoglobine totale.

Sujet diabétique équilibré type 2 : objectif ciblé autour de 6,50 %.

Sujet diabétique équilibré type 1 : objectif ciblé autour de 7 %

Diabète mal équilibré : taux supérieur à 8,50 %.

Demande validée biologiquement par : Dr K.BENZAKOUR

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
BIOLISSASFA
Dr. BENZAKOUR Kenza
Bd. Chaibla Tahar Houte El Jadida
Im. 9 Lot. Dar El Manzeh Lissasfa
Hdy Hassan - Casa
Tél: 05 22 65 22 93

Name: fatheddine chama

Sex: BedNo.:

Age: Date: 15/08/2023 16:04:11

SN: 000694 Section:

Cli No.: CaseNo.:

Frequency:	1000Hz	PR Interval:	163 ms	Prompt:
Sample Time:	11s	QT Interval:	344 ms	
HR:	81bpm	QTc Interval:	399 ms	
P Interval:	138ms	P Axis:	53.10;ā	
QRS Interval:	91 ms	QRS Axis:	19.70;ā	
T Interval:	184 ms	T Axis:	76.00;ā	

Dr. ZOUBIDI Mohamed *Dr. Aggrégé - Cardiologie Interventionnelle*
61, Rond Point de Marseille Oasis
Casablanca - Tel: 05.22.25.51.35
Mob: 06.69.58.10.81 - INPE: 09102605

Doctor: PR MZ ZOUBIDI

