

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° W21-827613

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> A
Cadre réservé à l'adhérent (e)		Société	
Matricole : 11381		TOUM BENCHEKROUN GHIZLANE	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre	
Nom & Prénom : TOUM BENCHEKROUN GHIZLANE		Date de naissance : 21.05.76	
Adresse :		Tél. : 0661734478 Total des frais engagés : 300+615+800+500	
<i>A 83731</i>			


Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dr. Rachid INCHAOUH Spécialiste des Maladies Respiratoires 13, Rue Aïn Jaoujata - Casablanca Tél. : 0522 48 08 94 - 0522 20 47 40 </div>			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade : TOUM BENCHEKROUN GHIZLANE			
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : Respiratrices			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'at			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 15.11.2023

Signature de l'adhérent(e) : *Toum* 22 NOV. 2023



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15 NOV 2023	4	300		091078857 Cachet INCHAUD des Maladies Lassalant 14410

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE HAY TICEL N° 25432/21 Casablanca Tel. 05 22 92 20 28	15/11/93	615,80

ANALYSES - RADIographies

Cachet de signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Mouvement des Radiographies
Dr. Rachid INCHAOUD Radiologue Ain Fouataine - Casablanca 0522 20 1400 048 08 94 - 0522 20 1400	15 NOV 2023	200200	Dr. Rachid INCHAOUD Radiologue Ain Fouataine - Casablanca 0522 20 1400 048 08 94 - 0522 20 1400

15 NOV 2000 AUXILIAIRES MEDICALS

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Dr. Rachid INCHAOUH

Spécialiste des maladies Respiratoires

Diplômé de la Faculté de médecine
de Toulouse

Asthme - Tuberculose - Allergies
respiratoires - Endoscopie - Spirométrie



الدكتور رشيد انشاؤه

اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي

خريج كلية الطب بتولوز

الحقيقة - السل - الحساسية

Mme TOUM BENCHEKROUN Ghizlane

15.11.2023

Casablanca, Le :

1 FOSTER SPRAY

Inhaler 2 bouffées le matin et le soir, pendant 1 semaine. PUIS 1 BOUFFEE 2 FO
PAR JOUR PDT 1 MOIS

90,90

2 MOTRINEX 10 MG

99,70 le soir, pendant 30 jours.



Unofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Tavanic 500mg, cp. pel b7
P.P.V : 205,00 DH
6 118001 080830

3 LABIXTEN 20 MG

80,5 Prendre 1 comprimé le matin, pendant 30 jours.



4 TAVANIC 500 MG B/7

109,10 Prendre 1 comprimé à midi, pendant 7 jours.

5 TABUNEX 0;05%

Prendre 2 gouttes le matin et le soir. dans chaque narine pdt 1 semaine puis 1
pulverisation par jour pdt 30 j

615,80

PHARMACIE HAY EL MATAR
Dr. El HABROUKI Hakim
1, Bd. Oum Rabii Oulîa - Casablanca
Tel.: 05 22 93 20 26

Dr Rachid INCHAOUH

Dr. Rachid INCHAOUH
Spécialiste des maladies
Respiratoires - Casablanca
13, Rue Ain taoujat-Résidence Ifass 1^{er} Etage (en Face Clinique BADR) - Casablanca
Tél.: 05 22 48 08 94 / 05 22 20 47 40

13، زقة عين توجطات - إقامة إلياس - الطابق الأول (قرب مصحة بدر) الدار البيضاء
13, Rue Ain taoujat-Résidence Ifass 1^{er} Etage (en Face Clinique BADR) - Casablanca

الهاتف: 05 22 48 08 94 / 05 22 20 47 40

Motrinex® 10mg Comprimé pelliculé

Boîtes de 30

PPV : 209,00Dhs

LOT : 4356

FAB : AOU.22

EXP : AOU.24

icament à votre enfant car elle contient des

harmacien.

pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être

nédecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique
tice. Voir rubrique 4.

1. Qu'est-ce que Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : R03DC03

Qu'est-ce que Motrinex® ?

Motrinex® est un antagoniste des récepteurs aux leucotriènes qui bloque des substances appelées leucotriènes.

Comment agit Motrinex® ?

Les leucotriènes provoquent un rétrécissement et un œdème des voies aériennes dans vos poumons et provoquent également des symptômes d'allergie. En bloquant les leucotriènes, **Motrinex®** améliore les symptômes de l'asthme, contribue au contrôle de l'asthme et peut améliorer les symptômes d'allergie saisonnière (connue également sous le nom de rhume des foins ou rhinite allergique saisonnière).

Quand Motrinex® doit-il être utilisé ?

Votre médecin vous a prescrit **Motrinex®** pour le traitement de votre asthme, pour prévenir les symptômes d'asthme le jour et la nuit.

• **Motrinex®** est indiqué chez les adultes et adolescents de 15 ans et plus insuffisamment contrôlés par leur traitement et qui nécessitent l'ajout d'un traitement complémentaire.

• **Motrinex®** est également indiqué en traitement préventif des symptômes d'asthme déclenchés par l'effort.

• Chez ces mêmes patients asthmatiques traités par **Motrinex®** pour leur asthme, **Motrinex®** peut en même temps apporter un soulagement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière.

Votre médecin déterminera comment **Motrinex®** doit être utilisé en fonction des symptômes et de la sévérité de votre asthme.

Qu'est-ce que l'asthme ?

L'asthme est une maladie au long cours.

L'asthme comprend :

• une difficulté à respirer en raison du rétrécissement des voies aériennes. Ce rétrécissement des voies aériennes s'aggrave et s'améliore en réaction à différentes circonstances,

• Les voies aériennes sensibles qui réagissent à différents phénomènes tels que la fumée de cigarette, le pollen, le froid ou l'effort,

• un gonflement (une inflammation) de la muqueuse des voies aériennes.

Les symptômes de l'asthme comprennent : toux, sifflement et gêne thoracique.

Qu'est-ce que l'allergie saisonnière ?

L'allergie saisonnière (connue également sous le nom de rhume des foins ou rhinite allergique saisonnière) est une réponse allergique souvent provoquée par les pollens des arbres, des pelouses et des herbes transportés par l'air. Les symptômes des allergies saisonnières peuvent généralement comprendre : un nez bouché, qui coule, qui pique ; des éternuements ; des yeux larmoyants, gonflés, rouges, qui piquent.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?

Informez votre médecin en cas de problèmes médicaux ou d'allergies que vous présentez ou avez présentés.

Ne prenez jamais Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique au Montelukast ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• **Motrinex® 10 mg** est déconseillé chez les enfants de moins de 15 ans.

Avertisements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre **Motrinex®**.

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

LABIXTEN® 20 mg comprimés

DCI: **bilastine**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle pour vous.

- Ga
• Si
med
• Ce
autre
- LOT: 14523002
PER: 02/2028
PPV: 99,70 DH
- soit pour la relire.
demandez plus d'informations à votre
élément prescrit. Ne le donnez pas à
soi, même si les signes de leur maladie
sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LABIXTEN® 20 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
3. Comment prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LABIXTEN® 20 mg comprimés contient de la bilastine qui est un antihistaminique. LABIXTEN® 20 mg comprimés est indiqué pour soulager les symptômes de la rhino-conjonctivite allergique (éternuement, démangeaison nasale, écoulement nasal, congestion nasale ainsi que rougeur et larmoiement oculaires) et autres symptômes d'origine allergique.

LABIXTEN® 20 mg comprimés peut également être utilisé pour traiter les éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons (urticaire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS :

• Contre-indication de LABIXTEN® 20 mg comprimés :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la bilastine ou à l'un des autres composants du LABIXTEN® 20 mg comprimés.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LABIXTEN® 20 mg si vous avez une insuffisance rénale modérée à sévère ou si vous prenez d'autres médicaments (voir « Interaction avec d'autres médicaments »).

Ne pas dépasser la dose prescrite. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Enfants et adolescents :

Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ne pas prendre ce médicament si vous prenez l'un des

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous oubliez de prendre votre dose à l'heure prévue, prenez la dose oubliée dès que possible, puis continuer selon le rythme habituel.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EVENTUELS EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, LABIXTEN® 20 mg comprimés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables sont :

- Fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne sur 10.
- Maux de tête.
- Somnolence

Peu fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne sur 100 personnes

- Anomalie de l'électrocardiogramme (ECG : enregistrement graphique des battements du cœur).
- Modification du bilan sanguin hépatique.
- Sensations vertigineuses.
- Douleur au niveau de l'estomac.
- Sensation de fatigue.
- Augmentation de l'appétit.
- Battements cardiaques irréguliers.
- Prise de poids.
- Nausées.
- Anxiété.
- Sécheresse ou inconfort nasal.
- Douleur abdominale (au niveau du ventre).
- Diarrhées.
- Gastroïte (inflammation de la paroi de l'estomac).
- Vertiges.
- Sensation de faiblesse générale.
- Soif.
- Dyspnée (difficulté à respirer).
- Sécheresse buccale.
- Indigestion.
- Démangeaisons.
- Herpès labial.
- Fièvre.
- Acouphènes (bourdonnements dans les oreilles).
- Trouble du sommeil.
- Modification du bilan sanguin rénal.
- Augmentation des taux de lipides (graisses) mesurés dans le sang.

Fréquence inconnue : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

- Palpitations (perception des battements du cœur).
- Tachycardie (accélération des battements du cœur).
- Des réactions allergiques dont les signes peuvent comporter une difficulté à respirer, un vertige, un évanouissement ou perte de connaissance, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et/ou un gonflement et une rougeur de la peau. Si vous remarquez un de ces effets secondaires graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez votre médecin.

Motrinex® 10mg Comprimé pelliculé

Boîtes de 30

PPV : 209,00Dhs

LOT : 4356

FAB : AOU. 22

EXP : AOU. 24

icament à votre enfant car elle contient de

harmacien.

pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être
nédecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique
tice. Voir rubrique 4.

1. Qu'est-ce que Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : R03DC03

Qu'est-ce que Motrinex® ?

Motrinex® est un antagoniste des récepteurs aux leucotriènes qui bloque des substances appelées leucotriènes. Comment agit Motrinex® ?

Les leucotriènes provoquent un rétrécissement et un œdème des voies aériennes dans vos poumons et provoquent également des symptômes d'allergie. En bloquant les leucotriènes, Motrinex® améliore les symptômes de l'asthme, contribue au contrôle de l'asthme et peut améliorer les symptômes d'allergie saisonnière (connue également sous le nom de rhume des foins ou rhinite allergique saisonnière).

Quand Motrinex® doit-il être utilisé ?

Votre médecin vous a prescrit Motrinex® pour le traitement de votre asthme, pour prévenir les symptômes d'asthme le jour et la nuit.

• Motrinex® est indiqué chez les adultes et adolescents de 15 ans et plus insuffisamment contrôlés par leur traitement et qui nécessitent l'ajout d'un traitement complémentaire.

• Motrinex® est également indiqué en traitement préventif des symptômes d'asthme déclenchés par l'effort.

• Chez ces mêmes patients asthmatiques traités par Motrinex® pour leur asthme, Motrinex® peut en même temps apporter un soulagement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière.

Votre médecin déterminera comment Motrinex® doit être utilisé en fonction des symptômes et de la sévérité de votre asthme.

Qu'est-ce que l'asthme ?

L'asthme est une maladie au long cours.

L'asthme comprend :

• une difficulté à respirer en raison du rétrécissement des voies aériennes. Ce rétrécissement des voies aériennes s'aggrave et s'améliore en réaction à différentes circonstances, des voies aériennes sensibles qui réagissent à différents phénomènes tels que la fumée de cigarette, le pollen, le froid ou l'effort,

• un gonflement (une inflammation) de la muqueuse des voies aériennes.

Les symptômes de l'asthme comprennent : toux, sifflement et gêne thoracique.

Qu'est-ce que l'allergie saisonnière ?

L'allergie saisonnière (connue également sous le nom de rhume des foins ou rhinite allergique saisonnière) est une réponse allergique souvent provoquée par les pollens des arbres, des pelouses et des herbes transportés par l'air. Les symptômes des allergies saisonnières peuvent généralement comprendre : un nez bouché, qui coule, qui pique ; des éternuements ; des yeux larmoyants, gonflés, rouges, qui piquent.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé ?

Informez votre médecin en cas de problèmes médicaux ou d'allergies que vous présentez ou avez présentées. Ne prenez jamais Motrinex® 10 mg, comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique au Montelukast ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Motrinex® 10 mg est déconseillé chez les enfants de moins de 15 ans.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Motrinex®.

Tabunex® Suspension pour pulvérisation nasale

Furoate de Mométasone Anhydre

N° Lot: 2UW823
Fab.: 08/2022
Per.: 08/2025
PPV: 102,10 Dhs

é de cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez besoin de la relire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre

ment prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de
être nocif.

trave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice,
pharmacien.

1. Qu'est-ce que **Tabunex**, suspension pour pulvérisation nasale et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **Tabunex**, suspension pour pulvérisation nasale?
3. Comment utiliser **Tabunex**, suspension pour pulvérisation nasale?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver **Tabunex**, suspension pour pulvérisation nasale?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TABUNEX, SUSPENSION POUR PULVÉRISATION NASALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Classe pharmacothérapeutique:

CORTICOÏDE A USAGE LOCAL.

Indications thérapeutiques:

Tabunex est indiqué chez les adultes et les enfants à partir de 3 ans en traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière ou de la rhinite perannuelle.

Tabunex est indiqué dans le traitement de la polyposie nasale chez les adultes à partir de 18 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER TABUNEX, SUSPENSION POUR PULVERISATION NASALE?

Contre-indications:

N'utilisez jamais **Tabunex**:

- si vous êtes allergique (hypersensible) au furoate de mométasone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une infection nasale non traitée. L'utilisation de **Tabunex** au cours d'une infection non traitée dans votre nez, telle que l'hépsez, peut aggraver cette infection. Vous devez attendre la guérison de l'infection avant de commencer à utiliser le pulvérisateur nasal.
- si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale

Polypes nasaux:

Utilisation chez les adultes à partir de 18 ans
La dose usuelle initiale est de deux pulvérisations dans chaque narine une fois par jour.

- Si les symptômes ne sont pas contrôlés après 5 à 6 semaines, la dose peut être augmentée à deux pulvérisations dans chaque narine deux fois par jour. Lorsque vos symptômes sont contrôlés, votre médecin peut vous recommander de réduire la dose.
- Si les symptômes ne sont pas contrôlés après 5 à 6 semaines d'administration deux fois par jour, vous devez consulter votre médecin.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration:

Voie nasale.

- Agiter légèrement le flacon avant emploi.
- Lors du premier usage, la pompe doit être amorcée par 10 pulvérisations. Inutilisée, celle-ci reste amorcée pendant environ 2 semaines. Au-delà, elle devra à nouveau être réamorcée par 2 pulvérisations.

Si vous avez utilisé plus de Tabunex que vous n'auriez dû:
Informez votre médecin si, par erreur, vous avez pris plus de **Tabunex** que vous n'auriez dû.

Si vous utilisez des corticostéroïdes sur une longue période ou en grande quantité, cela peut, dans certains cas rares, déséquilibrer votre système hormonal. Chez les enfants, cela peut affecter leur croissance et leur développement.

Si vous oubliez d'utiliser **Tabunex**:

Si vous oubliez d'utiliser votre pulvérisateur nasal au bon moment, utilisez-le dès que vous y pensez, puis continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.


Si vous arrêtez d'utiliser **Tabunex**:

Chez certains patients, **Tabunex** peut commencer à soulager les symptômes 12 heures après la prise de la première dose. Néanmoins, tous les bénéfices du traitement peuvent ne pas

Dr. Rachid INCHAOUH

SPECIALISTE DES MALADIES
RESPIRATOIRES

Diplômé de la Faculté de
médecine de TOULOUSE
Asthme, Tuberculose, Allergies
respiratoires, Endoscopie, Spirométrie



الدكتور رشيد انشاوه

اختصاصي في امراض الجهاز
 التنفسى
 خريج كلية الطب
 بتوuloz
 الضيق، السل، الحساسية

Casablanca, le 15 NOV 2023

NOTE D'HONORAIRES

J'ai l'honneur de présenter mes meilleures salutations à

M *Tam. Benchehroune Ghilane*

Et vous adresse selon l'usage, ma note d'honoraires

Soit la somme de : *500,00 DH*

pour 147

DHS.

SIGNATURE

Dr. Rachid INCHAOUH
Spécialiste des Maladies
Respiratoires
13, Rue Ain TAOUJTA - Casablanca
Tél.: 0522 48 08 94 - 0522 20 47 40

13 زنقة عين توجطات - اقامة إلیاس - الطابق الأول (قرب مصحة بدر) - الدار البيضاء


13, Rue Ain TAOUJTA - Résidence Ilias - 1er Etage (en Face Clinique BADR) - Casablanca

المحمول - الهاتف : GSM: 061.15.03.63: Tel : 022.48.08.94

Dr. Rachid INCHAOUH

Spécialiste des maladies Respiratoires
Diplômé de la Faculté de médecine
de Toulouse

Asthme - Tuberculose - Allergies
respiratoires - Endoscopie - Spirométrie



الدكتور رشيد انشاؤه

اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي

خريج كلية الطب بتولوز

الضيق - السل - الحساسية


15 NOV 2023

Casablanca, le :

TELETHORAX

Nom/Prénom: *Toum. Rachid et le Rour*
44182 Lan

INTERPRETATION:



Silhouette cardiaque normale

Distension thoracique

*Absence de lésions parenchymateuses
Évolutives*

Honoraire

Z 12 = 200.00 DH

*Dr. Rachid INCHAOUH
Spécialiste des Maladies
Respiratoires
13, Rue Ain Taoujta - Casablanca
Tél. : 05 22 48 08 94 - 0522 20 47 40*

زنقة عين توجطات - إقامة إيلاس الطابق الأول (قرب مصحة بدن) - الدار البيضاء

13, Rue Ain Taoujta - Résidence Ileas - 1^{er} Etagé (en Face Clinique BADR) - Casablanca

الهاتف: 05 22 48 08 94 / 05 22 20 47 40

CABINET DE PNEUMOLOGIE

Dr Rachid INCHAOUH

EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE

13, Rue AÏN TAOUJTA, Résidence Ilias Bourgogne tél: 022.48.08.94

TOUM BENCHEKROUNE, GHIZLANE


ID-Nr: TOUGHI210576

Remarque: OPRESSIO

173 cm, 70 kg,

mesuré le 15.11.2023 à 11:11 h

Courbes Débit/Volume Evolution



Date & Heure	08.07.2020		15.11.2023	
Médicament		10:40		11:11
Paramètre	Unité	Théor.	Pré %Théor	Post %Théor
CVF	l	3.55	2.43 68	2.74 77 13
VEMS	l	3.06	2.22 73	2.55 84 15
VEMS/CV	%	80		
VEMS/CVF	%	80	92 114	93 116 2
DEP	l/s	6.99	7.08 101	6.11 87 -14
DEM75	l/s	6.00	6.26 104	6.05 101 -3
DEM50	l/s	4.22	3.14 74	4.29 102 37
DEM25	l/s	1.75	1.29 74	1.94 111 50
DEMM25- 75	l/s	3.48	2.81 81	3.74 107 33
Rint	kPa/(l/s)	0.30		

Commentaires:

©1999 ZAN *Meßgeräte GmbH Allemagne Tel: +49 9736 8181-0

Heure mesure: 15.11.2023/11:11

BTPS : 20/1027/93 [°C/mbar/%]

Dr. Rachid INCHAOUH
Spécialiste des Maladies
Respiratoires
13, Rue Aïn Taoujtate - Casablanca
Tél.: 0522 48 08 94 - 0522 20 47 40