

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-0023069

Nay 194

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 10722

Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

NAN NANI

SANA

Date de naissance :

17-07-1980

Adresse : 101 Rue Elbibisi 7ème étage

App. n° 18, Casablanca

Tél. : 06/69952104

Total des frais engagés : 1.578,3 Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

الدكتور الحسين السبيسي  
**Docteur Hassane SBIQUI**  
88, Bd Med El Meknass Bourgogne Casa  
شارع محمد السادس بوركون للبضائع 88  
الناظور - تلفون : 05 22 26 91 80

Date de consultation :

10.10.2023

Nom et prénom du malade :

NAN NANI Sanaa

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Coliques intenses avec diarrhée

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/10/23	Un	2	400	 Dr. Hassant SQUILLI Meknassi Nougogne Casa تونس - مكناس - نوڨنڨي - 91 80 88

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE TAHA HOUSSINE Dr. RACHID EL MORNAKI 13, Avenue 6 Hay Drissia 2 - Casablanca Tel.: 05 22 85 22 25	12/12/2023	148,30

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				MONTANTS DES SOINS <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				DEBUT D'EXECUTION <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				FIN D'EXECUTION <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	Coefficient DES TRAVAUX <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				MONTANTS DES SOINS <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				DATE DU DEVIS <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				DATE DE L'EXECUTION <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>

**Docteur Hassane SBIOUTI**

Ancien Médecin Major de la marine royale

Ancien Médecin au 1<sup>er</sup> Bataillon Médical Militaire

Chirurgie dermatologique

Echographiste

(Échotomographic doppler couleur abdominale et gynéco-obstétricale)

Traitemet de la douleur

Traitement des névroses psychiatriques

Traitement du diabète et de la thyroïde

n°847841 Sanaa

**الدكتور الحسن السبيوي**

سابقاً طبيب ماجور بالبحرية الملكية

سابقاً طبيب بالفيلق الأول للقوات المسلحة الملكية

جراحة الجلد

الفحص بالصدى العام

الفحص بالصدى و الدوبليير الملون

دراسات عليا في علاج كل أنواع الألم

علاج الأمراض النفسانية

علاج السكري و الغدة الدرقية

دار البيضاء في Casablanca le 10.10.2023

Ryrdels 20 AS

1-1 AS

1993

Dicetel

n. 0 - 1

صيدلية طه حسين  
PHARMACIE TAHIA HOUSSINE  
Dr. RACHID EL MORNAKI  
13, Avenue B Hay Dussia 2 - Casa  
Tel : 05 22 85 22 25

**الدكتور الحسن السبيوي**  
**Docteur Hassane SBIOUTI**

88, Bd Mohammed El Meknassi Bourgogne Casa  
شارع محمد المكناسي بوربون البيضاء  
الناظور - المغرب - 20088

ت: 05 22 26 91 80

# NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

## Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

DCI : Sulpiride

LUT : 03923004  
PER : 02/2028  
PPV : 27.00 DH

27.00

ce  
tre  
un  
ole

gélules?

- 1.
- 2.
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

#### **• Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GELULES?

#### **- Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein),
- Phéochromocytome (atteinte de la glande médulosurrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation),  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

##### **• Mises en gardes spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement par le ALIVIAR® 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.
- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.
- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.
- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgées atteints de

- démence.
- Ce médicament d'origine formation de caillots de formation de caillots
  - La prise de ce médicament alcoolisées ou des noms dopaminergiques pointe (troubles graves) médicaments suscite
  - Ce médicament doit être pris au risque d'apparition principalement de la
  - Chez l'enfant, un suivi
  - La prise de comprimés peut entraîner l'avalage de traveaux
  - En raison de présenter des atteints de galactose-1-phosphate de déficit en lactase
  - **Précautions d'emploi :**
  - Afin que votre médicament soit efficace et sûr au traitement, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :
  - En cas de maladie mentale, il est recommandé de prendre le médicament à la dose prescrite.
  - En cas de diabète de type 2, il est recommandé de prendre le médicament à la dose prescrite et de surveiller la glycémie.
  - En cas d'insuffisance rénale, il est recommandé de prendre le médicament à la dose prescrite et de surveiller la fonction rénale.
  - En cas d'antécédents d'épilepsie, il est recommandé de prendre le médicament à la dose prescrite et de surveiller les crises épileptiques.
  - Chez les sujets âgés, il est recommandé de prendre le médicament à la dose prescrite et de surveiller les effets secondaires.
  - EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.**
  - **Enfants et adolescents :**
  - Sans objet.
  - **Usage des autres médicaments :**
  - Veuillez indiquer à votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris ceux que vous avez pris récemment ou ceux que vous avez arrêtés. De plus, veuillez signaler tous les médicaments que vous prenez ou qui pourraient interagir avec ce médicament.
  - **Associations thérapeutiques :**
  - Dopaminergiques : certains médicaments peuvent être utilisés dans les troubles de la lactation.
  - **Associations déconseillées :**
  - Certains médicaments peuvent augmenter le risque de troubles cardiaques (notamment les médicaments contre l'hypertension et les médicaments contre l'angine de poitrine).
  - **Antiparasitaires :**
  - Luméfantrine, pentamidine, chloroquine, etc.
  - **Antiarythmiques :**
  - (amiodarone, sotalol, flecainide, propafenone, cisapride, diphenhydramine, etc.)
  - **Spiramycine IV :**
  - Autres neuroleptiques : haloperidol, levométryptophane, ventalpride.
  - **Méthadone :**
  - Certains médicaments peuvent augmenter le risque de troubles cardiaques (notamment les médicaments contre l'hypertension et les médicaments contre l'angine de poitrine).
  - **Antiparkinsonien :**
  - Certains médicaments peuvent augmenter le risque de troubles cardiaques (notamment les médicaments contre l'hypertension et les médicaments contre l'angine de poitrine).

# Dicetel

122, 30



primé pelliculé

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :

Antispasmodique musculotrope.

Ce médicament est indiqué dans les douleurs des maladies digestives.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DICTEL 100 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais DICTEL 100 mg, comprimé pelliculé :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

En cas de doute il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Avertissemens et précautions

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez l'enfant.

Du fait d'un risque d'irritation de l'œsophage, il est important de respecter scrupuleusement le mode d'administration :

- prenez toujours les comprimés au milieu des repas,
- avalez les comprimés entiers, en position assise, avec un grand verre d'eau. Ne pas les écraser, les sucer ou les mâcher ;
- ne vous allongez pas pendant 30 minutes suivant la prise.

Il est particulièrement important de respecter le mode d'administration de DICTEL mentionné ci-dessus si :

- vous avez des problèmes avec votre œsophage,
- une petite partie de votre estomac est remontée dans votre poitrine (hernie hiatale).

Si l'une de ces conditions s'applique à vous (ou en cas de doute), parlez-en à votre médecin avant de prendre DICTEL.

Autres médicaments et DICTEL 100 mg, comprimé pelliculé

### prendre ce médicament car elle contient des informations

de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à dans cette notice. Voir rubrique 4.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments pour soulager les spasmes de votre intestin ou des voies biliaires (médicaments appelés « anticholinergiques »). DICTEL peut augmenter leur effet contre les spasmes.

**Grossesse et allaitement :** Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être. L'utilisation de DICTEL n'est pas recommandée au cours de la grossesse.

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point d'allaiter. L'utilisation de DICTEL n'est pas recommandée chez la femme qui allaita.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'effet de ce médicament sur votre aptitude à conduire ou utiliser des outils ou des machines n'est pas connu. Voyez comment ce médicament vous affecte avant de pratiquer une de ces activités.

**DICTEL 100 mg, comprimé pelliculé contient du lactose (un type de sucre).**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

## 3. COMMENT PRENDRE DICTEL 100 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement

**ZYRDOL®**  
(Métronidazole)

**ZYRDOL® 500 mg 20 comprimés pelliculés**

PPV 29DH00

EXP 08/2025  
LOT 26068 3

250 mg

500 mg

2,500 g

500 mg

Ex.  
CLASS

Antibiotique antibactérien antiparasitaire de la famille des nitro-5-imidazolés.

**DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (INDICATIONS)**

- Amibiases.
- Trichomonases urogénitales.
- Vaginites non spécifiques.
- Lambliases.
- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.
- Relais des traitements curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Contre-indication absolue :
- Hypersensibilité aux nitro-imidazolés.
- Contre-indication relative :

Disulfiram-Alcool.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- Eviter les boissons alcoolisées

- Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.

- Prévenez votre médecin en cas d'antécédents de troubles hématologiques.

- Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui évoluent.

- Suspension buvable :

- Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

- Ce médicament contient 2,5 g par unité de prise (5 ml) : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

- Ce médicament contient des parahydroxybenzoates et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

- Comprimé pelliculé :

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

- Déconseillés :

- Alcool : chaleur, rougeurs, vomissements, tachycardie.

- Disulfiram : bouffées douloureuses. Etat confusionnel.

- Nécessitant des précautions d'emploi :

Anticoagulants oraux : augmentation de l'effet anticoagulant et du risque hémorragique. Adapter les doses de l'anticoagulant oral.

- A prendre en compte :

Fluoro-uracile

- Examen paraclinique :

Le méthronidazole peut immobiliser les tréponèmes et donc faussement positiver un test de Nelson.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

Le méthronidazole peut être administré chez la femme enceinte, et doit être évité pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENIT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

**CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES**

Il convient d'avertir les patients du risque potentiel de vertiges, de confusion, d'hallucinations ou de convulsions et de leur recommander de ne pas conduire de véhicules, ni d'utiliser de machines en cas de survenue de ce type de troubles.

**LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE**

- Comprimés pelliculés à 250 mg : Lactose
- Comprimés pelliculés à 500 mg : Lactose
- Suspension buvable à 125 mg/5 ml : Saccharose, sodium environ 20 mg pour 100 ml : le taux de sodium est inférieur à 1 mmol par dose, c'est-à-dire "sans sodium", parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle.
- Solution injectable pour perfusion à 500 mg/100 ml : sodium environ 330 mg pour 100 ml.

**POSOLOGIE USUELLE VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION**

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin. A titre indicatif, la posologie usuelle est :